

Streptopus (Čípek)

čeleď: Liliaceae

Pod zemí vytváří oddenek. Patří mezi jednodomé rostliny s oboupohlavnými květy. Listy jsou jednoduché, přisedlé, mohou být i objímavé. Jejich tvar se pohybuje od kopinatého po vejčitý. Kvete na stopkách po 1 - 2ks v paždí listů (vzácně vrcholové květenství). Okvětních lístků bývá 6 a nabývají barvy bílé, žlutozelené nebo narůžovělá. Plodem je dužnatá bobule. Nejznámějším druhem je *S. amplexifolius*.

Streptopus amplexifolius (Čípek objímavý)

synonyma: *Convallaria amplexifolia*, *Convallaria dichotoma*, *S. amplexifolius* f. *indivisus*, *S. amplexifolius* subsp. *americanus*, *S. amplexifolius* subsp. *papillatus*, *S. amplexifolius* var. *americanus*, *S. amplexifolius* var. *chalazatus*, *S. amplexifolius* var. *denticulatus*, *S. amplexifolius* var. *grandiflorus*, *S. amplexifolius* var. *oreopolus*, *S. amplexifolius* var. *papillatus*, *S. distortus*, *S. fassetii*, *Tortipes amplexifolius*, *Uvularia amplexicaulis*, *Uvularia amplexifolia*, *Uvularia distorta*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Idaho, Indiana, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

U nás se vyskytuje v Adršpašsko-teplických skalách a v Labských pískovcích. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Lodyha má délku 0,4 - 1m a větví se v horní části. Střídavé listy mají vejčitý tvar se špičkou se srdčitou objímavou bází, na vrchní straně je propadlá žilnatina, jejich délka dosahuje 7 - 12cm a šířka 3 - 6cm. Kvete zelenobílými květy na 5cm stopkách v paždí listů. Plodem je červená dužnatá bobule, kulatého a mírně protáhlého tvaru. Patří mezi vzácnější druhy C4.

Vyhovují mu pískovce, stinné vlhké lesy v půdách bohatých na živiny se zásaditým až mírně kyselým pH.

Streptopus chatterjeeanus

Streptopus koreanus

synonyma: *S. ajanensis* var. *koreanus*, *S. streptopoides* var. *koreanus*

oblasti: Čína, Korea

Streptopus lanceolatus

synonyma: *Hektorima atropurpurea*, *Hektorima dichotoma*, *Hexorima dichotoma*, *S. curvipes*, *S. lanceolatus* var. *curvipes*, *S. lanceolatus* var. *longipes*, *S. lanceolatus* var. *roseus*, *S. longipes*, *S. roseus*, *S. roseus* f. *giganteus*, *S. roseus* f. *indivisus*, *S. roseus* f. *simplex*, *S. roseus* subsp. *curvipes*, *S. roseus* subsp. *longipes*, *S. roseus* subsp. *perspectus*, *S. roseus* var. *curvipes*, *S. roseus* var. *longipes*, *S. roseus* var. *perspectus*, *Uvularia lanceolata*, *Uvularia rosea*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Labrador,

Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe jako trvalka. Kvete v paždí listů bílofialovými převisnými zvonky na stopkách.

Streptopus obtusatus

synonyma: *S. geniculatus*

oblasti: Čína

Streptopus ovalis

synonyma: *Disporum ovale*, *Disporum ovale* f. *albiflorum*, *Disporum ovale* var. *albiflorum*, *Disporum ovale* var. *tamnanum*, *Prosartes ovalis*

oblasti: Čína, Korea

Streptopus parasimplex

Streptopus parviflorus

synonyma: *S. mairei*

oblasti: Čína

Streptopus simplex

oblasti: Čína, Himálaj

Streptopus streptopoides

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Oregon, V Asie, Washington

Streptopus x oreopolus

Další informace:

<http://botany.cz/cs/streptopus-amplexifolius/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Streptopus>

<https://www.rostliny.net/>