

Cornus (Dřín)

synonyma: Afrocrania, Cynoxylon, Swida, Yinquania

čeleď: Cornaceae

Roste zejména v mírném pásu severní polokoule v podobě stálezeleného nebo opadavého keře, stromu (i byliny). Větve bývají výrazně zbarvené. Listy vyrůstají vstřícné (i střídavě) nebo ve svazečcích na koncích větví, jsou jednoduché, celokrajné a žilnatina je oblouková, směřuje ke kraji a pak podél kraje se ohýbá ke špičce. Květenstvím je terminální vrcholík, chocholík nebo hlávka, bývá opatřená 4mi nápadnými listeny, vlastní květy jsou drobné, bílé, růžové nebo žluté, oboupohlavné (i dvoudomé), 4četné, zpravidla se zákrovními listeny, kalich je obkruželovitý, baňkovitý anebo zvonkovitý. Plodem je kulovitá, vejčitá nebo eliptická peckovice obsahující podlouhlá zploštělá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ascona' - kříženec *C. florida* a *C. nuttallii*; široký keřovitý habitus; výška 6 - 7,5m; větve mírně obloukovité, rozkladité; listy na podzim červené; květenství se 4mi bílými listeny s délkou až 8cm
- 'Eddie's White Wonder' - kříženec *C. florida* a *C. nuttallii*; keřovitý nebo stromovitý habitus; větve rozložené; listy jako *C. nuttallii*, vejčité, zelené, na podzim oranžové, hnědé nebo červené; květy drobné se 4mi velkými bílými kulatými až obvejčitými překrývajícími se listeny; do -10°C
- 'Floricap' - kříženec *C. capitata* a *C. florida*
- 'KN30-8'/'Venus' - kříženec *C. kousa* a *C. nuttallii*; v 15ti letech výška 5,4m, šířka 7,5m; listy lesklé, tmavězelené; listeny bílé, mají celkově v průměru 12,5 - 15 (i 17,5)cm
- 'KN4-43'/'Starlight' - kříženec *C. kousa* a *C. nuttallii*; ve 30ti letech výška 9m, šířka 6m; listy tmavězelené; listeny široké, z části se překrývají, béžovobílé, celkově o průměru do 12,5cm
- 'Little Ruby' - kříženec *C. kousa* 'Miss Satomi' x *C. hongkongensis* 'Summer Passion'; polostálezelená až stálezelená; listeny růžové
- 'Norman Hadden' - kříženec *C. capitata* a *C. kousa*; menší rozkladitý stromovitý habitus; výška 6 - 9m; borka se odlupuje; listeny světle béžové, v létě až růžové, špičaté, vejčité až prakticky kulaté, podpírají drobné květy; plody vzhledem podobné jahodám
- 'Ormonde' - užší habitus; výška do 4m; větve vzpřímené; listy na podzim růžové až červené; listeny velké, široké, bílé (i narůžovělé), bohaté, květy červené
- 'Pink Blush' - kříženec *C. nuttallii* a *C. florida*; široký vzrůstný habitus se symetrickými vrstvenými větvemi; listy na podzim červené; listeny velké, světlorůžové nebo bílé
- 'Porlock' - kříženec *C. capitata* a *C. kousa*; rozkladitý habitus; květenství tvoří 4 béžovobílé listeny, později se mění na tmavěružové

Vyhovuje ji plné slunce a dobře propustná půda (některé druhy snáší i bahnitou).

Množí se řízkem, semeny, hřížením nebo očkováním.

Cornus alba (Svída bílá)

synonyma: *C. alba* f. *sibirica*, *C. alba* subsp. *tatarica*, *C. alba* var. *argenteomarginata*, *C. alba* var. *nitida*, *C. alba* var. *sibirica*, *C. dichotoma*, *C. hessei*, *C. mas* var. *nana*, *C. pumila*, *C. purpurea*, *C. sibirica*, *C. spaethii*, *C. subumbellata*, *C. tatarica*, *C. tatarica* var. *sibirica*, *Swida alba*, *Swida alba* var. *argenteomarginata*, *Swida alba* var. *sibirica*, *Swida hessei*, *Swida pumila*, *Swida subumbellata*, *Thelycrania alba*

oblasti: Dálněvýchodní federální okruh, Japonsko, Mongolsko, Německo, Polsko, S Čína, S Korea, Sibiř, SV Čína

Roste na Sibiři, v Číně, Japonsku a Koreji v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky (0,5 -) 1,8 - 3 (i 5)m a téměř dvojnásobné šířky. Větve jsou v mládí červené, lesklé, později hnědozelené a vzpřímené. Listy jsou vstřícné, eliptické až mírně kopinaté či široce vejčité, špičaté, přitiskle ochlupené, tmavě zelené, na podzim tmavě fialové, mírně svrasklé, dlouhé (3 -) 4 - 8 (i 10)cm, báze klínovitá, spodní strana sivě zelená a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 2,5cm. Květenstvím je vrcholík o průměru 3,5 - 8cm, vlastní květy jsou bílé nebo nažloutlé (i narůžovělé). Plodem je bílá až namodralá eliptická peckovice o průměru 5 - 8mm obsahující zploštělou zašpičatělou eliptickou pecku. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Argenteomarginata' - panašované listy se širokým bílým okrajem
- 'Aurea' - větve v zimě červené; listy v mládí žlutozelené
- 'Elegantissima' - tmavě růžovofialové větve; listy šedozelené, okraje krémové
- 'Gouchaultii' - žluté skvrny na listech
- 'Hessei' - svrasklé listy, na podzim hnědnou
- 'Kesselringii' - větve tmavě červené
- 'Sibirica' - větve i listy červené
- 'Sibirica Variegata'
- 'Spaethii' - listy žlutě panašované; květy tmavě červené

Dobrého efektu docílíte tak, že se provádí řez na výšku 10 - 20cm nad zemí. Vyhovuje jí kyselá až neutrální půda, ideálně vlhká a plně slunce nebo polostín. Nevadí jí ani mírné podmáčení. Je mrazuvzdorná do -40°C.

Množí se dřevitými řízkami.

Cornus alternifolia (Svída střídavolistá)

synonyma: *Bothrocaryum alternifolium*, *C. alterna*, *C. alternifolia* f. *ochrocarpa*, *C. alternifolia* var. *corallina*, *C. alternifolia* var. *ochroleuca*, *C. alternifolia* var. *virescens*, *C. plicata*, *C. punctata*, *C. riparia*, *C. riparia* var. *rugosa*, *C. rotundifolia*, *C. undulata*, *Swida alternifolia*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky v podobě keře nebo stromu s více kmeny a rozkladitou kulovitou patrovitou korunou. Dorůstá výšky i šířky 4 - 6 (i 8)m. Větve jsou v mládí zelené až zelenorůžovofialové, v zimě tmavé, lesklé, růžovofialové s bílými až šedými lenticelami, později je borka šedá a hladká. Listy jsou střídavé, vejčité nebo obvejčité, špičaté, lesklé, tmavězelené, na podzim růžovofialovočervené, dlouhé 5 - 12,5cm, široké 2,5 - 6,5cm, báze klínovitá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek, spodní strana namodralá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenství je 1/2kulaté nebo zploštělé, průměru 3 - 10cm, vlastní květy jsou drobné, bílé (i světlebéžové), průměru 9mm, mají 1 - 3mm stopku, kališní lístky jsou dlouhé 0,2mm a korunní lístky jsou dlouhé 3 - 4mm. Plody jsou modročerné až černé (i žluté), ojnělé, velikosti 6 - 8mm a má červenou stopku. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Argentea'/'Variegata' - výška 3 - 4 (i 4,5)m; větve vodorovné; listy tmavězelené, okraje bílé nebo světlebéžové, dlouhé do 9cm; pomalejší růst
- 'Corallina' - kmínky v zimě výrazněji červené
- 'Golden Buillon' - v 10ti letech výška i šířka 2,4 - 3m; listy žluté, později kartouzové
- 'Golden Shadows'/'W. Stackman' - výška i šířka 6m; listy velké, tmavězelené, kartouzové nebo

žlutozelené okraje až po 60 - 70% plochy, střed zelený

- 'Ochrocarpa' - plody žluté až žlutobílé
- 'Silver Giant' - šedozeleň listy s tenkým stříbrobílým okrajem a šedozeleň středem
- 'Umbraculifera' - koruna zploštělá
- 'Virerscens' - větve v mládí nazelenalé bez načervenaní
- 'Winter Gold' - kmínky v mládí nažloutlé; listy mírně žlutopestré
- 'Winter Orange' - borka a mladé větve oranžové

Vyhovuje jí vlhká kyselá až neutrální půda bohatá na živiny, polostín anebo plné slunce. Nesnáší sucho.

Cornus amomum (Svída modroplodá)

synonyma: *C. amomum* var. *schuetzeana*, *C. atrata*, *C. coerulea*, *C. cyanocarpus*, *C. cyanocarpus* var. *albescens*, *C. ferruginea*, *C. ferulacea*, *C. ferulifolia*, *C. ignorata*, *C. lanuginosa*, *C. mexicana*, *C. minor*, *C. oblongifolia*, *C. polygama*, *C. rubiginosa*, *C. sericea* var. *schuetzeana*, *Swida amomum*, *Thelycrania amomum*

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě rozkladitého výběžkatého keře. Dorůstá výšky 2,4 - 4m. Větve jsou v mládí růžovofialovohnědé, nazelenalé, později hnědé až šedohnědé s hnědou dřeví. Listy jsou eliptické až vejčité nebo kopinaté, špičaté, zelené, řídce ochlupené, dlouhé 5 - 12cm, široké 2,5 - 6cm, báze špičatá, zakulacená nebo klínovitá, žilky mohou být narůžovofialovělé, spodní strana je bledší, ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů ochlupených žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 2cm. Květenství je husté, průměru 4 - 6cm, zpravidla ploché, má plstnatou stopku, vlastní květy jsou drobné, béžové až žlutobílé, má 2 - 5mm stopku, kališní lístky délky do 2mm a korunní lístky jsou dlouhé 4 - 5mm. Plody jsou šedomodré až modré (i z části bílé) seskupené do malých svazečků, kulovité a průměru 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *amomum*/*Swida amomum* (Svída modroplodá pravá)
- 'Blue Cloud' - výška 1,8 - 2,4m; plodenství bohaté, plody modré
- 'Cinderella' - listy mají široky asymetricky béžový okraj
- 'Indigo'
- subsp. *obliqua*/*C. obliqua*/*C. purpusii*/*Swida obliqua*/*Swida purpusii*/*Thelycrania purpusii*
- 'Sparkling' - mladé větve v zimě žlutozelené; plody bílé
- var. *undulifolia*

Vyhovují jí okraje řek.

Cornus asperifolia

synonyma: *C. foemina* subsp. *microcarpa*, *C. microcarpa*, *C. sericea* var. *asperifolia*, *C. stricta* var. *asperifolia*, *Swida asperifolia*, *Swida microcarpa*, *Thelycrania asperifolia*, *Thelycrania microcarpa*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína

Roste v USA v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky do 4m. Kmínky, listy a pupeny jsou ochlupené. Větve jsou v mládí řídce drobně draslavé, zelené, později šedé, občas načervenalé. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté, šedozeleň, z obou stran draslavé, dlouhé 3 - 7,5cm, široké 2

- 4cm, báze klínovitá, spodní strana nepatrně světlejší, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé do 5mm. Květenství má průměr 2 - 5cm, seskupené zpravidla do 2 skupin po 4 větvích, mají 1 - 3mm stopku, kališní lístky délky 0,5mm a korunní lístky délky 2,5 - 3mm. Plodem je světlemodrá peckovice průměru 5mm.

Cornus australis (Svída jižní)

synonyma: *C. sanguinea* subsp. *australis*, *Swida australis*

oblasti: Írán

Patří mezi silně ohrožené druhy C2. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *koenigii*

Cornus austrosinensis

synonyma: *Swida austrosinensis*

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 6m. Větve jsou v mládí řídce ochlupené, později jsou žlutohnědé. Listy jsou vstřícné (i střídavé), mírně kožovité, eliptické, mírně podvinuté, zašpičatělé, dlouhé 4 - 8cm, široké 2 - 4cm, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 4 - 5 žilek. Květenství má šířku 5 - 6cm, květy mají 3 - 4mm stopku, vlastní květy jsou drobné, bílé, průměru 7mm. Plody jsou černé, kulaté, průměru 5mm, pecka má délku 4mm a šířku 3mm.

Cornus bretschneideri (Svída Bretschneiderova)

synonyma: *C. aspera*, *C. bretschneideri* var. *crispa*, *C. bretschneideri* var. *gracilis*, *Swida aspera*, *Swida bretschneideri*, *Swida bretschneideri* var. *crispa*, *Swida bretschneideri* var. *gracilis*

oblasti: S Čína

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6m. Větve jsou v mládí ochlupené, v zimě nažloutlé až žlutočervené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou vejčité, eliptické nebo podlouhlé, špičaté až ocasovité, zvlněné, zelené, dlouhé 5 - 10cm, spodní strana šedozelená až šedobílá, ochlupená, mírně drsná a žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek. Květenstvím je vrcholík průměru 4 - 10cm a vlastní květy jsou smetanové. Plody jsou modročerné až černé, průměru 4 - 6mm a obsahují vejčitékulovitou pecku. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bretschneideri*/var. *gracilis*/*Cornus sapéra*/*Swida bretschneideri* - listy na horní straně krátce ochlupené; květenství přitiskle ochlupené

- var. *crispa* - listy na spodní straně dlouze zkadeřeně ochlupené; květenství hustě dlouze zkadeřeně ochlupené

Cornus canadensis (Svída kanadská)

synonyma: *Arctocrania canadensis*, *Chamaepericlymenum canadense*, *Chamaepericlymenum canadense* f. *purpurascens*, *Cornella canadensis*, *C. canadensis* f. *albomacula*, *C. canadensis* f. *alpestris*, *C. canadensis* f. *aphylla*, *C. canadensis* f. *bifoliata*, *C. canadensis* f. *connatifolia*, *C. canadensis* f. *dutillyi*, *C. canadensis* f. *elongata*, *C. canadensis* f. *florulenta*, *C. canadensis* f. *foliolosa*, *C. canadensis* f. *infraverticillata*, *C. canadensis* f. *medeoloides*, *C. canadensis* f. *ornata*, *C.*

canadensis f. purpurascens, C. canadensis f. ramosa, C. canadensis f. rosea, C. canadensis f. secunda, C. canadensis f. semivirescens, C. canadensis f. virescens, C. canadensis f. viridis, C. canadensis subsp. pristina, C. canadensis var. alpestris, C. canadensis var. dutillyi, C. cyananthus, C. fauriei, C. herbacea var. canadensis, C. suffruticosa, Cynoxylon canadense, Eukrania canadensis, Eukrania cyananthus

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Čína, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Japonsko, Jižní Dakota, Kolorado, Korea, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Rusko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Severní Americe, Japonsku, Koreji, Číně a Rusku jako bylina v polštářových porostech. Dorůstá výšky (7 -) 10 - 20 (i 30)cm. Stonky vyrůstají z podzemních oddenků. Listy vyrůstají v 4 (i 6)tičetných přeslenech, jsou eliptické, vejčité, obvejčité, kopinaté nebo kosníkovité, špičaté, celokrajné, na podzim červené až hnědočervené, dlouhé 2 - 6,5cm, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek. Květenství je 15 - 30tičetné, široké 1 - 1,5cm, opatřené 4mi bílými listeny délky 0,8 - 1,2cm, šířky 0,5 - 1,1cm, celkovým průměrem do 8cm, květy mají 1 - 1,5mm stopku, kališní lístky 3úhlé, dlouhé 0,4mm, korunní lístky bílé, nažloutlé nebo narůžovofialové, vejčité kopinaté a dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem jsou oranžové až červené peckovice průměru 5 - 8mm a obsahují vejčité pecky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. purpurascens/f. rosea/*Chamaepericlymenum canadense* f. purpurascens - Kanada, Newfoundland, Maine, Aljaška, Japonsko; listeny zákrovu narůžovofialové

Vyhovuje jí vlhká až mokrá kyselá půda.

Cornus capitata (Dřín hlavatý)

synonyma: *Benthamia capitata*, *Benthamia fragifera*, *Benthamida capitata*, *Benthamidia capitata*, *Benthamidia capitata* f. *grandis*, *Benthamidia capitata* var. *khasiana*, *C. capitata* subsp. *emeiensis*, *C. capitata* var. *khasiana*, *Cynoxylon capitatum*, *Cynoxylon glabriusculum*, *Cynoxylon yunnanense*, *Dendrobenthamia capitata*, *Dendrobenthamia capitata* var. *emeiensis*, *Dendrobenthamia emeiensis*

oblasti: Bhútán, Guizhou, Himálaj, Hubei, Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Himálaji, Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru a Nepálu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky (10 -) 12 - 20m, ale růst je pomalý. Borka je šedohnědá až šedočerná. Větve jsou v mládí ochlupené, později šedohnědé a široce obloukovité. Listy jsou vstřícné, kožovité, vejčité až kopinaté nebo eliptické, špičaté, tmavězelené až šedozelelé, mohou být lesklé, dlouhé (3,5 -) 4 - 7,5 (i 12)cm, široké (1,3 -) 1,5 - 3 (i 5)cm, báze klínovitá, spodní strana bělavá nebo namodralá a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,1cm. Květenstvím je malá 50 - 100četná hlávka se 4 - 6ti bílými až žlutými obvejčitými, obkopinatými až prakticky kulatými listeny délky 3,5 - 6,2cm, šířky 2,3 - 5cm, vlastní květy jsou drobné, kalich trubkovitý se 4mi malými tupými zuby, vně ochlupený, korunní lístky podlouhlé hrotité a dlouhé (2 -) 3 - 4mm. Plody jsou červené až červenooranžové, ochlupené, tlusté 1,5 - 4cm, pecky eliptické, dlouhé 0,8 - 1cm a široké 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *angustata*/*Cornus angustata* - Čína; stálezelený strom nebo keř; výška 4 - 12m; borka šedá až šedohnědá; větve v mládí šedozelelé, ochlupené (i plstnaté), později šedohnědé; listy z obou stran šedozelelé, eliptické, mírně obvejčité až kopinaté, ocasovité, kožovité, dlouhé 7 - 12cm, široké 2 - 5cm, spodní strana ochlupená, báze klínovitá; květenství 55 - 90tičetné, průměru 0,8 -

- 1,2cm, listeny nažloutlé až bílé, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 0,9 - 2,2cm, korunní lístky vejčité, dlouhé 2,8mm; plodenství červené, kulovité, dlouhé 1,5 - 2,5cm, bíle ochlupené
- var. *angustata*/subsp. *angustata*/C. *kousa* var. *angustata*/Benthamia *japonica* var. *angustata*/Cynoxylon *ellipticum*/Dendrobenthamia *angustata*/Dendrobenthamia *angustata* var. *wuyishanensis*/Dendrobenthamia *hupehensis*/Dendrobenthamia *wuyishanica* - mladé větve, spodní strana listů a listeny bíle přitiskle ochlupené
 - 'Elsbry'/'Empress of China' - vodorovný habitus; v 10 - 12ti letech výška do 4m; listy tmavězelené; listeny bohaté, bílé
 - 'First Choice' - výška 5m, šířka 3m; listy v zimě zelené
 - var. *mollis*/var. *hypoleuca*/var. *mollis*/Benthamia *capitata* var. *mollis*/Dendrobenthamia *angustata* var. *mollis* - Sichuan, Yunnan, Hubei; mladé větve, spodní strana listů a listeny plstnaté
 - 'Ticrn'/'Prodigy' - výraznější zimní barva listů; bohaté květy
 - subsp. *emeiensis*/var. *emeiensis* - Sichuan; listy v mládí lesklé, oranžové nebo naoranžovělé; mrazuvzdornější
 - 'Mountain Moon' - prakticky identická
 - 'Ragdoll' - listy tmavě sivozelené s asymetrickým žlutozlatým okrajem
 - 'Summer Passion' - listy v mládí narůžovofialovělé až hnědočervené

Cornus chinensis (Svída čínská)

synonyma: C. *chinensis* f. *jinyangensis*, C. *chinensis* f. *longipedunculata*, C. *chinensis* f. *microcarpa*, *Macrocarpium chinense*, *Macrocarpium chinense* f. *jinyangense*, *Macrocarpium chinense* f. *longipedunculatum*, *Macrocarpium chinense* f. *microcarpum*

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 8m. Borka je tmavěhnědá. Listy jsou vejčitékopinaté až eliptické, špičaté, dlouhé 6 - 14 (i 25)cm, široké 2,8 - 6,5cm, báze kulatá, spodní strana řídce ochlupená a žilnatinu tvoří 5 - 6 žilek. Květenství je úžlabní, vlastní květy žluté, listeny vejčité až eliptické, mohou být kožovité, dlouhé 6 - 7mm, vlastní květy mají 8 - 9mm stopku, korunní lístky kopinaté a dlouhé 4mm. Plody jsou růžovofialovočerné až černé, eliptické, dlouhé 0,6 - 1cm, široké 3 - 4mm a obsahují eliptické pecky délky 7 - 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Jinyangense'

Cornus controversa (Svída sporná)

synonyma: *Bothrocaryum controversum*, *Bothrocaryum longipetiolatum*, C. *brachypoda*, C. *controversa* var. *alpina*, C. *controversa* var. *angustifolia*, C. *controversa* var. *shikokumontana*, C. *obovata*, C. *sanguinea*, *Swida controversa*, *Swida controversa* var. *alpina*, *Swida controversa* var. *shikokumontana*

oblasti: Bhútán, Japonsko, Korea, Nepál, Sikkim, SV Čína, V Čína, V Himálaj

Roste v Japonsku, Číně, Nepálu, Indii a Bhútánu v podobě stromu se široce rozkladitou válcovitou korunou. Dorůstá výšky i šířky (3 -) 8 - 15 (i 20)m. Větve vyrůstají patrovitě v přeslenech, v mládí jsou narůžovofialovělé až černofialové, později zelené, mohou být řídce ochlupené, pupeny vejčité, tupé, dlouhé 5 - 9mm a šupiny vejčité, tupé, červenohnědé a lesklé. Borka je tmavěšedá až žlutošedá. Listy jsou střídavé, v mládí svěže zelené, později tmavězelené až našedlé, na zimu růžovofialové, vejčité až eliptické, špičaté, lesklé, dlouhé (3 -) 5 - 15cm, široké (1,5 -) 5 - 8cm, báze zpravidla zakulacená, spodní strana namodralá nebo šedozeleňá, řídce ochlupená až holá a řapíky jsou dlouhé 2 - 6cm. Kvete smětanově bílými květy o průměru 1,2cm v 5 - 15 (i 18)cm širokém

plochém vrcholíku, kališní cípy bývají drobné, špičaté, korunní lístky kopinaté, dlouhé 5 - 6mm a široké 1,7 - 2mm. Plody jsou modročerné až růžovofialovočervené průměru 6 - 8mm, pecky zploštělé délky 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Candle Light' - listy v mládí žluté, později zelené
- 'Frans Type'/'Frans'/'Variegata Frans Type' - listy šedozelené s úzkým bílým okrajem
- 'GrY-C' - listy v mládí žluté, později zelené
- 'Hakkouda-no-kagayaki' - listy na jaře žlutozelené, později zelené, ve středu tmavší zelená
- 'Janine' - listy na okraji žluté, v létě vybledávají
- 'June Snow' - výška do 9m, šířka 12m; nápadné patrovitě horizontální větvený; větve v zimě načervenalé; listy na podzim žluté, červené, oranžové nebo růžovofialové; květy bílé
- 'Kansetsu' - listy úzké, na okraji bíle stříkané, střed tmavězelený
- 'Pagoda' - keřovitý až stromovitý habitus; výška do 10m; více výrazný patrovitě habitus; květy béžovobílé
- 'Rag Doll'
- 'Variegata'/C. brachypoda 'Variegata' - větve vodorovné; výška 4 - 6m; bílé až narůžovělé okraje listů, pestrost z 30 - 45%, podzimní barva žlutá; pomalý růst

Vyhovují jí vlhké listnaté a smíšené lesy s kyselou až neutrální dobře propustnou živnou půdou v polostínu až plném slunci. Je náchylnější na pozdní mrazíky. Je mrazuvzdorná do -30°C. Nesnáší podmáčená místa.

Cornus coreana (Svída korejská)

oblasti: Čína, Korea

Roste v Číně a Koreji v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky do 20m. Borka je bleděhnědá. Větve jsou v mládí ochlupené, později hnědé. Listy jsou vstřícné, eliptické až vejčité, špičaté, dlouhé 6 - 8cm, široké 1,7 - 4cm, báze klínovitá až zakulacená (i zkosená), spodní strana ochlupená, má 4 - 5 žilek a řapíky délky 1,2 - 2cm. Květenství má průměr 3,5 - 8cm, květy mají 2 - 4mm stopku a vlastní květy jsou bílé průměru 5mm. Plody jsou kulovité průměru 5mm.

Cornus darvasica

synonyma: Swida darvasica, Thelycrania darvasica

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě vysokého větveného keře. Větve jsou v mládí mírně 4hranné, zelené, později hnědorůžovofialové, ochlupené a pupeny jsou špičaté a ochlupené. Borka je šedohnědá. Listy jsou vstřícné, zelené, oboustranně ochlupené, vejčité až prakticky kulaté nebo eliptické, zakulacené nebo zašpičatělé s hrotem, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenství je husté, dlouhé 2cm, široké 4cm, zploštělé nebo mírně vypouklé, má 1,6 - 3,5cm stopku, kališní cípy kopinaté, špičaté, dlouhé 0,7 - 1,3mm, korunní lístky kopinaté, špičaté a dlouhé 5 - 6mm. Plody jsou kulovité, pecka dlouhá 5 - 6mm a široká 5,5mm.

Cornus disciflora

synonyma: Benthamia disciflora, Benthamia grandis, Benthamidia disciflora, Benthamidia disciflora var. floccosa, C. capitata, C. disciflora f. floccosa, C. disciflora var. floccosa, C. disciflora var. floccosa, C. floccosa, C. grandis, Cynoxylon disciflorum, Cynoxylon floccosum, Cynoxylon grande, Discocrania disciflora, Discocrania floccosa

oblasti: Guatemala, Honduras, Kostarika, Mexiko, Panama, Salvador

Roste od Mexika po Panamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 6 - 22m při průměru kmene do 40cm. Borka je bleděhnědá až naředlá, mírně drsná. Větve jsou v mládí ochlupené, zelené nebo červené, později šedé. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, kožovité, dlouhé 6 - 15cm, široké 2 - 6cm, báze špičatá až klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je 12 - 25tičetná dlouze stopkatá hlávka průměru 1 - 1,5cm, květy mají kalich délky 2mm, laloky tupé, korunní lístky bělavé až zelenožluté a dlouhé 3 - 3,5mm. Plody jsou eliptické, dlouhé 1,2 - 1,4cm, tmavěčervené až tmavě růžovofialové. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *floccosa*/var. *floccosa* - listy na spodní straně krátce plstnaté, zpravidla rezavé

Cornus drummondii (Svída drsnolistá)

synonyma: *C. asperifolia* var. *drummondii*, *C. drummondii* f. *priceae*, *C. priceae*, *C. stricta*, *Swida drummondii*, *Swida priceae*, *Thelycrania priceae*

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Wisconsin

Roste v USA v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 6 - 15m. Větve jsou drsně ochlupené, v mládí zelené, později hnědočervené a dřev je hnědá. Listy jsou vejčité až kopinaté, špičaté, drsné, šedozelené, dlouhé 4 - 12cm, široké 2 - 7cm, báze klínovitá, uťatá nebo srdčitá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je řídký vrcholík průměru 4 - 8cm, vlastní květy jsou žlutobílé, mají 1,5 - 4mm stopku, kališní lístky délky 0,8 - 1mm a korunní lístky délky 4 - 4,5mm. Plody jsou kulovité, průměru 5 - 6mm a obsahují semena délky 1 - 2mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Lemon Drops' - květy žlutooranžové; plody žluté až růžovočervenofialové

Cornus excelsa

synonyma: *C. lanceolata*, *C. pubescens*, *C. toluensis*, *Swida excelsa*, *Swida lanceolata*, *Swida toluensis*, *Thelycrania excelsa*, *Thelycrania lanceolata*, *Thelycrania toluensis*

oblasti: Guatemala, Honduras, Mexiko

Roste v Mexiku, Hondurasu a Guatemale v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 9m při průměru kmene do 15cm. Větve jsou šedé, rezavé, hnědé nebo narůžovofialové a v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, špičaté, zelené, dlouhé 5 - 12cm, široké 2,5 - 5cm, báze tupá nebo zakulacená či prakticky srdčitá, spodní strana světlejší, může být ochlupená, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je vrcholík průměru 1,5 - 3cm, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, korunní lístky bílé, dlouhé 3,5 - 4,5mm. Plody jsou bílé až světlemodré průměru 5 - 8mm.

Cornus eydeana

Cornus florida (Dřín květnatý)

synonyma: *Benthamia florida*, *Benthamidia florida*, *Benthamidia florida* f. *pendula*, *Benthamidia florida* f. *pluribracteata*, *Benthamidia florida* f. *rubra*, *Benthamidia florida* f. *xanthocarpa*, *Benthamidia florida* var. *pendula*, *Benthamidia florida* var. *rubra*, *C. candidissima*, *C. florida* f. *pluribracteata*, *C. florida* f. *purpurea*, *C. florida* f. *rubra*, *C. florida* f. *xanthocarpa*, *C. florida* var. *pendula*, *C. florida* var. *rosea*, *C. florida* var. *rubra*, *C. florida* var. *xanthocarpa*, *Cynoxylon floridum*, *Cynoxylon floridum* var. *pendulum*, *Cynoxylon floridum* var. *rubrum*, *Swida candidissima*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, SV Mexiko, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste v Kanadě, USA a Mexiku v podobě rozložitého opadavého keře nebo stromu s protáhlou korunou. Dorůstá výška 3 - 5 (i 12)m, u nás spíše pouze keř výška 3 - 5m. Větve jsou v mládí zelené, později hnědé, v mládí zpravidla ojíněné a ochlupené. Borka je šedá. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté, na podzim červené až fialové, dlouhé (5 -) 6 - 15cm, široké (2 -) 6 - 7 (i 8)cm, spodní strana bělavá, podél žilek ochlupené, báze klínovitá, zakulacená, zpravidla asymetrická, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 (i 2)cm. Květenstvím je 20 - 30tičetná hlávka průměru 1,2 - 2cm, má 4 bílé až narůžovělé či načervenalé obvejčité až vejčité listeny délky 4 - 5 (i 15)cm, šířky 2,5 - 4,5cm, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2mm, korunní lístky podlouhlé, žlutozelené, dlouhé 3,5 - 4mm, široké 1,2 - 1,5mm. Plody jsou eliptické až vejčité, červené, dlouhé 1 - 1,5cm a pecka má délku 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Abundance' - vzpřímený silný habitus; bohaté květenství
- 'Alba Plena' - má 6 - 9 bílých listenů
- 'Allegan' - květy mrazuvzdorné
- 'American Beauty' - listy tmavězelené, lesklé, mírně narůžovofialovělé; listeny tmavěčervené, u báze bleší až bílé
- 'Amerika Touch-O-Pink' - listy větší; listeny šířka až 15cm, okraje narůžovělé
- 'Andrea Hart'/'Andy Heart' - menší, hustější; výška 1,8 - 2,4m; listeny růžové
- 'Angel Wings' - listeny velké, bílé
- 'Appalachian Blush' - listeny bílé s růžovými okraji
- 'Appalachian Mist' - listeny béžovobílé, překrývající se, rozštěpené listeny červenorůžovofialové
- 'Appalachian Spring' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, na podzim červené; květenství bohaté, květy mají bílé listeny se nepřekrývají
- 'Apple Blossom' - listeny bledě růžové, zejména na vrcholu a okraji
- 'Ascending' - vzpřímený habitus; větve odstávají od kmene v úhlu 30°
- 'Aurea' - listy na jaře žluté, náchylné na popálení sluncem
- 'Autumn Gold' - kmínky v zimě žluté až oranžové; listeny široké, bílé; plody červené
- 'Barton' - listeny široké, bílé
- 'Barton's White' - listeny bílé, kvete již v mládí
- 'Belmont Pink' - listeny světlorůžové
- 'Big Bouquet' - kompaktní habitus; květenství bohaté, listeny široké a bílé
- 'Big Giant' - široce rozkladitý habitus; listy žluté až kartouzové, na podzim žluté, oranžové nebo červené; listeny široké, bílé
- 'Big Girl' - listeny bílé, velké
- 'Blonde Luster' - listy žlutozelené až kartouzové, náchylné na popálení sluncem, podzimní barva žlutá, oranžová nebo červená; listeny široké, rýhované
- 'Bonnie' - průměr květenství 15cm, listeny bílé; plody červené
- 'Clear Moon'
- 'Cloud 9'/'Cloud Nine' - bohatě kvete již v mládí, listeny bílé, široké, překrývající se; patentována
- 'Cochise' - růžová forma
- 'Compacta' - menší habitus, přírůstky krátké

- 'Crimson Curls' - listeny malé, růžové, nadvinuté
- 'Daniela' - listy žlutopestré, na podzim oranžové, žluté nebo červené
- 'Daybreak'/'Cherokee Daybreak' - vzpřímený habitus; listy zelené až šedozelené s asymetrickým béžovobílým až žlutozeleným, později světlerůžovým okrajem, na podzim růžové až růžovočervené
- 'De Kalb Red' - nízký habitus; listy tmavě růžovofialovočervené, méně zkroucené
- 'Dixie Collonade'/'Dixie Colonnade' - sloupovitý habitus; výška 6,6m, šířka 2,4m
- 'Donnewell'
- 'Eternal Dogwood'/'Eternal' - vytváří 12 - 20 bílých listenů; patentována
- 'Fastigiata' - úzce vzpřímený habitus, ve stáří postranní větve mírně rozkladité
- 'Fayetteville Columnar' - mírně sloupovitý habitus; pomalý růst
- 'Firebird' - listy s asymetrickými bílými okraji, v mládí tmavěčervené, růžové; květy tmavěrůžové
- 'First Lady' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené až žlutozelené s jasným žlutým až žlutozeleným okrajem, na podzim červené až růžovofialovohnědé, růžové či žlutozelené; květenství řídkší, listeny bílé
- 'Flower Chief'
- 'Fragrant Cloud' - výška více než 3m; květy mírně aromatické, listeny bílé
- 'George Henry Ford' - výška do 3m; listy zelené, žlutopestré, na podzim červenooranžové až tmavěčervené
- 'Geronimo' - mladé části červené
- 'Gigantea' - květenství průměru do 15cm, listeny bílé
- 'Gold Braid' - vzpřímený kuželovitý habitus; listy se žlutými okraji; listeny béžovobílé, vzácné
- 'Golden Nuggett'/'Gold Nuggett'/'Golde Nuggett' - listy zelené s bronzovožlutým až tmavěžlutým okrajem; květy bílé
- 'Green Glow' - vzpřímený větvený habitus; listy mírně větší, světlezelené s tmavším okrajem, na podzim tmavěčervené; květenství bohaté, listeny bílé
- 'Heistar'
- 'Hillenmeyer'/'Hillenmyer White' - květenství bohaté, listeny bílé
- 'Hohmann's Golden'/'Hohman's Golden' - rozkladitější habitus; výška do 1,8m; listy zelené až žlutozelené, na podzim růžové až tmavěčervené
- 'Cherokee Brave'/'Comco No. 1' - listy velké, zelené, v mládí načervenalé až narůžovofialovělé; listeny růžovofialovočervené až růžové, na bázi růžové až bílé; patentována
- 'Cherokee Chief' - listy v mládí načervenalé; listeny tmavěčervené
- 'Cherokee Princess' - vzpřímený až rozkladitý hustý habitus; listy zelené, na podzim červené; listeny dlouhé 12,5cm, bílé
- 'Cherokee Sunset' - rašící listy růžovočervenozelelé, v létě žlutozelené až zelené, na podzim růžové, červené nebo růžovofialové; květy červené
- 'Imperial White' - široký vzrůstný habitus; listy větší; květenství průměru do 15cm, listeny velké, bílé
- 'Irving Cline'
- 'Jean's Appalachian Snow' - listy žlutozelené, na podzim červené, listeny bílé, překrývající se, dlouhé 5,8cm, korunní lístky zelené; odolná na padlí; patentována
- 'Jeassica's Bouquet' - bohaté květenství, listeny menší
- 'Juanita' - květenství průměru do 12,5cm
- 'Junior Miss Variegated' - vzpřímený habitus; výška do 3m; listy béžově, bílé až žlutě skvrnitě a proužkované, v mládí narůžovělé; listeny ve středu tmavěrůžové, okraje světlejší
- 'Karen's Appalachian Mist' - listy žlutozelené, na podzim červené; listeny široké, nepřekrývající se, na okraji narůžovělé, dlouhé 5,3cm; odolná na padlí; patentována
- 'Kay's Appalachian Mist' - listy žlutozelené, na podzim červené; listeny béžovobílé, velké, žebnaté, mírně překrývající se; patentována
- 'Kingsville Form'/'Kingsville' - jako 'Welchii', výrazněji vybarvená
- 'Lanham's Little Broom' - menší kompaktní habitus; v 5ti letech výška do 90cm, šířka 60cm; listy husté; zřídka kvetoucí
- 'Lemon Drops' - listy na okraji mírně zvlněné, žluté; listeny široké, bílé, žebrované; plody červené
- 'Little Princess' - výška i šířka do 2,4m

- 'Magnifica' - květenství více než 10cm; listeny bílé
- 'Mary Ellen' - kvete chudě, listeny plné, bílé
- 'Miss Marion' - listeny plné, bílé
- 'Montpelier' - listeny plné
- 'Moon' - květenství bohaté, listeny velké
- 'Moonglow'/'Chiaro di Luna' - vzpřímený habitus; listy žluté; květenství chudší, květy bílé
- 'Mr. Theodore' - listy velké, lesklé
- 'Mystery' - kompaktní habitus; listeny bílé, občas s tmavěružovými skvrnami
- 'New Hampshire'
- 'October Glory' - listy na podzim červené; listeny růžové
- 'Ozark Spring' - vzpřímený habitus; listeny bílé, překrývající se; květy mrazuvzdorné
- 'Pacific Gold' - listy žluté
- 'Pendula' - kaskádovitý habitus, větve převislé; širší než vysoký; listy mírně deformované; různá intenzita kvetení
- 'Peve Rhode' - listeny růžové
- 'Phillips Pink No. 1' - květenství bohaté, až 8 listenů v barvě růžové, mírně zvlněné
- 'Pink Autumn' - listy na jaře červené, později béžovožluto pestré, náchylné na popálení sluncem; listeny tmavěružové
- 'Pink Blush' - listy při rašení načervenalé; listeny světlorůžové
- 'Pink Flame' - rychlejší silný růst; listy s béžovobílými okraji, rašící tmavě růžovočervené, na podzim červené až tmavě červenorůžovofialové; listeny růžové; patentována
- 'Pink Princess' - listy větší s bílým okrajem a tmavězeleným středem; listeny růžové
- 'Pink Sachet' - listy v mládí bronzové; listeny růžové, květy aromatické
- 'Plena' - květenství má 6 - 13 listenů, některé zakrnělé či zkroucené
- 'Pluribracteata' - květenství má 6 - 8 listeny, některé mírně zkroucené
- 'Poinsett' - široce rozkladitý habitus; listy tmavěčervené; plody žluté
- 'Prairie Pink' - květy růžové
- 'President Ford'/'G. H. Ford' - listy žlutozeleně pestré, na podzim červené, žlutě kropenaté
- 'Presidential' - bílá forma; odolnost na padlí
- 'Prosser Red' - listy v mládí načervenalé; listeny malé, růžové, květy červené
- 'Pumpkin Patch' - kmínky v zimě oranžové; listy na podzim oranžové
- 'Purple Glory' - listy v mládí růžovofialové, později zelenající; listeny tmavěružové až červené, úzké, mírně zkroucené
- 'Purple Splendor' - listy tmavě červenorůžovofialovohnědozelené, lesklé
- 'Pygmaea' - kulovitý habitus; po mnoha letech výška 1,8m
- 'Pygmy' - kompaktní menší habitus; výška občas i 2,1m, šířka 3m; květenství bohaté, květy bílé, listeny malé
- 'Red Giant' - listy v mládí do bronzova; listeny velké, červené až růžové, špičky bledší
- 'Red Pygmy' - kompaktní habitus; výška 1m; bohaté květenství, listeny tmavěružové, mírně zkroucené
- 'Reddy' - listeny růžové
- 'Redleaf' - listy v mládí červené; listeny růžové
- 'Rich Red' - listeny růžové
- 'Richland' - listy na podzim tmavěčervené; květy bílé
- 'Robert's Pink' - vzrůstný habitus; listeny růžové
- 'Rose Valley' - listeny bleděružové
- 'Royal Red' - listy při rašení růžovofialovočervené, na podzim červené; listeny červené až tmavěčervené
- 'Rutman'/'Wonderberry' - zakrslý habitus; listeny bílé, špičky načervenalé; plody velké, válcovité, červené; patentována
- f. rubra/'Rubra' - listy v mládí červené, později zelené; listeny světle až tmavěružové nebo červené
- 'Salicifolia' - listy úzké, vrbovité
- 'September Dog' - kvete až v září

- 'Shadow's Littleleaf' - listy dlouhé 2,5cm, široké 9mm; květenství průměru 5cm
- 'Shadow's Plena' - až 8 velkých listenů
- 'Snow Princess' - listy tmavězelené, lesklé; listeny bílé
- 'Spring Grove' - ve 45ti letech výška 7m, šířka 9 - 10m; listy na podzim červené; květenství bohaté, široké 10 - 12,5cm, listeny bílé; patentována
- 'Spring Song' - listy vejčité, špičaté, na podzim červené a růzovofialové; listeny růžové až růzovočervené
- 'Springtime' - větve vodorovné; listy na spodní straně narůzovofialovělé; listeny široké až 12cm, překrývající se
- 'Steele's Fastigiata' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené; listeny velké
- 'Sterling Silver' - listy běžovopestré
- 'Stoke's Pink' - vzrůstný habitus; listeny růžové
- 'Sunset' - listy žlutopestré se žlutým okrajem a červeným pruhem na špičce, na podzim hnědočervené; listeny tmavěružové až růzovofialovočervené; patentována
- 'Sunset Aurea' - listy žluté; listeny tmavěružové
- 'Super Dogwood' - mohutný vzrůstný habitus; v 18ti letech výška 8,4m, šířka 6,6m, průměr kmene do 30cm; listeny světleběžové, na okraji narůzovělé
- 'Suwanee Squat' - nízko rozkladitý habitus; výška 1,8m, mírně širší; listy tmavězelené
- 'Sweet Charlotte' - listeny bílé
- 'Sweetwater Red' - vzpřímený habitus; listy v mládí načervenalé, na podzim růzovofialovočervené; listeny tmavěčervené nebo červenorůžové
- 'Tricolor' - listy zelené, na okraji běžovobílé, narůzovělé, na podzim bronzové až růzovofialové, okraje červené
- subsp. *urbiniana* - listeny bílé, čárkovité, zpravidla špičaté, široké 2cm; květenství 10 - 20tičetné; plody po 1 - 3ks
- 'Variegata' - listy na okraji bílé, asymetricky pestré
- 'Weaver's White' - vzrůstný habitus; listeny velké, bílé
- 'Welch Bay Beauty'/'Welch's Bay Beauty' - listy na podzim tmavěčervené; květenství široké 14 - 15cm se 7mi překrývajícími se listeny
- 'Welch's Junior Miss'/'Junior Miss' - listeny malé, na koncích růžové, na bázi prakticky bílé
- 'Welchii' - listy obvejčité, špičaté, asymetricky zvlněné, asymetricky běžově až bíle kropenaté, narůzovělé, na podzim běžovorůžové až růzovofialové, dlouhé 5 - 9cm, široké 2 - 3cm
- 'White Bouquet' - kompaktní kulovitý hustý habitus; listeny bílé
- 'White Catch' - vzrůstný habitus; listeny bílé
- 'White Cloud' - listy bronzové; květenství bohaté, listeny bílé, široké, kulovité
- 'White Giant' - listeny větší
- 'White Love' - listeny velké, bílé
- 'Will's Golden' - listeny zelené se žlutou kresbou, na podzim načervenalé a narůzovofialovělé
- 'William's Red' - listeny tmavě růzovočervené
- 'Wills' - listy menší, zelené s asymetrickým bílým a žlutým okrajem, občas v mládí narůzovělé; pomalý růst
- 'Wilsii' - stromovitý habitus; kmen krátký, koruna široce kulovitá; listy zelenobílé
- 'World's Fair' - nízky habitus; záhy kvetoucí
- 'Xanthocarpa'/'f. *xanthocarpa* - kmínky zpravidla nažloutlé; listy bledězelené; plody nažloutlé

Vyhovuje mu polostín a vlhká mírně kyselá půda bohatá na živiny. Je mrazuvzdorný.

Cornus foemina

synonyma: *C. albida*, *C. candidissima*, *C. citrifolia*, *C. coerulea*, *C. cyanocarpus*, *C. fastigiata*, *C. gracilis*, *C. striata*, *C. stricta*, *Swida foemina*, *Swida gracilis*, *Swida stricta*, *Thelycrania candidissima*, *Thelycrania stricta*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Pochází z jihovýchodu USA.

Cornus glabrata (Svída olýsalá)

synonyma: *C. costulata*, *Swida catalinensis*, *Swida glabrata*, *Thelycrania catalinensis*, *Thelycrania glabrata*

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v Severní Americe v podobě kaskádovitého řídkého keře. Dorůstá výšky 3,6 - 4,5m. Větve jsou v mládí převislé, hnědočervené, později bleděhnědé a šedé. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, z obou stran lesklé, bledězelené až šedozelené, dlouhé 3 - 8cm, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 3 - 4 párů žilek. Květenství má šířku 2,5 - 4,5cm, je mírně vypouklé, vlastní květy bílé, mají 2 - 3mm stopku, kališní lístky délky 0,8mm a korunní lístky délky 4,5 - 5mm. Plodem je 5 - 9mm tlustá bílá až bleděmodrá peckovice.

Cornus hemsleyi (Svída Hemsleyova)

synonyma: *C. alsophila*, *C. hemsleyi* var. *gracilipes*, *C. hemsleyi* var. *longistyla*, *C. polyantha*, *Swida alsophila*, *Swida hemsleyi*, *Swida hemsleyi* var. *gracilipes*, *Swida hemsleyi* var. *longistyla*, *Swida polyantha*

oblasti: JZ Čína

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 5m. Borka je hnědočervená, hnědá nebo tmavěšedá. Větve jsou v mládí červené nebo zelené, mohou být ochlupené, později růžovofialovočervené až tmavěhnědé. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté, dlouhé 4,5 - 13cm, široké 1,8 - 6,2cm, báze zakulacená a žilnatinu tvoří 6 - 8 žilek. Květenství má průměr 5 - 9cm, květy mají 1 - 6mm stopku a průměr 6 - 9mm. Plody růžovofialovočervené až černé, kulovité a průměru 4 - 5mm.

Cornus hongkongensis

synonyma: *Benthamia hongkongensis*, *Benthamia japonica* var. *sinensis*, *Benthamidia hongkongensis*, *Cynoxylon hongkongense*, *Dendrobenthamia hongkongensis*, *Dendrobenthamia latibracteata*, *Dendrobenthamia xanthocarpa*

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Laos, Sichuan, Vietnam, Yunnan

Pochází z jižní Číny, Laosu a Vietnamu. Roste v podobě stálezeleného stromu nebo keře. Dorůstá výšky 3 - 25m. Borka je šedá, tmavěšedá nebo hnědočerná a hladká. Větve jsou v mládí zelené nebo narůžovofialovělé, řídké ochlupené, později bleděšedé, zelenošedé až šedohnědé. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, kožovité, špičaté až ocasovité, dlouhé 6,2 - 16cm, široké 2,5 - 7,5cm, báze klínovitá až zakulacená, spodní strana světlezelená a žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek. Květenství je kulovité, 40 - 70tičetné, průměru 0,7 - 2cm, listeny nažloutlé až bílé, eliptické, vejčité až kulaté nebo obvejčité, dlouhé 1,6 - 4cm, široké 1,3 - 4,2cm, korunní lístky dlouhé 1,5 - 4,2mm a široké 0,8 - 1,1mm. Plody jsou červené až žlutočervené, kulovité a průměru 1,5 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *elegans*/*Dendrobenthamia elegans*/*Dendrobenthamia elegans* var. *rotundifolia*/*Dendrobenthamia rotundifolia* - keř nebo strom; výška 3 - 15m; borka šedá až šedohnědá; listy eliptické, kožovité, dlouhé 5,5 - 8,2cm, široké 2,5 - 3,5cm, 3 - 4 žilky; květenství 45 - 55tičetné velikosti 8mm, listeny mírně obvejčité, řídce ochlupené, dlouhé 3,5 - 4cm, široké 1,8 - 2,5cm, korunní lístky mírně vejčité, dlouhé 2 - 2,5mm, široké 0,8 - 1mm; plody červené průměru 1,5 - 2cm
- subsp. *ferruginea*/*C. ferruginea*/*Benthamidia ferruginea*/*Cynoxylon ferrugineum*/*Dendrobenthamia ferruginea*/*Dendrobenthamia ferruginea* var. *jiangxiensis* - Guangdong, Guangxi; stálezelený keř nebo strom; výška 5 - 20m; větve v mládí ochlupené, později tmavě šedohnědé; listy eliptické, i prakticky kožovité, dlouhé 8 - 14cm, široké 3 - 6cm, spodní strana v mládí ochlupená; květenství 60 - 70tičetné, průměru 1,1cm, listeny žlutobílé, mírně obvejčité, dlouhé 4 - 4,5cm, široké 2,5 - 3cm, korunní lístky eliptické, dlouhé 2,5mm; plody červené
- subsp. *gigantea*/var. *gigantea*/*Benthamidia hongkongensis* var. *gigantea*/*Dendrobenthamia gigantea*/*Dendrobenthamia gigantea* var. *caudata*/*Dendrobenthamia pachyphylla* - Guizhou, Sichuan, Yunnan; stálezelený keř nebo strom; výška 2 - 6m; borka tmavěhnědá, hladká, větve šedé nebo šedo zelené; listy obvejčité (i eliptické), kožovité, ocasovité, dlouhé 8,5 - 16cm, široké 3,8 - 7,5cm, spodní strana ochlupená; květenství 60tičetné, průměru 1,4 - 2cm, listeny nažloutlé až bílé, obvejčité až prakticky kulaté, dlouhé 4cm, široké 3 - 4,2cm, korunní lístky vejčitékopinaté, dlouhé 4,2mm, široké 1,1mm; plody žlutočervené, průměru 2,5cm
- subsp. *hongkongensis*/*Benthamia japonica* var. *sinensis*/*Benthamia hongkongensis*/*Benthamidia hongkongensis*/*Conoxylon hongkongense*/*Dendrobenthamia hongkongensis*/*Dendrobenthamia latibracteata* - Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Vietnam; stálezelený strom nebo keř; výška 5 - 25m; borka tmavěšedá až tmavěhnědá, větve šedé nebo hnědé; listy eliptické (i mírně obvejčité), kožovité, v mládí ochlupené, dlouhé 6 - 13cm, široké 2,8 - 6,3cm; květenství 50 - 70tičetné, velikosti 1cm, listeny bílé, eliptické až mírně obvejčité, dlouhé 2,8 - 4,1cm, široké 1,7 - 3,5cm, z obou stran prakticky holé, korunní lístky bleděžluté, eliptické, dlouhé 2,2 - 2,4mm, široké 1 - 1,2mm; plody žluté nebo červené, průměru 2,5cm, bíle ochlupené
- subsp. *melanotricha*/var. *jinyuensis*/*Cynoxylon melanotrichum*/*Dendrobenthamia ferruginea* var. *jinyunensis*/*Dendrobenthamia gigantea* var. *caudata*/*Dendrobenthamia jinyunensis*/*Dendrobenthamia melanotricha* - Guizhou, Sichuan, Hunan, Yunnan; stálezelený strom nebo keř; výška 3 - 12m; borka tmavěšedá až tmavěhnědá; větve šedohnědé; listy eliptické, kožovité, dlouhé 6 - 10cm, široké 2,7 - 5cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 žilky, spodní strana ochlupená; květenství žlutozelené, 40tičetné, velikosti 1cm, listeny žlutozelené až béžovobílé, eliptické až obvejčité, dlouhé 2 - 4cm, široké 1 - 3,5cm, korunní lístky eliptické až vejčité, dlouhé 2,8 - 3mm, široké 1mm; plody červené průměru 2 - 2,5cm - 'Watashi no Ginga' - vzpřímený rozkladitý vzrůstný habitus; listy se zelenými, nažloutlými i žlutými skvrnami i okraji; květy jednoduché až plné, listeny nazelenalé, poději bílé
- subsp. *tonkinensis*/*Cornus tonkinensis*/*Dendrobenthamia tonkinensis* - Guangxi, Yunnan, Vietnam; stálezelený keř nebo strom; výška 4 - 15m; borka tmavěšedá, větve šedé; listy vejčité až eliptické, kožovité, dlouhé 4,5 - 13cm, široké 1,7 - 6cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 žilky; květenství 40 - 50tičetné průměru 8mm, listeny bílé, eliptické až vejčité, průměru 1,6 - 1,8cm, šířky 1,3 - 1,5cm, oboustranně mírně ochlupené, kalich prakticky holý, korunní lístky dlouhé 2,2mm, široké 0,8 - 1mm; plody červené, průměru 1,5 - 2cm, stopka délky 4 - 8mm

Cornus hungarica (Svída uherská)

synonyma: *C. sanguinea* subsp. *hungarica*, *Swida hungarica*

Patří mezi ohrožené druhy C4.

Cornus iberica (Svída iberská)

synonyma: *Swida iberica*, *Thelycrania armassica*, *Thelycrania australis* var. *iberica*, *Thelycrania*

iberica

oblasti: Kavkaz

Roste na Kavkaze v podobě keře nebo stromu s prakticky kulovitou korunou. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou v mládí hnědozelené, ochlupené, později hnědé. Borka je hnědošedá. Listy jsou tmavězelené, lesklé, oboustranně ochlupené, eliptické, špičaté, dlouhé 2,5 - 8,8cm, široké 1,1 - 3,5cm, báze zpravidla úzce klínovitá, spodní strana světlejší, žilnatinu tvoří 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství má 0,8 - 2cm stopku, délku 1,7 - 2,5cm, šířku 4 - 6cm, vlastní květy mají 2,5 - 5mm stopku, kališní cípy 3úhlé, dlouhé 0,8 - 2,5mm, vně ochlupené, korunní lístky kopinaté, dlouhé 5 - 7mm a široké 1,5 - 2mm. Plody jsou černé, kulovité, průměru 6 - 8mm a pecky jsou kulovité nebo mírně zploštělé.

Cornus koehneana

synonyma: Swida koehneana, Thelycrania koehneana

oblasti: Gansu, Shaanxi, Shanxi, Sichuan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 10m. Borka je tmavěhnědá. Větve jsou v mládí narůžovofialové až červenozelené, později žlutohnědé až šedohnědé. Listy vyrůstají vstřícně, jsou eliptické až mírně vejčité, špičaté, dlouhé 3,3 - 8cm, široké 2,3 - 4,5cm, spodní strana šedozelená, ochlupená, žilnatinu tvoří 4 žilky a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2,2cm. Květenství má průměr 6cm, květy mají 0,5 - 3mm stopku, barvu bílou a průměr 7mm. Plody jsou vejčitékulovité délky 5mm a šířky 6mm.

Cornus kousa (Svída japonská)

synonyma: Benthamia kousa, Cynoxylon kousa

oblasti: Anhui, Fujian, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Japonsko, Jiangsu, Korea, New York, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Tchaj-wan, Vnitřní Mongolsko, Yunnan, Zhejiang

Roste v Japonsku, Číně a Koreji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky (2 -) 3 - 7 (i 10)m a šířky 8m v kuželovém až sloupovitém habitu. Borka je červenohnědá a odlupuje se v šupinách. Větve jsou vodorovné, rozkladité, spodní patrovité, v mládí bledě zelené až hnědozelené, později tmavěhnědé. Listy jsou střídavé, vejčité až eliptické, špičaté, celokrajné (i drobně zubaté), zpravidla kožovité, tmavě zelené, lesklé, dlouhé (4 -) 5 - 9 (i 12)cm, široké 3 - 7cm, báze klínovitá až zakulacená, spodní strana namodralá až bledě zelená, v paždí žilek ochlupená, na podzim červené, oranžové či růžovofialové. Květenstvím je hlávka průměru 1,2 - 2cm na 4 - 8cm stopce, listeny jsou 4, bílé (i žluté nebo narůžovělé), kopinaté a dlouhé (1,5 -) 3 - 5 (i 7,5)cm. Plody jsou kulovité, dužnaté, růžově červené peckovice o průměru 2 - 2,5cm v kuklovité hlávce. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aget' - listy dlouhé, úzké, lesklé, tmavězelené; kvete v průběhu celého léta, listeny úzké, protáhlé, dlouho vytrvávající
- 'Akabana'/'Akabina' - růžová forma
- 'Akatsuki'/'Aka tsuki' - listy zelené, okraje bílé a narůžovělé; listeny malé, zpravidla bílé, mírně růžově tečkované
- 'Aktuki' - výška 6m, šířka 7,5m; listy se širokým bílým okrajem; listeny červenorůžové
- 'All Summer' - dlouhé období kvetení až do doby plodů
- 'Amber' - keřovitý habitus; listy zelené, žluto- a béžovopestře
- 'Angela' - výška 3 - 3,6m; listy se širokým bílým lemem

- 'Angela Palmer' - nižší; listy zelené s bílým lemováním
- 'Angyo Dwarf' - listy malé, zpravidla dlouhé do 4,3cm; listeny zakrnělé
- 'Annelies' - listeny bílé, špičaté
- 'Autumn Rose' - menší vzpřímeně větvený habitus; listy v mládí žlutozelené, později bledě zelené, zvlněné, na podzim růžové a červené; listeny malé, bledě zelené až bílé
- 'Avalanche' - listeny široké, kulovité, překrývající se
- 'Baby Splash' - nízký vzrůst; listy malé, bíle pestré
- 'Baier' - keřovitý převislý habitus; listy tmavězelené; listeny bílé a drobné
- 'Barmstedt' - květenství bohaté, šířky do 9cm, listeny široké a překrývající se
- 'Beni Fuji' - až křovinatý habitus; listy tmavězelené, lesklé, řapíky i žilky červené; listeny malé, úzce špičaté, zpravidla bohaté; patentován
- 'Big Apple' - listy tmavězelené, tlustější; listeny průměru do 14cm; plody průměru 4cm
- 'Blue Shadow' - výška více než 9m; listy tmavě modrozelené, lesklé, na podzim červené; listeny protáhlé, světle béžové, dlouho vytrvalé
- 'Bodnant' - listy tmavězelené, v zimě růžovofialové; listeny kulaté, široké, překrývající se, bílé
- 'Bonfire'/'Bon Fire' - vzpřímený habitus; větve vodorovné; kmínky červenorůžovofialové; listy v mládí narůžovofialovělé, později šedozeleň, na okraji žluté, na podzim růžové, červené nebo růžovofialové
- 'Bultinck's Beauty' - široký vzpřímený habitus; mladé části narůžovofialovělé; listy tmavězelené, lesklé, asymetricky bíle mramorované až skvrnitě; listeny překrývající se, bílé
- 'Bush's Pink' - listy v mládí načervenalé; listeny malé až střední
- 'Camden' - květenství bohaté a dlouhé, listeny béžově bílé; plody bohaté
- 'Cascade' - menší kulovitý kompaktní habitus; větve obloukovité; listeny středně velké, bílé až béžově bílé
- 'Cedar Ridge Select' - listeny bílé, později tmavě růžové
- 'Claudia' - listeny široké, bílé s červenými tečkami
- 'Creme Puff' - široce rozkladitý až keřovitý habitus; květenství bohaté, na podzim tmavě červeně oranžově růžové
- 'Delicatessse' - listeny široké, bílé a narůžovělé
- 'Doubloon' - vzpřímený habitus; má více než 4 listeny
- 'Dr. Bump'/'Doctor Bump' - hustý keřovitý habitus; borka se odlupuje; květenství bohaté
- 'Dwarf Pink' - kompaktní vzpřímený habitus; výška 1,8 - 2,7m; listeny úzké, tmavě červené, růžové nebo až bílé
- 'Ed Mezitt' - výška do 8m; listy v mládí narůžovofialovělé, později bronzové, na podzim červeně oranžové; listeny široké, překrývající se
- 'Elizabeth Lustgarten'/'Liz Lustgarten' - mírně převislý habitus; v 10 - 12ti letech výška 3m, šířka 1,5m; listeny velké, bílé, později růžové, překrývající se
- 'Elmwood Weeper' - převislý habitus
- 'Emerald Star' - listy tmavězelené; listeny bílé, eliptické až srdčité, příležitostně překrývající se
- 'Endurance' - listeny dlouho vytrvalé
- 'Eva' - bílozelené listy lesklé listy, na podzim růžovofialové
- 'Everbloom' - listeny dlouho vytrvávající
- 'Fanfare' - vzpřímený habitus
- 'Fireworks' - listy na podzim žluté, červené až mírně růžovofialové; květenství bohaté, listeny růžové
- 'Flowerime' - květenství bohaté, listeny široké
- 'Francine Ermans' - listeny bílé, eliptické
- 'Galaxy' - vysoký tromovitý habitus; květenství bohaté, bílé, listeny překrývající se
- 'Galzam'/'Galilean' - výška 6 - 7,5m, šířka 4,5 - 6m; listy tmavězelené, lesklé, kulaté, žilnatina hluboce zapuštěná; listeny velké, přišpičatělé, na bázi kulaté
- 'Gay Head' - vzpřímený habitus; listeny špičaté, mírně pomačkané; plody průměru 2,5 - 2,8cm
- 'Girard's Dwarf' - zakrslý habitus; v 8mi letech výška 90cm; květenství bohaté
- 'Girard's Nana' - zakrslý habitus; přírůstky do 15cm/rok

- 'Gold Cup' - vzrůstný habitus; listy ve středu se žlutou skvrnou uprostřed a tmavě zeleným okrajem; listeny bílé
- 'Gold Star' - vzpřímený keřovitý habitus; listy srdčité, tmavězelené, asymetrické, mají žlutou skvrnu; listeny bílé
- 'Greensleeves' - stromovitý habitus; listy tmavězelené, lesklé, velké; listeny nazelenalé, velké, široké, na bázi se překrývají
- 'Greta's Gold' - listy v mládí bronzové, později zelené se žlutým okrajem, na podzim růžové a červené
- 'Grumpy' - drobný habitus; listy úzké, pomačkané; sporadické kvetení
- 'Hanros'/'Radiant Rose' - listy tmavězelené, na podzim tmavě červené až červenohnědé; plody velké
- 'Heart Throb'/'Schmred' - široce rozkladitý strom; borka se odlupuje; listy lesklé, zelené, vrchol červený; listeny velké, tmavě růžové až červené
- 'Highland' - široký habitus; listy bledě zelené; záhy kvetoucí, listeny světle béžové
- 'Cherokee' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené, zvlněné, převíslé; listeny velké, zvlněné
- 'China Girl' - kompaktní zprvu keřovitý habitus; listy bledě zelené, později až béžově bílé, úzce eliptické, zvlněné až zkroucené, později se zvětšují, vrchol stočený k zemi; plody červené, velké
- 'China Dawn' - listy na okraji se široce béžově bílými okraji
- subsp. chinensis/var. chinensis - Tchaj-wan, Čína, Japonsko; stromovitý habitus; větve jemné, v mládí hnědočervené; listy na spodní straně dlouze ochlupené; listeny dlouhé do 6cm, bílé, později béžové nebo růžové; květy i plody větší
- 'Chipizam'/'Christian Prince' - menší až střední stromovitý habitus; listeny bílé
- 'John Slocock' - listy tmavězelené, lesklé, žlutě žilkované; listeny béžově bílé, špičky zaoblené, později mírně růžově skvrnitě
- 'Julian' - listy na podzim efektně vybarvené; listeny bílé, na vrcholu ohnuté vzhůru; plody velké
- 'July Jubilee' - listy tmavězelené; listeny dlouho vytrvalé
- 'Kalmthout' - listeny široké
- 'Kirkpatrick's Weeping' - mírně převíslý habitus
- 'Kordes' - květenství bohaté, nepravidelné, listeny široké, kulovité, překrývající se
- var. kousa - Japonsko, Korea
- 'Kreftenbroek Pink' - listeny růžové, přišpičatělé
- 'Kristin Lipka's Variegated Weeper' - převíslý habitus; výška 4,5m, šířka 3,6 - 4,5m; listy tmavězelené, béžové okraje, na podzim růžovofialové, žluté a zelené, náchylné na popálení; listeny béžovobílé, na okraji a ve středu nazelenalé, později celé béžové
- 'Laura' - polozakrslý habitus; listy asymetricky bíle lemované, na podzim červené; listeny bílé
- 'Limon Ripple' - hustý vzpřímený habitus; listy zvlněné až zkadeřené, na okraji žluté, na podzim oranžové až červené; listeny bílé
- 'Little Beauty' - hustý rozkladitý menší habitus; listeny pestré; listeny úzce vejčité až široce kopinaté, špičaté, zvlněné, bílé, zpravidla nepřekrývající se
- 'Little China' - zakrslý habitus; květenství bohaté
- 'Luce' - vysoce mrazuodolné
- 'Lustgarten Weeping' - převíslý habitus; výška 3m, šířka 60 - 90cm; větve obloukovité; květenství bohaté, listeny bílé; plody červené
- 'Madame Butterfly' - obsahuje 2 formy, buď silný vzrůst a bohaté květenství s úzce špičatými listeny nebo rostliny s velmi velkými listeny o průměru až 13cm
- 'Madison'/'Crown Jewel' - letní přírůstky žluté a načervenalé
- 'Mandarin Jewel' - plody oranžové
- 'Marble' - listy béžovopestře
- 'Medusa' - listy světlejší, téměř žlutozelené, úzce eliptické až čárkovité, pokroucené, zpravidla drobně zvlněné
- 'Milky Way' - listy na podzim bronzové; bohaté kvetení i plození, listeny ostře špičaté
- 'Milky Way Select' - viz. 'Milky Way'; listeny široce překrývající se
- 'Minuma' - květenství má až 6 listenů

- 'Miss Petty' - listy prakticky černozelelé; listeny bílé, na bázi narůžovělé
- 'Mon Ami Francie' - listeny bílé a úzké
- 'Moonbeam' - listy tmavězelelé a lesklé; květenství o průměru 17 - 20cm, listeny se na bázi široce překrývají, na koncích mírně převislé
- 'Moonlight' - listy tmavězelelé a lesklé; květenství o průměru 17 - 20cm, listeny široké, na bázi se široce překrývají, na koncích ochablé
- 'Mount Fuji' - listeny růžovočervené
- 'National' - vázovitý habitus; výška i šířka 7 - 9m; listy tmavězelelé, na podzim červené; listeny světle béžové, překrývající se; plody průměru až 4cm
- 'Nell Monk' - květenství bohaté, listeny se překrývají
- 'Nicole'
- 'Orton Variegated' - výška 1,8m, šířka 1,2m; některé listy bíle pruhované a kropenaté
- 'Par Four' - květenství bohaté, listeny široké a překrývající se
- 'Parasol' - obloukovitý habitus; listy na podzim červené; listeny velké, na vrcholu zakulacené, v počtu i více než 8ks, překrývající se, bílé
- 'Pendula' - keřovitý převislý hustě větvený habitus; výška 3m, šířka 2,4m; květenství bohaté
- 'Pevé Limbo' - listy velké, tmavě šedozelelé, na okrajích béžovobíle lemované, v mládí žluté, okraje zvlněné
- 'Pollywood' - velký mohutný stromovitý habitus; listeny pozdní, dlouho vytrvalé, špičaté
- 'Primrose Cloak' - větve v mládí růžové; listy v mládí žluté, načervenalé, mírně zvlněné
- 'Prolific' - květy rané, listeny bílé
- 'Propzam'/'Prophet' - listy tlusté, zelené, pevné, na podzim tmavě hnědočervené; listeny mírně překrývající se; plody velké, sladké
- 'Rasen' - listeny velké, světle béžové, překrývající se, později zahnuté
- 'Re Tivao' - listy s asymetrickými béžovými až žlutými okraji, zvlněné, vrásčité; listeny bílé
- 'Repeat' - remontující, druhé květy menší
- 'Repeat Bloomer' - listeny velké, bílé, remontující
- 'Robert' - listeny bílé, úzké, zvlněné
- 'Rochester' - listeny velké, světle béžové
- 'Rosabella' - výška 6 - 8m; listeny bledě růžové, okraje sytější
- 'Rosea'
- 'Rosemoor Pink' - květy růžové
- 'Rosy Curlycue' - listy pokroucené, v mládí růžové, zelené i bílé; pomalý růst
- 'Rubra' - listeny červenorůžové nebo růžové, na vrcholu zaoblené
- 'Ruby Slippers' - výška 6 - 7,5m, šířka 4,5 - 6m; listeny bledě růžové
- 'S. Hoffen' - menší keřovitý habitus; listy šedozelelé s bílým okrajem, zvlněné; květenství průměru 6,5cm, listeny úzce špičaté, malé
- 'Samzam'/'Samaritan' - hustý habitus; výška 6 - 7,5m, šířka 4,5 - 6m; listy šedozelelé s béžovobílým okrajem, zvlněné, na podzim růžové až červenohnědé
- 'Satomi'/'Miss Satomi'/'New Red'/'Satomi Red' - listy tmavězelelé, mírně lesklé, hladké, žilnatina načervenalá; listeny široce vejčité, ostře krátce zašpičatělé, růžovočervené, dlouhé 5 - 6cm, široké 3,5 - 4,5cm
- 'Scarlet Fire'/'Rutpink' - výška 3 - 4m; listy lesklé, tmavězelelé až bronzové, na podzim červené; listeny růžové, květenství průměru 8 - 10cm
- 'Schmetterling' - vzpřímený habitus; listeny velké, bílé
- 'Select' - listy velké, tmavězelelé, lesklé
- 'Silver Cup' - listy na podzim červené; listeny zahnuté vzhůru
- 'Silver Pheasant' - listy tmavězelelé, bílopestře
- 'Silver Splash' - listy v mládí zkroucené, zelené, bílé i růžové
- 'Silverstar'/'Silver Star' - vzpřímený vázovitý habitus
- 'Simpson #1' - rozkladitý habitus; šířka více než 6m; květenství bohaté
- 'Simpson #2' - vzpřímenější habitus; výška do 7,5m, šířka 5,4m; květenství bohaté
- 'Snow Flake' - květenství bohaté, listeny větší, mírně zvlněné; plody velké

- 'Snowbird' - kompaktní habitus; listy i listeny menší; pomalejší růst
- 'Snowboy' - vzpřímený habitus; výška do 3m; listy šedozeleňé, okraje stříbřité (i v centru); listeny bělavé, okraje nazelenalé
- 'Southern Cross' - podsaditý mírně keřovitý habitus, na podzim červené; listeny světle béžové, později narůžovělé
- 'Speciosa' - listy tmavězeleňé, zvlněné, překrývající se; listeny bílé; pomalý růst
- 'Spinners' - robustní habitus; květenství bohaté, listeny dlouhé, úzce špičaté; plody bohaté
- 'Square Dance' - listeny velké, překrývají se; plody velké
- 'Steeple' - vzpřímený habitus; listy tmavězeleňé, lesklé; listeny bílé, špičaté
- 'Summer Games'/'Summertime' - stromovitý habitus; listy tmavězeleňé, asymetrický béžový okraj nebo skvrny, občas i narůžovofialovělé
- 'Summer Gold' - vzpřímený stromovitý habitus; listy mají žluté okraje
- 'Summer Majesty' - velký rozkladitý habitus; výška do 9m; listeny bohaté, bílé, později růžové
- 'Summer Stars' - eliptický habitus; listy na podzim hnědočervené; květenství bohaté, listeny dlouho vytrvalé; plody červené
- 'Sunsplash' - pomalý keřovitý habitus; listy zelené, na okraji žluté, na podzim červené, žluté a oranžové
- 'Temple Jewel' - výška 6 - 9m; listy v mládí mírně žlutě a růžově pestré se skvrnou uprostřed, v létě celé zelené; listeny bílé, občas na okraji nazelenalé, špičaté; plody červené
- Teutonia - květenství průměru až 13,5cm, listeny široké, ranné
- 'Ticknor's Choice' - listeny zelené, později bílé, nakonec růžové nebo béžové
- 'Tri-Splendor' - menší vzpřímený stromovitý habitus; listy široce světle žlutě lemované, na podzim červenorůžové; listeny žlutě béžové s bílými okraji
- 'Trinity Star' - menší kompaktní plochý rozkladitý habitus; výška i šířka 3,6m; listy zelené, bílé a růžové, postupně blednoucí; listeny bílé
- 'Triple Crown' - listy tmavězeleňé, mírně převislé, široké
- 'Tsukuba No Mine' - keřovitý habitus; výška do 6m; větve slabé, husté; květenství bohaté, listeny béžově bílé, malé, úzké, špičaté
- 'Twinkle' - vzpřímený kompaktní habitus; listy na podzim červené; květenství má 6 - 9 listenů; patentována
- 'Variegata' - listy šedozeleňé, bílé nebo růžové
- 'Victory' - květenství bohaté, listeny pohárkovité
- 'Viridis' - listeny nazelenalé
- 'Waif Wyes' - kompaktní habitus; listy pestré
- 'Waterfall' - převislý až po zemi plazící se habitus; listy zelené
- 'Weaver's Weeping' - převislý habitus; výška i více než 2,5m; květenství bohaté, listeny dlouhé, špičaté, úzké, bílé, později narůžovělé
- 'Weisse Fontäne' - keřovitý habitus; větve převislé, obloukovité
- 'Whirlwind' - v mládí větve do spirály
- 'White Dream'
- 'White Dust' - široký vzpřímený keř; listy tmavězeleňé s béžově bílými a nažloutlými tečkami a skvrnami; listeny béžově bílé
- 'White Fountain' - široký habitus; větve obloukovité; květenství bohaté
- 'Wieting's Selekt'/'Wieting' - listy na podzim červené až oranžové; záhy kvetoucí
- 'Willamette' - listy tmavězeleňé, na podzim červené; květenství bohaté, listeny bílé
- 'Wilton'/'Wiltoni' - listeny béžově bílé, dlouho vytrvalé
- 'Wisley Supreme' - široce vázovitý vzpřímený stromovitý habitus; výška do 9m; listy eliptické, dlouhé 9cm, široké 5,5cm, 4 - 5 párů žilek; listeny široké, překrývající se, kulovité, krátce hrotité, dlouhé 3,5 - 4,3cm, široké 3,5 - 4,8cm
- 'Wolf Eyes'/'Wolf Eye' - široký vzpřímený habitus; výška i šířka 2,5m; listy šedozeleňé s béžovobílým okrajem, zvlněné, na podzim růžové až červené; listeny béžově bílé, na okraji nazelenalé
- 'Xanthocarpa' - plody žluté

Vyhovuje ji polostín v kyselejší a vlhčí kyselá hlinitá až jílovitá půda bohatá na živiny v polostínu nebo stínu. Nevadí ji větrné stanoviště. Je mrazuvzdorná do -29°C.

Cornus macrophylla

synonyma: *Bothrocaryum longipetiolatum*, *C. alpina*, *C. brachypoda*, *C. corynostylis*, *C. crispula*, *C. longipedunculata*, *C. longipetiolata*, *C. religiana*, *C. taiwaniensis*, *C. thelicanis*, *Swida alpina*, *Swida brachypoda*, *Swida macrophylla*, *Swida macrophylla* var. *longipedunculata*, *Thelycrania brachypoda*, *Thelycrania macrophylla*

oblasti: Afganistán, Bhútán, Himálaj, Japonsko, Korea, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Afganistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu, Pakistánu a Japonsku v podobě stromu s široce kulovitou korunou anebo jako keř. Dorůstá výšky 3 - 15 (i 25)m. Borka je šedoohnědá až šedočerná. Listy vyrůstají vstřícně, jsou eliptické až vejčité, špičaté, tmavězelené, dlouhé (7 -) 9 - 15 (i 18)cm, široké 3,5 - 9cm, báze zakulacená nebo klínovitá, spodní strana namodralá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (0,8 -) 1,5 - 3 (i 4)cm. Květenství je zploštělé, průměru 8 - 15cm, květy mají 0,3 - 5mm stopku, barvu bílou, nažloutlou nebo bledě béžovou, průměr 0,7 - 1cm, kalich je zubatý, ochlupený, korunní lístky jsou dlouhé 6mm a vydává příjemné aroma. Plody jsou kulovité, růžovofialovočerné až modročerné délky 5mm a průměru (2,5 -) 4 (i 6)mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *macrophylla*/*C. alba*/*C. alpina*/*C. brachypoda*/*C. crispula*/*C. corynostylis*/*C. ignorata*/*C. longipedunculata*/*C. longipetiolata*/*C. taiwanensis*/*Bothrocaryum longipetiolatum*/*Swida alpina*/*Swida macrophylla*/*Swida macrophylla* var. *longipedunculata*/*Thelycrania brachypoda* - Dálný východ, Korea, Japonsko; výška 3 - 25m; borka podélně praskající; větve v mládí tmavé, hnědočervené, prakticky holé, starší větve mají šedobílé lenticely; listy tmavězelené, lesklé, z obou stran přitiskle krátce ochlupené, eliptické (i vejčité), špičaté, dlouhé do 16cm, široké 8 - 9cm, báze klínovitá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky dlouhé 1,2 - 3cm; květenství husté, bohaté, délky do 10cm, šířky 15cm, má 4,5 - 5cm stopku, květy průměru 0,8 - 1cm, stopky dlouhé 2,5 - 5mm, kališní cípy 3úhlé, krátké, korunní lístky kopinaté, dlouhé 4 - 5mm; plody kulovité, černé, délky 5 - 6mm s peckami průměru 3 - 4mm

- var. *stracheyi*/*C. stracheyi*/*Swida stracheyi* - Yunnan, Xizang, Indie, Nepál; výška 3 - 9m; starší větve mají kulaté žlutobílé lenticely; květenství hustě hnědě až bíle ochlupené, květy malé, průměru 7 - 8mm; plody mají pecky délky 2,6mm

Cornus mas (Dřín jarní)

synonyma: *C. erythrocarpa*, *C. flava*, *C. homerica*, *C. mas* f. *conica*, *C. mas* f. *macrocarpa*, *C. mas* f. *microcarpa*, *C. mas* f. *oxycarpa*, *C. mas* f. *pyriformis*, *C. mas* var. *oblongifolia*, *C. mascula*, *C. nudiflora*, *C. praecox*, *C. vernalis*, *Eukrania mascula*, *Macrocarpium mas*

oblasti: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Česká republika, Dagestán, Francie, Gruzie, Írán, J Itálie, JZ Rusko, Katalánsko, Kavkaz, Kosovo, Krym, Maďarsko, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Moldávie, Německo, New York, Peloponézský poloostrov, Rakousko, Rumunsko, S Itálie, S Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Itálie, Střední Řecko, SV Řecko, SZ Řecko, Švýcarsko, Ukrajina, V Karpaty

Roste v teplých částech Evropy, Malé Asii a Kavkaze v podobě opadavého keře nebo malého stromu a velké porosty u nás naleznete na Pálavě. Dožívá se údajně až 250let. Dorůstá výšky i šířky (1 -) 2 - 6 (i 10)m v podobě hustého rozkladitého keře nebo stromu, ale obvykle pouze výšky

3m. Průměr kmene může dosahovat až 25 (i 45)cm. Borka je šedohnědá, odlupuje se v malých šupinkách. Větve jsou v mládí hranaté, sivozelené až hnědě červené, drobně ochlupené, pupeny jsou podlouhlé a špičaté. Listy jsou eliptické až vejčité, zašpičatělé, tmavězelené s výraznou žilnatinou, oboustranně ochlupené, lesklé, zelené, na podzim růžově fialové a žluté, dlouhé 4 - 10 (i 11)cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 (i 5) párů žilek, spodní strana je bledě zelená a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete před listy v kulovitých 10 - 25tičetných okolících o průměru 2,5cm, vlastní květy jsou žluté, průměru 6 - 9mm, mají ochlupenou stopku délky 4 - 9mm, kališní cípy 3úhlé, korunní lístky kopinatě3úhlé, špičaté, dlouhé 2 - 2,5mm a široké 1,2mm. Plodem jsou jedlé červené eliptické peckovice délky (1 -) 2 - 3cm a obsahuje 1cm dlouhou pecku se 2mi semeny. Používá se i v léčitelství, protože např. obsahuje 4 - 5x více vitamínu C než citrón. Patří mezi vzácnější druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - plody bělavé
- 'Alex' - koruna středně hustá; částečně samosprašná; plody velké, hruškovité, tmavěčervené
- 'Aurea'/'Foliis Aureis' - listy žluté až žlutozelené, ve stínu zelené; plody červené; do -34°C
- 'Aurea Elegantissima'/'Aureoelegantissima' - výška do 3m; listy narůžovělé nebo růžově skvrnité, na okraji žluté; pomalý růst
- 'Aureovariegata' - listy zelené se žlutými okraji
- 'Bieloplodý' - plody bílé
- 'Bodacious' - plodenství bohaté; odolná na skvrnitost listů
- 'Bolestraszycki' - postupně dozrávající plody
- 'Buttermilk Sky'/'Butskyzam' - vzpřímený až prakticky kulovitý habitus; výška i šířka 4,5m; listy široce žlutobéžové, později s béžovými okraji
- 'Crispa' - listy zkrabacené a stočené
- 'Devín' - výška do 2,5 (i 2,8)m; větve převislé; listy na okraji zvlněné, bledězelené; plody eliptické, tmavěčervené, bohaté, dlouhé do 2,5cm, dužina červená
- 'Elegant' - žlutě zbarvené okraje listů; plody delší, červené
- 'Elegantissima'/'f. aureomarginata'/'f. elegantissima'/'Tricolor' - listy z části žluté s růžovými okraji; chudé kvetení
- 'Eleantnij' - štíhlejší habitus; výška 1,7 - 1,8m; plody středně velké až velké, hruškovité, tmavěčervené
- 'Expres' - řidší rozložitější koruna; mírně samosprašná; plody vejčité, červené
- 'Flava'/'f. xanthocarpa' - žluté až nažloutlé plody s červeným líčkem; do -34°C
- 'Fruchtal' - výška do 1,35m; spodní větve převislé; plody středně velké, eliptické, tmavěčervené, bohaté
- 'Golden Glory' - výška 7m, šířka 5m; borka se odlupuje; listy jsou více tmavé a větší; květenství bohaté; plody větší; do -29°C
- 'Helen' - plody velké, červené
- 'Hillier's Upright' - široce vzpřímený habitus; plody velké
- 'Jantarnyj' - kuželovitý habitus; výška do 3m; samosprašná; plody velké, žluté, sladké
- 'Jolico'/'Joliko' - kuželovitý habitus; výška 1,2 - 1,3m; plody velké, eliptické, dlouhé 3cm, široké až 2cm, tmavěčervené (velikost závislá na úrodnosti půdy)
- 'Kasnlaker' - plody veliké, červené
- 'Kazanlak'
- f. lanceolata/'Lanceolata' - listy úzké, kopinaté; okraje bílé
- 'Lutea' - žluté plody
- f. macrocarpa/'Macrocarpa' - plody délky 2 - 3cm, hruškovité
- 'Maxim' - středně hustá koruna; plody bohaté, velké, tmavěčervené
- f. microcarpa - plody dlouhé 1 - 1,5cm
- 'Morris Arboretum' - plody velké
- 'Nana' - nízký 1/2kulatý habitus; výška 1,8m, šířka 1,5m; pomalý růst
- 'Nežnyj' - plody žluté
- 'Pioneer' - plody velké, hruškovité

- 'Pyramidalis' - široce sloupovitý (i vejčitý) habitus; větve vystoupavé
- f. pyriformis - plody hruškovité, dlouhé do 3cm
- 'Redstone' - hustý stromovitý nebo keřovitý habitus s deštníkovitou korunou; výška do 5m, šířka do 7m; listy lesklé, tmavězelené, dlouhé 4 - 20cm; plody červené, bohaté, podlouhlé, dlouhé 1 - 2cm
- f. sphaerocarpa - plody kulovité
- 'Spring Glow' - listy lesklé, tmavězelené, tlustější, dlouhé 7,5 - 11cm, široké 4,5 - 7cm; kvetení ranné; plody větší, po 20 - 25tičetných svazečcích
- 'Spring Sun' - listy tmavězelené, lesklé, tlusté; kvetení i plodenství bohaté; pravděpodobně bez výběžků
- 'Szafer' - postupně dozrávající plody
- 'Titus' - výška do 3,5 (i 3,6)m; větve převislé, kratší; listy tmavězelené; květy částečně samosprašné; plody eliptické, tmavě červené až černé, mírně hruškovité, bohaté, dlouhé až 2,5cm, dužina tmavě červená
- 'Tricolor' - listy pestré
- f. typica - listy vejčité až mírně vejčité
- 'Ukraine' - plody hruškovité, velké, červené; do -34°C
- 'Variegata'/f. argenteomarginata/f. variegata/var. argenteomarginata - keřovitý habitus; listy tmavězelené až šedozelené, okraje nestejně bílé až stříbřitěbílé; plody červené
- 'Vyduketskii'/'Vidubetskii'/'Red Star'/'Redstar' - plody velké, červené, podlouhlé, trpké, bohaté; odolná
- 'Violacea' - plody červenofialové až tmavě růžovofialovomodré
- 'Xanthocarpa'/'Flava' - plody žluté
- 'Žlutoplodý' - žluté plody'

Nemá specifické nároky na pěstování. Vyhovují mu slunečné jižní svahy, křoviny, vápencový podklad, dubové nebo habrové lesy. Je plně mrazuvzdorný. Půda stačí běžná zahradní, hlinitá nebo hlinitopísčité. Snáší i déle trvající sucho za cenu malých plodů.

Množí se semeny, které projdou stratifikací.

Cornus meyeri

synonyma: *C. meyeri*, *Swida meyeri*, *Thelycrania meyeri*

oblasti: Írán, Střední Asie

Roste ve střední Asii a Íránu v podobě bohatě větveného keře nebo stromu s kulatou korunou. Větve jsou v mládí hustě ochlupené, růžovofialové, později šedohnědé. Listy jsou oboustranně přitiskle ochlupené, zelené, eliptické, špičaté, dlouhé 3,5 - 9cm, široké 1,3 - 4,5cm, báze klínovitá až prakticky zakulacená, spodní strana světlejší, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,4cm. Květenství je dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 4 - 7cm, má 0,7 - 3,5cm stopku, větve ochlupené, vlastní květy mají 2,5 - 5mm stopku, kališní cípy 3úhlé až kopinaté, dlouhé 0,7 - 2cm, korunní lístky kopinaté, špičaté nebo tupé, dlouhé 5 - 7mm a široké 1,5 - 2,3mm. Plodem je černá kulovitá bobule průměru 6 - 7mm a obsahuje pecku délky 4 - 5mm.

Cornus multinervosa

synonyma: *Cynoxylon multinervosum*, *Dendrobenthamia multinervosa*

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 4 - 15m. Borka je hnědočerná. Větve jsou v mládí zelené nebo narůžovofialovělé, řídce ochlupené, později růžovofialové až šedohnědé s

bílými lenticelami. Listy jsou eliptické, celokrajné, mohou být mírně zvlněné, špičaté, dlouhé 6 - 13cm, široké 3 - 6cm, báze klínovitá, spodní strana bledězelená, v mládí ochlupená a žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek. Květenství je kulovité, 30 - 45tičetné, v průměru má 1cm, listeny bílé nebo žluté, vejčité či eliptické, korunní lístky eliptické, dlouhé 2,5mm a široké 1mm. Plody jsou kulovité, červené a v průměru mají 1,2 - 1,6cm.

Cornus nuttallii (Dřín Nuttallův)

synonyma: *Benthamia nuttallii*, *Benthamidia nuttallii*, *Cynoxylon nuttallii*

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste na západě Severní Ameriky v podobě opadavého mohutného keře až stromu. Dorůstá výšky (4 -) 15 - 20 (i 30)m a šířky 10m v kuželovém habitu. Borka je šupinovitá. Větve jsou v mládí ochlupené, zelené, později tmavě červené až černé. Listy jsou vstřícné, eliptické, vejčité nebo obvejčité, v mládí oboustranně ochlupené, tmavě zelené, dlouhé (6 -) 7 - 12cm, široké 3 - 4 (i 7)cm, spodní strana sivě zelená, podzimní barva červená až oranžová či žlutá, žilnatinu tvoří (4 -) 5 (i 6) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je stažená 1/2kulatá hlávka průměru 10 - 12 (i 15)cm, je tvořené (4 -) 6 (i 8)mi žlutě bílými nebo narůžovělými listeny délky (4 -) 5 - 8cm, šířky 3 - 8cm, kalich má délku 2,5mm, korunní lístky jsou podvinuté a dlouhé 4mm. Plodem je červená (i oranžová) eliptická malvička délky 1 - 1,5cm v 20 - 40tičetné hlávce. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ascona' - listeny růžové
- 'Barrick' - listeny velké, průměru 12,5 - 15cm, hluboce rýhované, rozeklané
- 'Boyd's Hardy' - do -28°C
- 'Colrigo Wonder' - menší než 'Corego Giant'; květenství má v průměru až 18cm
- 'Corego Giant'/'Colrigo Giant' - mohutný habitus; listy tmavězelené, kožovité, tlustější, dlouhé až 20cm; listeny bílé, široké do 15 - 20cm
- 'Eddie' - rašící listy zelené, později žlutě skvrnitě a tečkované
- 'Goldspot'/'Gold Spot' - keř až strom; výška do 10m; listy žlutě skvrnitě, velké, ochablé, na podzim tmavě červené až mírně oranžové; květenství bohaté, listeny velké, béžově bílé se žlutými skvrnkami, zpravidla na bázi nazelenalé
- 'Monarch' - vzpřímený kožovitý habitus; někdy až 2x široké než vysoké; větve vrstvené, v mládí růžovofialové; listy na podzim červené; listeny světle béžové
- 'North Star' - vzpřímený silný habitus; větve v mládí růžovofialové; listy v mládí růžovofialové, na podzim tmavě červené, na okraji zvlněné; květenství průměru do 15cm, listeny úzké, dlouhé, špičaté, nepřekrývající se
- 'Pilgrim' - listeny menší, průměru 10cm
- 'Portsmouth' - vzpřímený habitus; listy na podzim v odstínech červené; listeny béžově žluté, široké, rýhované

Vyhovuje jí chladno, plné slunce až polostín, neutrální až kyselá vlhká půda bohatá na živiny. Odolává teplotám do -15 (i 20)°C.

Cornus obliqua (Svída šikmá)

synonyma: *C. amomum* subsp. *obliqua*, *C. amomum* var. *schuetzeana*, *C. purpusii*

oblasti: Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou sivozelené, v mládí plstnaté. Listy jsou vejčité až kopinaté, převislé, zašpičatělé, zelené, dlouhé 4 - 8cm, široké 1,5 - 4cm, báze klínovitá, zpravidla mírně asymetrická, spodní strana bělavá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je ochlupené, průměru 3 - 5cm, stopky ochlupené, květy jsou bílé, mají 2 - 5mm stopku, kališní lístky dlouhé 1,5 - 2mm a korunní lístky dlouhé 4 - 5mm. Plody jsou modré, občas z části bílé a v průměru mají 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Red Rover'/'Powell Gardens' - kompaktní jemný habitus; výška i šířka 1 - 1,5m; listy na podzim tmavě růžovofialové, později červené; květy bílé; plody modré

Cornus oblonga

synonyma: *C. oblonga* f. *pilosula*, *C. oblonga* var. *glabrescens*, *C. oblonga* var. *griffithii*, *C. oblonga* var. *siamica*, *C. paniculata*, *Swida muchuanensis*, *Swida oblonga*, *Swida oblonga* var. *glabrescens*, *Swida oblonga* var. *griffithii*, *Yinquania muchuanensis*, *Yinquania oblonga*

oblasti: Bhútán, Himálaj, Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sikkim, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Kašmíru, Myanmaru, Nepálu, Pákistánu, Srí Lance, Thajsku a Vietnamu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky (3 -) 6 - 10 (i 16)m. Větve jsou v mládí hranaté a žlutohnědě ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčité až eliptické či mírně kopinaté, špičaté až ocasovité, dlouhé 3 - 13cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (0,5 -) 1 - 1,2 (i 2)cm. Květenstvím je terminální široký kuželovitý latnatý vrcholík délky do 7,5cm, zákrovní listeny jsou vejčitékopinaté, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy jsou bílé, mají průměr 4 - 8mm, kalich zubatý a korunní lístky jsou dlouhé 4mm. Plody jsou černé, vejčité až eliptické a dlouhé 5 - 8mm a průměru 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *glabrescens* - Xizang, Yunnan; listy eliptické (i kopinaté), dlouhé 7 - 9cm, široké 3 - 5cm
- var. *griffithii*/f. *pilosula*/*Swida oblonga* var. *griffithii* - Čína, Bhútán, Indie; listy zpravidla podlouhlé; květenství a spodní strana listů s řapíky ochlupené
- var. *oblonga*/*C. paniculata*/*Ardisia discolor*/*Swida muchuanensis*/*Swida oblonga*/*Yinquania muchuanensis* - listy eliptické až podlouhlé; květenství, spodní strana listů a řapíky krátce šedě přitiskle ochlupené

Cornus officinalis (Dřín lékařský)

synonyma: *C. officinalis* var. *koreana*, *Macrocarpium officinale*

oblasti: Čína, Japonsko, Korea

Roste v Japonsku, Číně a Koreji v podobě stromu nebo keře s protáhlou korunou. Dorůstá výšky 4 - 10m. Borka je vrstvená, šedohnědá až bleděhnědá. Listy jsou oboustranně ochlupené, vejčité, dlouhé 5,5 - 12cm, široké 2,5 - 5cm, spodní strana hustěji ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je vrcholové, žluté, listeny vejčité, dlouhé 5 - 8mm, korunní lístky dlouhé 3,3mm a květy mají 0,5 - 1cm stopku. Plody jsou červené až růžovofialovočervené, eliptické, dlouhé 1,2 - 1,8cm, široké 5 - 7mm a pecky jsou eliptické, dlouhé 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Issai Minari' - brzy kvetoucí

- 'Kintoki' - výška 3,6m, šířka 1,5m; kmínek žlutý až béžovožlutý; borka lesklá, tmavěhnědá, odlupuje se; květenství bohaté, žluté, ve až 25tičetných svazcích o průměru 1 - 2cm, vlastní květy

široké 2mm

- 'Lemon Zest' - borka se odlupuje na 8 - 10let starých větvích; květy žluté, vydávají citrónové aroma
- 'Red Sentinel' - vzpřímený sloupovitý habitus; v 10ti letech výška 2,4 - 3m, šířka 1,5 - 2,4m; listy tmavězelené, mírně lesklé, na podzim červené až růžovofialové; květy bohaté, ve svazečcích
- 'Rugged Charm' - v 10ti letech výška i šířka 2,4 - 3m; listy lesklé, tmavězelené, na podzim červené až růžovofialové; květy bohaté
- 'Y-Sp' - listy zelené s nestejnými žlutými pruhy

Cornus oligophlebia

synonyma: *C. oligophlebia* var. *impressinervis*, *Swida oligophlebia*

oblasti: Bhútán, Indie, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Thajsku a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 10m. Větve jsou v mládí zelené, ochlupené, později tmavěhnědé. Listy vyrůstají vstřícně (i střídavě), jsou eliptické až vejčité, kožovité, mírně podvinuté, špičaté, dlouhé 8 - 11cm, široké 4 - 4,5cm, báze klínovitá nebo zakulacená či zkosená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1,1 - 15cm. Květenství má průměr 8 - 11cm, vlastní květy jsou bílé, průměru 9mm a mají 1 - 2cm stopku. Plody jsou růžovofialovočerné až modročerné, prakticky kulaté, průměru 3 - 4mm, pecky zploštěle kulovité a průměru 2,6 - 4mm.

Cornus papillosa

synonyma: *Swida papillosa*

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 5m. Větve jsou tmavěhnědé, v mládí bledězelené a řídce ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou eliptické, ocasovité, dlouhé 8 - 12cm, široké 4 - 7cm, báze klínovitá, spodní strana šedá a žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek. Květenství má průměr 5 - 9cm, vlastní květy jsou bílé, průměru 7mm a mají 1 - 6mm stopku. Plodem je černá kulovitá peckovice průměru 3mm, vlastní pecky jsou kulaté, zploštělé, dlouhé 2,7mm a široké 1,8mm.

Cornus parviflora

synonyma: *Swida parviflora*

oblasti: Guangxi, Guizhou

Roste v Číně v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 3 - 8m. Borka je žlutohnědá. Větve jsou šedohnědé, v mládí řídce ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou eliptické až mírně kopinaté, špičaté až ocasovité, dlouhé 4 - 6,5cm, široké 1,6 - 3,3cm, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek. Květenství má průměr 4 - 12cm, vlastní květy jsou bílé průměru 4,5mm a mají 0,3 - 2mm stopku. Plodem je obvejčitá až podlouhlá peckovice délky 5 - 6mm a šířky 4mm.

Cornus paucinervis (Svída chudožilná)

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Borka je šedočerná a hladká. Větve jsou hnědé, v mládí zelené nebo narůžovělofialovočervené, 4hranné a ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou

kopinaté (i vejčité či obvejčité), zašpičatělé, dlouhé 4 - 10cm, široké 1 - 4cm, spodní strana bledězelená, řídce ochlupená, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek. Květenství má v průměru 3,5 - 8cm, vlastní květy jsou bílé až nažloutlé, průměru 0,9 - 1cm a mají 2 - 9mm stopku. Plodem je černá peckovice průměru 5mm.

Cornus peruviana (Svída peruánská)

synonyma: *C. boliviana*, *Swida boliviana*, *Swida peruviana*, *Thelycrania boliviana*, *Viburnum peruvianum*

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 4 - 5m. Listy jsou vejčité, zašpičatělé až mírně ocasovité, zelené, mírně lesklé, max. drobně řídce ochlupené, dlouhé 10 (i 13)cm, široké 3 - 5 (i 6)cm, spodní strana je světlejší, drobně ochlupená a v paždí jsou ochlupené. Květenstvím je chudý vrcholík postrádající listeny a korunní lístky jsou dlouhé 4mm. Plody jsou vejčité nebo eliptické, drobně ochlupené a dlouhé téměř 1cm.

Cornus quinquinervis

synonyma: *C. paucinervis*, *Swida paucinervis*

Cornus racemosa (Svída hroznatá)

synonyma: *C. comosa*, *C. foemina* subsp. *racemosa*, *C. paniculata*, *C. paniculata* var. *albida*, *C. paniculata* var. *radiata*, *C. racemosa* f. *caeruleocarpa*, *C. racemosa* f. *nielsenii*, *Svida racemosa*, *Swida racemosa*, *Thelycrania racemosa*

oblasti: Arkansas, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, JV Kanada, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Větve jsou červené nebo šedé, dřeň bílá až světlehnědá. Listy jsou eliptické, vejčité nebo kopinaté, špičaté, tmavězelené, dlouhé 4 - 10cm, široké 1 - 5cm, spodní strana namodralá, řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství je latnaté, kyticovitě vrcholičnaté průměru 3 - 6cm, vlastní květy mají 1 - 4mm stopku, kališní lístky délky 0,5mm a korunní lístky jsou dlouhé 3mm. Plody jsou bílé, průměru 4 - 5mm, mají červenou stopku a pecka má 1 - 2 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Cinderella' - výška i šířka 4,5m; listy ve středu tmavězelené, okolo se šedozeleňými skvrnami a na okraji žluté
- 'Cuyzam'/'Cuyahoga' - výška 3,6 - 4,5m, šířka 3 - 3,6m; listy tmavězelené, lesklé; plody bílé
- 'Geazam'/'Geauga' - hustý kompaktní habitus; výška 3m, šířka 1,3m; listy při rašení načervenalé, později lesklé, tmavězelené
- 'Hurzam'/'Huron' - kompaktní habitus; výška i šířka 0,9 - 1,2m; listy při rašení načervenalé
- 'Jadem'/'Snow Mantle' - stromovitý habitus
- 'Mahzam'/'Mahoning' - hustý kulovitý rozkladitý a výběžkatý habitus
- 'Muszam'/'Muskingum' - řídký habitus; výška 60cm, šířka 1,2m; listy úzké, bledězelené, na podzim červené; pomalý růst
- 'Ottzam'/'Ottawa' - vzpřímený habitus; výška 3 - 3,6m, šířka 1/2; listy tmavé, lesklé
- 'Slavin's Dwarf' - zakrslý kompaktní habitus; výška 50 - 60 (i 90)cm

Cornus rugosa (Svída vrásčitá)

synonyma: *C. circinata*, *C. circinata* f. *variegata*, *C. rugosa* f. *eucycla*, *C. tomentosa*, *C. tomentosula*, *C. tomentulosa*, *C. verrucosa*, *C. virginiana*, *Swida rugosa*, *Thelycrania rugosa*

oblasti: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, JV Kanada, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou v mládí bradavičnaté, zelené s růžovofialovými skvrnami, později růžovofialové, řídce ochlupená a dřev je bílá. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté, dlouhé 4 - 12cm, báze prakticky srdčitá (i klínovitá), spodní strana plstnatá, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství má průměr 5 - 7mm, je husté, zploštělé, má 4 - 5 primárních paprsků, vlastní květy jsou bílé a mají 3 - 5mm stopku. Plody jsou světlemodré až zelenobílé průměru 5 - 6mm.

Cornus sanguinea (Svída krvavá)

synonyma: *C. citrifolia*, *C. latifolia*, *C. sanguinea* subsp. *czerniaewii*, *C. sanguinea* subsp. *sanguinea*, *C. sanguinea* var. *viridissima*, *C. sylvestris*, *Swida sanguinea*, *Thelycrania sanguinea*

oblasti: Andalusie, Anglie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Írán, Irsko, Itálie, J Švédsko, Jugoslávie, Katalánsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Massachusetts, Německo, Nizozemí, Pennsylvania, Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sicílie, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina, Washington, Z Rusko

Roste v Evropě v podobě opadavého hustého keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 3,5 (i 5)m při průměru kmínku až 15cm. Vytváří mnoho kořenových výmladků. Větve jsou v zimě tmavě červené, v mládí nazelenalé a ochlupené. Borka je na silných větvích kostkovitě rozpraskaná, odlupuje se v šupinách a je aromatická. Listy jsou vstřícné, vejčité až eliptické, zašpičatělé, zelené, na podzim tmavě červené, dlouhé (2,5 -) 3 - 8 (i 10)cm, široké 1,5 - 6cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 (i 5) párů výrazných žilek, na spodní jsou řídké zkroucené 2ramenné 1mm chloupky a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,8cm. Květenstvím je plochý okolík o průměru 4 - 6 (i 8)cm, vlastní květy jsou 4četné, bílé, zapáchající a korunní lístky mají délku 3,5 - 5,5mm. Plodem jsou modře černé až červeně černé peckovice velikosti 5 - 8mm, pecka je kulovitá, mírně zploštělá a drobně rýhovaná. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *austrialis* (Svída krvavá jižní) - chloupky na spodní straně přitisklé, 2ramenné; chráněný druh C2
- 'Compressa' - svrasklé listy
- subsp. *hungarica* (Svída krvavá uherská) - chloupky na spodní straně 2ramenné, ale ne stejně dlouhé
- 'Midwinter Fire' - žluté až oranžové větve s červenými konci
- subsp. *sanguinea* (Svída krvavá pravá) - chloupky na spodní straně listů obvykle 1ramenné, 2ramenné na okraji čepele
- 'Winter Beauty' - žluté až oranžové větve s červenými konci
- 'Variegata' - listy pestře skvrnitě

Není příliš náročná na pěstování. Nejráději má polostín až světlo, mírně vlhký kyselý až vápenitý substrát bohatý na živiny. V přírodě se vyskytuje v listnatých nebo smíšených lesích, křovinatých stráních, mezích, atp.

Množí se kořenovými výmladky, semeny nebo řízký.

Cornus schindleri

synonyma: *C. daijinensis*, *C. fulvescens*, *C. lixianensis*, *C. malifolia*, *C. monbeigii*, *C. monbeigii* subsp. *crassa*, *C. monbeigii* subsp. *populifolia*, *C. poliophylla* var. *praelonga*, *C. scabrida*, *C. xanthotricha*, *Swida daijinensis*, *Swida fulvescens*, *Swida monbeigii* var. *crassa*, *Swida monbeigii* var. *populifolia*, *Swida monbeigii* var. *xanthotricha*, *Swida poliophylla* var. *malifolia*, *Swida poliophylla* var. *praelonga*, *Swida scabrida*, *Swida schindleri*, *Swida schindleri* var. *lixianensis*

oblasti: Gansu, Henan, Hubei, Shaanxi, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 2 - 10m. Borka je hnědá. Větve jsou načervenalé až šedohnědé, v mládí 4hranné a ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou bledězelené, eliptické až vejčité (i kulaté), mohou být kožovité, špičaté, dlouhé 4 - 15cm, široké 2,5 - 8cm, báze klínovitá až srdčitá, spodní strana šedozelená a žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek. Květenství má průměr 5 - 10cm, vlastní květy mají 1 - 6mm stopku a průměr 6 - 8mm. Plodem je tmavěčervená až černá prakticky kulatá peckovice průměru 4 - 6mm a obsahuje pecky délky 3 - 4mm a šířky 2,8 - 3,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *poliophylla*/*C. poliophylla*/*C. poliophylla* var. *microphylla*/*Swida poliophylla* - listy na spodní straně na centrální žilce hnědě přitiskle ochlupené; poupata prakticky kulatá, semeníky ochlupené
- subsp. *schindleri*/*C. daijinensis*/*C. fulvescens*/*C. lixianensis*/*C. malifolia*/*C. monbeigii*/*C. monbeigii* subsp. *crassa*/*C. monbeigii* subsp. *populifolia*/*C. poliophylla* var. *praelonga*/*C. scabrida*/*C. xanthotricha*/*Swida daijinensis*/*Swida fulvescens*/*Swida monbeigii*/*Swida monbeigii* var. *crassa*/*Swida monbeigii* var. *populifolia*/*Swida monbeigii* var. *xanthotricha*/*Swida poliophylla* var. *malifolia*/*Swida poliophylla* var. *praelonga*/*Swida scabrida*/*Swida schindleri*/*Swida schindleri* var. *lixianensis* - listy na spodní straně na centrální žilce nažloutle zkadeřeně ochlupené; poupata kuželovitá, semeníky odstále ochlupené

Cornus sericea (Svída výběžkatá)

synonyma: *C. alba* f. *azurea*, *C. alba* f. *baileyi*, *C. alba* subsp. *baileyi*, *C. alba* subsp. *stolonifera*, *C. alba* var. *angustipetala*, *C. alba* var. *baileyi*, *C. alba* var. *behnschi*, *C. alba* var. *californica*, *C. alba* var. *coloradensis*, *C. alba* var. *elata*, *C. alba* var. *elongata*, *C. alba* var. *flaviramea*, *C. alba* var. *interior*, *C. alba* var. *nitida*, *C. alba* var. *splendens*, *C. baileyi*, *C. californica*, *C. californica* var. *nevadensis*, *C. candissima*, *C. instolonea*, *C. interior*, *C. nelsonii*, *C. pubescens*, *C. pubescens* var. *californica*, *C. purshii*, *C. sericea* f. *baileyi*, *C. sericea* f. *californica*, *C. sericea* f. *interior*, *C. sericea* f. *stolonifera*, *C. sericea* subsp. *stolonifera*, *C. sericea* var. *oblongifolia*, *C. stolonifera*, *C. stolonifera* f. *angustior*, *C. stolonifera* f. *azurea*, *C. stolonifera* f. *baileyi*, *C. stolonifera* f. *californica*, *C. stolonifera* f. *dolichocarpa*, *C. stolonifera* f. *flaviramea*, *C. stolonifera* f. *interior*, *C. stolonifera* f. *repens*, *C. stolonifera* var. *angustipetala*, *C. stolonifera* var. *baileyi*, *C. stolonifera* var. *behnschi*, *C. stolonifera* var. *californica*, *C. stolonifera* var. *coloradense*, *C. stolonifera* var. *elata*, *C. stolonifera* var. *elongata*, *C. stolonifera* var. *flaviramea*, *C. stolonifera* var. *interior*, *C. stolonifera* var. *nitida*, *C. stolonifera* var. *riparia*, *C. stolonifera* var. *splendens*, *Ossea instolonea*, *Ossea interior*, *Swida alba* subsp. *stolonifera*, *Swida alba* var. *flaviramea*, *Swida baileyi*, *Swida californica*, *Swida instolonea*, *Swida interior*, *Swida sericea*, *Swida stolonifera*, *Swida stolonifera* var. *riparia*, *Thelycrania baileyi*, *Thelycrania californica*, *Thelycrania instolonea*, *Thelycrania interior*, *Thelycrania interna*, *Thelycrania sericea*, *Thelycrania stolonifera*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine,

Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, S Mexiko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste od Aljašky po Mexiko v podobě keře se širokou korunou. Dorůstá výšky 1 - 1,5 (i 3)m a velké šířky. Větve jsou poléhavé, dokáží znovu zakořenit, v mládí krátce ochlupené, v zimě hnědočervené a dřeň je bílá. Listy jsou vstřícné, podlouhlé až vejčité kopinaté, hladké, zelené, dlouhé 5 - 10 (i 15)cm, spodní strana namodralá až bělavá, ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 6 (i 8) párů žilek a řapík má délku 1 - 2cm. Květenstvím je ochlupený vrcholík o průměru 3 - 5 (i 6)cm, vlastní květy drobné, bílé nebo nažloutlé. Plodem jsou bělavé nebo namodralé peckovice o průměru 5 - 8mm a obsahují kulovité pecky. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Almean's Compact' - kompaktní habitus; výška 1,2m
- 'Angustipetala' - korunní lístky malé a špičaté
- 'Avalon Gold' - v 5ti letech výška 2,4 - 3m; kmínky červené; listy po celé léto žluté
- 'Bergesson's Compact' - kompaktnější habitus; výška i šířka do 1,5m; listy mírně menší; květenství 1/2 velikosti
- 'Budd's Yellow'/C. alba 'Budd's Yellow' - výška 1,8 (snad i 3)m, šířka 2,4m; listy zelené, nap podzim žluté; chudě výběžkatá
- 'Cardinal' - kmínky červené; listy bledězelené
- var. coloradensis/C. instolonea (Svída výběžkatá koloradská) - větve hnědočervené, obloukovitě převislé; listy užší a menší; plody modrobílé
- 'Coral Red' - kmínky červené
- 'Elongata' - kmínky zelené; listy 2,5x větší, z obou stran protažené
- 'Farrow' - kompaktní habitus; výška i šířka 0,9 - 1,2m; kmínky červené; listy zelené
- 'Flaviramea'/var. flaviramea/'Gold Twig'/'Lutea' - výška do 1,8m; větve v zimě žlutozelené až žluté, v létě zelenavé; listy tmavězelené, lesklé; plody bílé
- 'Garden Glow' - výška 1,2 - 1,5m, šířka 1,8 - 2,1m; kmínky zelené, v zimě růžovočervené; listy zelené až žluté, široké, na slunci zlaté, na podzim žlutorůžové; plody bílé až modré
- 'Hedgerows Gold'/'Hedgerow's Gold' - výška i šířka 0,9 - 1,8m; kmínky tmavěčervené; listy tmavězelené, bledězelené až žluté, v mládí žluté okraje, později béžovobílé
- 'Cheyenne' - výška 1,5m; kmínky tmavěčervené
- 'Isanti' - kupkovitý habitus; výška 1 - 1,8m; kmínky červené až tmavěčervené; listy menší; květy bílé, menší
- 'Ivory Hallo' - béžové nepravidelné okraje listů
- 'Kelsey'/'Kelsey Dwarf'/'Kelseyi' - výška i šířka 0,4 - 0,75 (i 1)m; kmínky červené až hnědočervené; listy na podzim hnědozelené
- 'Kelsey Gold' - výška do 70cm; kmínky červené; listy žlutozelené
- 'Mason' - vzpřímený habitus; výška 0,9 - 1,5m, šířka 1,2m; kmínky žlutozelené, načervenalé až nahnědlé; plodenství bohaté
- 'Midwinter Fire' - kmínky v zimě červené, žluté a oranžové
- 'Nitida' - vzpřímený habitus; mladé větve v zimě zelené; listy lesklejší
- subsp. occidentalis/C. occidentalis - východ Severní Ameriky; opadavý keř (i strom); výška 2 - 6m; větve holé, tmavě růžovofialové; listy kopinaté, vejčité nebo eliptické, tupé nebo špičaté, tmavězelené, řídce ochlupené, dlouhé 4 - 10cm, široké 3 - 5cm, báze klínovitá až zakulacená či prakticky srdčitá, spodní strana plstnatá, namodralá, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek, řapíky dlouhé 1 - 1,5cm, ochlupené; květenstvím je ochlupený zploštělý vrcholík šířky 4 - 6cm, květy žltobílé, mají 4 - 7mm ochlupenou stopku, kališní lístky dlouhé 0,7mm, korunní lístky jsou dlouhé 3 - 4mm; plody bílé průměru 8mm
- 'Pendula' - nízký; větve obloukovité
- 'Pumila' - zakrslý habitus

- 'Rosco'/'Kelsey's Gold' - zakrslý habitus; listy na jaře žlutozelené až žluté; pomalý růst
- 'Ruby' - výška do 2,5m; větve v zimě červené
- 'Silver & Gold'/'Silver and Gold' - široký vzpřímený habitus; výška do 2m; větve žluté až žlutozelené; listy zelené až tmavězelené, na okraji stříbrobílé
- 'Silver Lining' - listy šedozeleň se širokým asymetrickým béžovobílým okrajem
- 'Sunshine' - výška 2,4 - 3m; větve v mládí načervenalé; listy v různé intenzitě zelené se žlutými až béžovobílými okraji a tečkami, náchylné na popálení
- 'Variegata' - vzpřímený vzrůstný habitus; listy s úzkými bílými až bledězelenými okraji a světlebéžovými stříkáním
- 'White Gold'/'White Spot' - široce vzpřímený habitus; výška do 1,8m; kmínky v zimě žluté až žlutozelené; listy mají stříbrobílý okraj, některé kropenaté

Vyhovují jí kyselé i rašelinné až neutrální půdy. Dobře snáší vlhko.

Množí se hřížením, odkopky nebo dřevitými řízkami.

Cornus sessilis

synonyma: *Macrocarpium sessile*, *Swida sessilis*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 4,5m. Větve jsou šedohnědé, v mládí mírně ochlupené a zelené. Listy jsou eliptické až mírně vejčité, špičaté, bledězelené, na podzim růžovofialové, mohou být řídce ochlupené, dlouhé 4,5 - 9cm, široké 2 - 3,5cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 4 páry zapuštěných žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je přisedlý okolík průměru do 5cm se záhy opadajícími 3 - 4mi žlutými listeny, vlastní květy žluté až béžovobílé, mají 1cm stopku, kališní lístky dlouhé 0,5mm a korunní lístky jsou dlouhé 3mm. Plodem je vejčitá až eliptická lesklá peckovnice délky 1 - 1,5cm v barvě žluté, červené nebo černé.

Cornus stricta (Svída modrá)

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v USA v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Větve jsou šedé nebo nazelenalé s bílou dřevinou, v mládí červené až růžovofialovohnědé. Listy jsou vejčité, kopinaté nebo obkopinaté, špičaté, bledězelené, mohou být ochlupené, dlouhé 3 - 9cm, báze klínovitá, spodní strana světlejší, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky bývají dlouhé 1 - 1,5cm. Květenstvím je zpravidla plochý vrcholík průměru 3 - 6cm, vlastní květy jsou bílé, mají 2 - 6mm stopku, kališní lístky délky 0,7mm a korunní lístky jsou dlouhé 3,5 - 4mm. Plody jsou modré, kulaté, průměru 5 - 6mm a obsahují 1 - 2 semena.

Cornus suecica (Svída švédská)

synonyma: *Arctocrania suecica*, *Chamaepericlymenum suecicum*, *Chloranthus integrifolius*, *Cornella suecica*, *C. biramis*, *C. borealis*, *C. herbacea*, *C. instolonea*, *C. suecica* f. *semivirescens*, *Eukrania suecica*, *Ossea instolonea*, *Suida instolonea*, *Swida instolonea*, *Swida suecica*, *Thelycrania instolonea*

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Labrador, Německo, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Quebec, S Asie, S Japonsko, Severozápadní Teritorium, SV Evropa, SZ Asie, Švédsko

Pochází ze severu Eurázie a severu Severní Ameriky a roste v podobě polokeře (větve odumírají prakticky až k zemi). Dorůstá výšky 10 - 15 (i 25)cm. Pod zemí vytváří vodorovné oddenky. Listy jsou přisedlé, kulaté, vejčité, eliptické nebo kopinaté, špičaté nebo tupé, na podzim červené, dlouhé 1 - 4cm, báze kulatá nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a spodní listy jsou pouze šupinovité a nahnědlé. Kvete červenými květy se 4mi bílými listeny délky 0,8 - 1,6cm, šířky 0,5 - 1cm, kališní lístky 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,3 - 0,5mm, modré nebo narůžovofialové, korunní lístky úzce 3úhlé, dlouhé 1 - 2mm a modré až růžovofialovočervené. Plody jsou vejčité kulovité až kulovité, červené, velikosti 0,5 - 1cm, pecky jsou kulaté a průměru 3 - 3,5mm.

Cornus ulotricha

synonyma: *C. ulotricha* var. *leptophylla*, *Swida ulotricha*, *Swida ulotricha* var. *leptophylla*

oblasti: Gansu, Hainan, Henan, Shaanxi, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu (i keře). Dorůstá výšky 1,5 - 20m. Borka je šedá. Větve jsou žlutohnědé, v mládí červenohnědé a řídce ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou vejčité až eliptické, zašpičaté, dlouhé 9 - 15cm, široké 3 - 9cm, spodní strana je našedlá, zpravidla ochlupená, báze zakulacená, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,8cm. Květenství má průměr 8 - 12cm, vlastní květy jsou bílé, průměru 6 - 8mm a mají 0,2 - 2mm stopku. Plody jsou modročerné, prakticky kulaté, průměru 4,3 - 4,5mm a pecky mají v průměru 3 - 4mm.

Cornus unalaschkensis

synonyma: *Chamaepericlymenum unalaschkense*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Oregon, V Asie, Washington, Yukon

Pochází z Dálného Východu, Aleutských ostrovů a severovýchodu Severní Ameriky. Možná kříženec *C. canadensis* a *C. suecica*. Roste v podobě keře. Listy vyrůstají v 6tičetných přeslenech na koncích kmínků, pod nimi je 1 pár větších listů, řapíky mohou chybět, listy jsou eliptické až obvejčité a špičaté (i dlouze). Květenství mívá delší stopku než čepel, vlastní květy mají korunní lístky červenorůžovofialové s bezbarvým okrajem.

Cornus volkenskii

synonyma: *Afrocrania volkenskii*

Cornus walteri

synonyma: *C. coreana*, *C. henryi*, *C. walteri* var. *confertiflora*, *C. walteri* var. *insignis*, *C. yunnanensis*, *Swida coreana*, *Swida walteri*, *Swida walteri* var. *confertiflora*, *Swida walteri* var. *insignis*, *Thelycrania coreana*

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu s protáhlou korunou. Dorůstá výška 6 - 15m. Borka je tmavěšedá. Větve jsou žlutozelené, v mládí zelené, žlutozelené nebo načervenalé či narůžovofialové. Listy vyrůstají vstřícně, jsou eliptické až vejčité, zašpičaté, dlouhé 4 - 15cm,

široké 1,7 - 8cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 3,5cm. Květenství je ochlupené, průměru 5 - 9cm a vlastní květy mají 0,8 - 2,7mm stopku. Plodem je černá kulovitá peckovice průměru 6 - 8mm a obsahuje zploštělé kulovité pecky délky 5mm a šířky 4mm.

Cornus wilsoniana

synonyma: *C. fordii*, *C. kweichowensis*, *Swida wilsoniana*

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 18 (i 40)m. Borka je šedá až zelenošedá. Větve jsou hnědé, s lenticelami, v mládí šedozelené a ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou eliptické až mírně vejčité, mírně podvinuté, zašpičatělé, dlouhé 6 - 12cm, široké 2 - 6cm, spodní strana šedozelená, ochlupená, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 2cm. Květenství má průměr 6 - 10cm a vlastní květy jsou bílé průměru 7mm. Plody jsou růžovofialové až černé, kulovité, průměru 6 - 7mm a obsahuje kulaté pecky průměru 4 - 5mm.

Cornus x acadiensis

synonyma: *Swida x acadiensis*

oblasti: Nové Skotsko

Cornus x arnoldiana (Svída Arnoldova)

synonyma: *Swida x arnoldiana*

oblasti: Massachusetts, Missouri, Ohio, Pennsylvania

Kříženec *C. obliqua* a *C. racemosa*. Habitus je rozkladitější než u *C. racemosa*. Větve jsou v mládí slabé, ve 2. roce šedé. Květenství je méně ochlupené. Plody jsou bílé až bleděmodré.

Cornus x dunbarii

synonyma: *Swida x dunbarii*

Cornus x elwinortonii

Kříženec *C. kousa x nuttallii*. Roste v podobě vzpřímeného nebo kulovitého stromu. Dorůstá výšky do 10m. Borka je drsná a na bázi kmene se odlupuje. Listy vyrůstají vstřícně, jsou vejčité až obvejčité, mohou být mírně zvlněné, hrotité, ochlupené, dlouhé 10,3 - 15,3cm, široké 5,9 - 9,1cm, báze klínovitá až zkosená, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je kulovitá 55 - 80tičetná hlávka na 1,6 - 8cm stopce podepřená 4 (i 5 - 6)ti páry listenů, listeny jsou vejčité až kopinaté, mohou se překrývat, mají délku 5 - 8cm, šířku 3,5 - 7cm, bývají bílé, mohou být růžové, špičaté, vlastní květy jsou oboupohlavné, 4četné, kališní laloky vejčité, korunní obvejčité. Plodem je peckovice.

Cornus x friedlanderii

oblasti: Michigan

Cornus x rutgersensis

Kříženec *C. kousa* a *C. Florida*. Roste v podobě stromu se vzpřímeným až kulatým habitem. Dorůstá výšky 3 - 10m. Borka je se odlupuje, v mládí je hladká, bleděšedá až hnědá. Listy vyrůstají vstřícně, jsou vejčité až eliptické, mohou být zvlněné, hrotité až špičaté, oboustranně ochlupené, dlouhé 9 - 16,8cm, široké 4,2 - 9,1cm, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 5 párů žilek. Květenství je hlávkovité, kulovité, 30 - 50tičetné na 3,5 - 7,5cm stopce, podepřené 4mi přisedlými listy v křížovitých párech, jsou vejčité až kopinaté, mohou se překrývat, dlouhé 4 - 6,5cm, široké 3 - 6cm, bílé, béžové nebo růžové, špičaté, vlastní květy jsou oboupohlavné, 4četné, korunní laloky jsou obvejčité a mírně špičaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Rutban' - vzpřímený, později rozkladitý habitus; listy tmavězelené, pevné, na podzim tmavěčervené se světlejšími plochami; listy široké, bílé, později béžové až narůžovělé, na bázi se překrývají patentována
- 'Rutcan' - vzpřímený habitus; v 19ti letech výška 6,3m, šířka 5,1m; listy obvejčité, špičaté, bílé, nepřekrývající se patentována
- 'Rutdan'
- 'Rutfan' - menší stromovitý habitus s vodorovnými větvemi; v 19ti letech výška 3,3m, šířka 5,7m; hustě větvená od země; listy široce obvejčité, špičaté, nepřekrývající se patentována
- 'Rutgan' - mírně vzpřímený, později kulovitý habitus; v 19ti letech výška 6m, šířka 5,7m; listy široké, kulaté, mírně se překrývající, bílé až růžové; patentována
- 'Rutlan' - nízko větvený široce rozkladitý habitus; v 19ti letech výška 5,4m, šířka 6,6m; listy se mírně překrývají, bílé, později narůžovělé; patentována
- 'Saturn' - prakticky kulovitý habitus; ve 36ti letech výška 6,7m, šířka 7,8m; listy lesklé, zelené; listy bílé, vejčité až obvejčité, překrývající se, dlouhé 9,3 - 10cm

Cornus x slavinii (Svída Slavinova)

synonyma: *Swida x slavinii*

oblasti: Maine, New York, Ontario, Wisconsin

Kříženec *C. rugosa* a *C. stolonifera*. Podobá se *C. stolonifera*, ale je více vzpřímené. Větve jsou v mládí načervenalé. Listy jsou průnikem obou druhů. Plody jsou namodralé (i bílé).

Cornus x unalaschkensis

synonyma: *Arctocrania x unalaschkensis*, *Cornella x unalaschkensis*, *C. canadensis* var. *intermedia*, *C. x intermedia*, *C. x lepagei*

oblasti: Aljaška, Grónsko, Labrador, Newfoundland, Nové Skotsko, Quebec

Roste na Aljašce, východní Kanadě a Grónsku v podobě polokeře.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K547.php>

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K617.php>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=17>

<http://www.garten.cz/a/cz/827-cornus-mas-drin-obecny/>

<http://www.profizahrada.cz/e/cz/249-drin-obecny-cornus-mas/>

<http://www.zeny.cz/magazin/zahradka/svida-krvava--cornus-sanguinea-.aspx>

<https://www.rostliny.net/>