

Canarina (Kanarína)

čeleď: Campanulaceae

Roste ve východní Africe a na Kanárských ostrovech v podobě hlíznaté opadavé popínavé až poléhavé trvalky. Při poranění roní bílý latex. Kořeny mohou být terestrické nebo epifytické, jsou tenké a dužnaté. Stonek je dutý, nedřevnatí a větví se. Vstříčné listy mohou vyrůstat kromě párů i po 3ks, jsou tupě zubaté až laločnaté a řapíkaté. Květy jsou velké, zvonkovité až nálevkovité v barvě červené až oranžové. Plodem je bobule obsahující mnoho semen. Nejznámějším druhem je *C. canariensis*.

Vyhovuje ji chráněné místo, polostín a vlhká dobře propustná půda.

Množí se řízkem, hlízkami nebo semeny, které roznášejí ptáci.

Canarina abyssinica

synonyma: *C. abyssinica* var. *umbrosa*

oblasti: Etiopie

Pochází z Etiopie.

Canarina canariensis (Kanarína kanárská)

synonyma: *Campanula canariensis*, *C. canariensis* var. *angustifolia*, *C. laevigata*, *Mindium canariense*

oblasti: Makaronésie

Pochází z Kanárských ostrovů. Jedná se o plazivou nebo pnoucí se bylinu. Dorůstá délky 1,5 - 3m. Vstříčné listy mají trojúhelníkově vejčitou až hrálouitou čepel se srdčitou bází a řapík. Kvete v paždí listů červenými až červenooranžovými zvonkově tvarovanými květy s délkou 3 - 6cm, šířky 5cm s 6ti cípy a tmavším žilkováním a vysí směrem dolů. Plodem je žlutooranžová bobule.

Vyhovuje jí prostředí vavřínových lesů.

Canarina eminii

synonyma: *C. elegantissima*, *C. eminii* var. *elgonensis*

oblasti: V Afrika

Pochází z tropické východní Afriky.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/canarina-canariensis/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanar%C3%ADna>

<https://www.rostliny.net/>