

Cananga (Kananga)

čeleď: Annonaceae

Jedná se o tropické stálezelené stromy nebo keře rostoucí v jihovýchodní Asii, Malajsii a Austrálii. Listy jsou velké, celokrajné a řapíkaté. Květenství vyrůstají v paždí listů nebo z uzlin, vlastní květy jsou seskupené ve vrcholcích, hroznech nebo svazečcích, mají 3 kališní lístky se srostlou bází, 6 korunních protáhlých lístků, velké množství tyčinek a blizny jsou kyjovité. Plody jsou stopkaté, podlouhlé a obsahují zploštělá semena. Nejznámějším druhem je *C. odorata*.

Vyhovuje jí teplo, chráněné místo a vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo řízkami.

Cananga latifolia

synonyma: *C. brandisana*, *Canangium brandisanum*, *Canangium latifolium*

Cananga latifolium

synonyma: *Unona latifolia*

Cananga odorata (Kananga vonná)

synonyma: *C. mitrastigma*, *C. odorata* var. *velutina*, *C. scortechinii*, *Canangium mitrastigma*, *Canangium odoratum*, *Canangium scortechinii*, *Fitzgeraldia mitrastigma*, *Unona odorata*, *Uvaria odorata*

oblasti: Austrálie, Filipíny, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie, Melanésie, Myanmar (Barma), Portoriko, Thajsko, Tichý oceán, V Afrika

Pochází z Filipín, Indonésii, ale roste i v Polynésii, Melanésii, Mikronésii a Komorských ostrovech v podobě stálezeleného stromu. Za jediný rok může při vhodných podmínkách vyrůst až o 5m, do průměrné výšky 12 (i 33)m. Borka je světlešedá. Větve jsou protáhlé, převislé a v mládí ochlupené. Střídavě krátce řapíkaté listy jsou eliptické až vejčitékopinaté, špičaté, tečkované, okraje zvlněné, kožovité, lesklé, sytě zelené, dlouhé (7 -) 13 - 20 (i 23)cm, široké 3 - 14cm, báze kulatá, tupá nebo uťatá, žilnatinu tvoří 8 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květy jsou aromatické, žlutozelené (zřídka růžové), tvořené 6ti úzkými okvětními lístky o délce 5 - 7 (i 8)cm, šířce 0,5 - 1,8cm, kalich je tvořený 3mi vejčitými drobně ochlupenými kališními lístky délky 4 - 7mm, šířky 5mm, listeny jsou úzce vejčité, dlouhé 1,5 - 3mm, vyrůstají po (1 -) 2 - 4 (i 6)ti ks na 1 - 5cm dlouhých stopkách a mají 130 - 170 tyčinek délky 1,8 - 3mm. Plodem je kulovitá až vejčitá olivově zelená bobule délky 1,5 - 2,5cm, šířky 1,5cm na 1 - 2cm stopce a obsahuje několik hnědých terčovitých semen. Z květů se vyrábí přípravek používaný v aromaterapii. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *fruticosa*/*C. fruticosum* - Indonésie, Malajsie, Thajsko; zakrslá keřovitá forma; výška 1 - 2m
- var. *odorata* - Austrálie, Indie, Indonésie, Malajsie, Laos, Myanmar, Filipíny, Thajsko; stromová forma; výška 6 - 33m

Vyhovuje jí teplo, plné slunce nebo polostín a kyselá stále vlhká lehčí půda ideálně v tropickém deštěném lese.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cizi/rostlina.php?261>

<http://botany.cz/cs/cananga-odorata/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=179>

<https://www.rostliny.net/>