

Platylobium

čeleď: Fabaceae

Pochází z pobřeží východní a jižní Austrálie včetně Tasmánie. Roste v podobě stálezeleného keře. Listy bývají obvykle vstřícné, jednoduché. Kvete žlutými samostatnými květy nebo v malých skupinkách v paždí listů. Plodem je z jedné strany křídlatý lusk.

Množí se semeny.

Platylobium alternifolium

oblasti: Viktorie

Patří mezi endemity Viktorie, Austrálie. Roste v podobě poléhavého až plazivého keře. Střídavé listy mají srdčitou až vejčitou, trojúhelníkovou nebo kulatou čepel se zaobleným nebo špičatým koncem a délku i šířku 0,6 - 2,6cm. Řapíky jsou dlouhé 0,3 - 2cm. Kvete samostatnými květy v paždí listy na 1,5 - 2cm stopce v barvě růžovočervené. Horní laloky mají délku 0,7 - 1cm. Plodem je lusk s až 2cm křídlem.

Platylobium formosum

synonyma: *P. formosum* subsp. *parviflorum*, *P. formosum* var. *cordifolium*, *P. formosum* var. *parviflorum*, *P. formosum* var. *typicum*, *P. parviflorum*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Patří mezi endemity Nového Jižního Walesu, Viktorie, Tasmánie a Queenslandu, Austrálie. Roste v podobě vzpřímeného, plazivého nebo rozprostřeného keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 2,5)m. Kmínky mohou být až hustě ochlupené. Obvykle vstřícné listy mají téměř neznatelný řapík, vejčitý tvar s pichlavou špičkou, barva je tmavězelená, spodní strana je světlejší. Délka se pohybuje v rozmezí 2 - 5 (i 7)cm a šířka 1 - 2,5 (i 4)cm. Kvete v paždí listů žlutooranžovými květy se červeným středem na dlouhé ochlupené stopce po 1 - 4ks. Plodem je plochý lusk délky 2 - 4cm s až 4mm širokým křídlem.

Platylobium infecundum

oblasti: Viktorie

Patří mezi endemity Viktorie.

Platylobium montanum

oblasti: Austrálie

Patří mezi endemity Austrálie. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. montanum

- subsp. prostratum

Platylobium obtusangulum

synonyma: *P. macrocalyx*, *P. obtusangulum* var. *spinulosum*

oblasti: Jižní Austrálie, Tasmánie, Viktorie

Roste v Jižní Austrálii, Tasmánii a Viktorii v podobě vzpřímeného nebo plazivého keře. Dorůstá výšky až 1m. Kmínky mohou být hustě ochlupené. Vstřícné listy mají proměnlivý tvar (široce trojúhelníkovitý až střelovitý nebo 3laločný či srdčitý) s pichlavou špičkou délky 1 - 3cm, šířky 0,6 - 3,8cm a jsou téměř nebo zcela přisedlé. Kvete na jaře žlutými květy s červeným středem po 1 - 3ks v paždí listů. Horní laloky jsou dlouhé 1,2 - 1,5cm, spodní 0,8 - 1cm. Plodem je lusk délky 1,4 - 2,5cm a šířky 1 - 1,4cm s 5mm širokým křídlem.

Platylobium parviflorum

oblasti: Austrálie

Patří mezi endemity Austrálie.

Platylobium reflexum

oblasti: Viktorie

Patří mezi endemity Viktorie, Austrálie.

Platylobium rotundum

oblasti: Viktorie

Patří mezi endemity Viktorie, Austrálie.

Platylobium triangulare

synonyma: *P. angulare*, *P. murrayanum*

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste jako endemit v Tasmánii a Viktorii v podobě rozprostředného až vystoupavého keře. Kmínky mohou být hustě ochlupené. Vstřícné listy jsou téměř nebo zcela přisedlé, tvaru široce trojúhelníkovitého až srdčitého či šípovitého délky 1 - 3,5cm a šířky 0,6 - 2,6cm. Kvete po 1 - 3ks v paždí listů na ochlupené 0,6 - 1,8cm dlouhé stopce. Ochlupený je i kalich. Horní lalok má délku 9,5 - 12,5mm a spodní 4,5 - 6,5mm. Plodem je lusk s až 4cm širokým křídlem.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2780>

<https://www.rostliny.net/>