

Angophora

čeleď: Myrtaceae

Pochází z východní Austrálie. Roste v podobě stromu nebo velkého keře. Borka je bývá drsná a odlupující se v šupinách. Větve bývají zkroucené. Listy jsou vstřícné. Kvete v 3 - 7mičetných okolících oboupohlavnými květy v barvě béžové nebo bílé. Plodem je dřevnatá žebernatá tobolka.

Vyhovuje mu chudá lehká písčité půda. Špatně snáší mrazy.

Množí se semeny.

Angophora bakeri

synonyma: *Eucalyptus angustata*

oblasti: Nový Jižní Wales

Pochází z Nového Jižního Walesu. Druhové jméno bylo vybráno na počest Richarda Thomase Bakera. Dorůstá výšky 2 - 10 (i 18)m. Borka je vláknitá a šedá. Listy mají úzce kopinatý tvar délky 6 - 10cm a šířky 0,5 - 1cm. Řapíky mohou být zploštělé. Kvete v kulatém 3 - 7mičetném kulatém okolíku. Plody mají vejčitý až válcovitý tvar světlehnědé nebo světlešedé barvy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *barkeri* - výška do 10m; listy délky 5 - 9,5cm a šířky 0,5 - 1cm
- subsp. *crassifolia* - výška do 10m; listy délky 7,5 - 11cm a šířky 0,8 - 1,5cm
- subsp. *paludosa* - výška do 18m; listy délky 6,5 - 10cm a šířky 0,7 - 2cm

Vyhovují mu písčité půdy.

Angophora costata

synonyma: *A. lanceolata* var. *hispida*, *Eucalyptus apocynifolia*, *Melaleuca costata*, *Metrosideros apocynifolia*, *Metrosideros costata*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu s rozložitou korunou. Dorůstá výšky 15 - 25 (i 30)m při průměru kmene 1,2m. Borka je růžová až růžovošedá a odlupuje se na jaře. Větve jsou zkroucené. Listy jsou úzce eliptická až úzce vejčitá, zapšíchatělá, lesklá, tmavězelená, v mládí červenooranžové a řapíkaté. Kvete v 3četném okolíku s 5ti okvětními lístky délky 4mm a šířky 3 - 4mm. Plody mají zvonkovitý až vejčitý tvar. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *costata* - výška do 30m; čepel délky 8 - 19cm a šířka 1,2 - 3,5cm
- subsp. *euryphylla* - výška do 2,5m; čepel délky 14 - 18cm a šířka 2,5 - 6cm
- subsp. *leiocarpa* - výška do 25m; čepel délky 6,5 - 16cm a šířka 0,7 - 3cm

Vyhovují mu pískovcové skály.

Angophora crassifolia

synonyma: *A. bakeri* subsp. *crassifolia*, *Eucalyptus crassifolia*

oblasti: Nový Jižní Wales

Jedná se o menší (max. 15m) strom rostoucí na severu Sydney v Novém Jižním Walesu.

Angophora euryphylla

synonyma: *A. costata* subsp. *euryphylla*, *Eucalyptus euryphylla*

Angophora exul

synonyma: *Eucalyptus exul*

Angophora floribunda

synonyma: *Acmena elliptica*, *Acmena floribunda*, *A. intermedia*, *A. ochrophylla*, *Eucalyptus florida*, *Metrosideros floribunda*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste ve státech Queensland, Nový Jižní Wales a Viktorie v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m. Borka má hnědou až šedou barvu a je vláknitá. Vstřícné listy mají tmavězelenou barvu, kopinatý až oválný tvar délky 5,5 - 15cm, šířky 1 - 5cm a mají řapík délky 0,6 - 1,5cm. Kvete béžovobílými květy v 3 - 7mikvětém okolíku se stopkou délky 1 - 2,5cm. Stopka květu má délku 0,4 - 1cm. Okvětních lístků je 5 a mají délku 2 - 4mm a šířku 3mm. Plody mají kulovitý až vejčitý (i válcovitý) tvar délky 0,7 - 1cm a průměru 0,8 - 1cm.

Angophora hispida

synonyma: *A. cordifolia*, *Eucalyptus hirsuta*, *Eucalyptus hispida*, *Metrosideros cordifolia*, *Metrosideros hirsuta*, *Metrosideros hispida*

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 2 - 3 (i 8)m. Borka má šedou až šedohnědou barvu a je drsná. Listy jsou vstřícné, eliptické, šedozelené, v mládí červeně ochlupené, dlouhé 5 - 10cm, široké 2,5 - 4,5cm, na bázi srdčité, spodní strana je našedlá a řapíky jsou dlouhé max. 4mm. Kvete béžovobílými květy v 3 - 7mičetném okolíku na 0,8 - 3,2cm stopce, korunní lístky mají délku 5 - 8mm a šířku 0,7 - 1cm. Plody jsou zvonkovité až baňkovité, dlouhé 1,5 - 2,6cm, průměru 1,3 - 2cm a obsahuje eliptická hnědá plochá semena délky 0,8 - 1cm.

Angophora inopina

synonyma: *Eucalyptus inopina*

oblasti: V Austrálii

Pochází z východní Austrálie.

Angophora leiocarpa

synonyma: *A. costata* subsp. *leiocarpa*, *Eucalyptus leiocarpa*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Novém Jižním Walesu a Queenslandu do výšky až 25m. Borka má šedou až béžovou barvu.

Angophora melanoxylon

synonyma: *A. intermedia* var. *melanoxylon*, *Eucalyptus melana*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Queenslandu a Novém Jižním Walesu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 15m. Borka je tmavěšedá, vláknitá. Listy starších stromů jsou řapíkaté. Čepel je úzce eliptická, zašpičatělá (vzácně tupá), vrchní strana modrošedá nebo šedozelená, dlouhá 4 - 8cm a široká 0,7 - 1,7cm. Řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Kvete v 7mičetných okolících na 0,6 - 2,3cm stopce. Vlastní květy mají stopku dlouhou 3 - 9mm a tvoří je okvětní lístky délky 4mm a šířky 3 - 4mm. Plody jsou vejčité až válcovité, dlouhé 0,8 - 1,3cm a v průměru mají 0,7 - 1,1cm.

Angophora paludosa

synonyma: *Eucalyptus palustris*

Angophora robur

synonyma: *Eucalyptus robur*

Angophora subvelutina

synonyma: *A. velutina*, *Eucalyptus subvelutina*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Queenslandu a Novém Jižním Walesu v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 20 (i 35)m. Borka je vláknitá až šedá. Vstřícné listy mají eliptický tvar se špičkou nebo i tupým koncem, šedozelenou barvu, délku 7 - 10cm a šířku 3 - 5cm. Dospělé rostliny mají řapíky délky 0 - 3mm. Kvete v 7mičetném okolíku na 0,9 - 3cm stopce. Vlastní květy mají stopku délky 0,3 - 1cm a tvoří je okvětní lístky délky 3 - 4mm a šířky 3mm. Plody jsou vejčité, dlouhé i široké 0,7 - 1,1cm.

Angophora woodsiana

synonyma: *A. floribunda* var. *woodsiana*, *A. intermedia* var. *woodsiana*, *A. lanceolata* var. *woodsiana*, *Eucalyptus woodsiana*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste na severovýchodě Nového Jižního Walesu a jihovýchodě Queenslandu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 20m. Borka je vláknitá, šedá až šedohnědá. Starší rostliny mají řapíky délky 1 - 1,7cm. Čepel je kopinatá až úzce vejčitá, zašpičatělá, celokrajná, dlouhá 9 - 15cm a široká 1,7 -

3cm. Kvete v 3 - 7mičetném okolíku na 4hranné stopce délky 1,5 - 3,5cm. Vlastní květy mají kulatou stopku délky 1,5 - 2,5cm a tvoří je okvětní lístky délky 3 - 4mm a šířky 4mm. Plody jsou vejčité až válcovité, dlouhé 1,1 - 1,5cm a v průměru mají 1 - 1,5cm.

Angophora x clelandii

Angophora x dichromophloia

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1454>

<https://www.rostliny.net/>