

Buckinghamia

čeleď: Proteaceae

Existují pouze 2 druhy. Patří mezi endemity deštných pralesů na severu Queenslandu. Rodové jméno bylo vybráno na počest anglického Lorda Buckinghamu. Dorůstají výšky až 30m. Větve jsou zakulacené. Listy jsou jednoduché. Kvete oboupohlavními květy. Plodem je širce vejčitý měchýřek.

Buckinghamia celsissima

oblasti: Queensland

Pochází ze severního Queenslandu. V místě původu dorůstá výšky 10 - 30m, ale v kultuře pouze 4 - 12m. Mladé větve jsou hědě ochlupené a postupně olysávají. Listy jsou tmavězelené, v mládí červené, na spodní straně bělavé nebo namodralé. Listy mladých rostlin mají 1 nebo více laloků, zatímco u dospělých laloky chybí a jsou eliptické. Dorůstají délky 8 - 16cm, 3 - 7cm šířky a délka řapíků je 1 - 2cm. Kvete béžovými až bílými květy v létě v převislých klasech o délce až 20 (i 27)cm. Okvětní lístky mají délku 0,7 - 1cm a květní stopka je dlouhá 6 - 8mm. Plodem je měchýřek obsahující hnědá semena.

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín.

Buckinghamia ferruginiflora

oblasti: Queensland

Pochází ze severovýchodního Queenslandu. Roste v podobě stromu. Mladé větve jsou rezavě ochlupené. Listy mají řapíky délky 1 - 2,5cm, čepel eliptickou podlouhlou se špičatým nebo tupým koncem, spodní stranu zelenou a lesklou, délku 9 - 20cm a šířku 2 - 6cm. Kvete v 8 - 20cm hustě rezavě ochlupeném květenství. Vlasní květy jsou béžovohnědé a okvětní lístky dlouhé 1cm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=958>

<https://www.rostliny.net/>