

Leucocoryne

synonyma: Antheroceras, Chrysocoryne, Erinna, Pabellonia, Stematium, Stephanolirion

čeleď: Amaryllidaceae

Rodové jméno je složeninou řeckých slov leukos = bílý a koryne = palice. Roste v Čile. Dorůstá výšky 30cm. Pod zemí vytváří vejčitou cibuli o průměru zhruba 5cm, ze které vyrůstají čárkovité až 30cm dlouhé listy vydávající česnekové aroma. Kvete modrými, bílými nebo fialovými hvězdovitými květy v až 3 - 12tikvětém okolíku. Plodem je tobolka. Nejznámějším druhem je L. ixioides.

Cibule se vysazují do hloubky 8 - 10cm do dobře propustné půdy na chráněné místo. U nás je možné pěstování pouze v nejteplejších oblastech. Od podzimu do jara je zvyklá na srážky, léto ale je suché a horké.

Množí se dceřinými cibulkami nebo semeny.

Leucocoryne alliacea

synonyma: Antheroceras ornithogaloides, Brodiaea alliacea, L. connivens, L. montana

oblasti: Čile

Leucocoryne angosturae

oblasti: Čile

Leucocoryne angustipetala

oblasti: Čile

Leucocoryne appendiculata

oblasti: Čile

Leucocoryne arrayanensis

oblasti: Čile

Leucocoryne candida

oblasti: Čile

Leucocoryne codehuensis

oblasti: Čile

Leucocoryne conconensis

oblasti: Čile

Leucocoryne coquimbensis

oblasti: Čile

Leucocoryne coronata

synonyma: Stemmadium narcissoides, Stephanolirion narcissoides, Tristagma narcissoides

oblasti: Čile

Leucocoryne curacavina

oblasti: Čile

Leucocoryne dimorphopetala

synonyma: Chrysocoryne oxypetala, L. oxypetala, Pabellonia oxypetala, Tristagma dimorphopetalum

oblasti: Čile

Leucocoryne editiana

oblasti: Čile

Leucocoryne foetida

oblasti: Čile

Leucocoryne fragrantissima

oblasti: Čile

Leucocoryne fuscostriata

oblasti: Čile

Leucocoryne gilliesioides

synonyma: Erinna gilliesioides

oblasti: Čile

Leucocoryne inclinata

oblasti: Čile

Leucocoryne incrassata

synonyma: Chrysocoryne incrassata, Pabellonia incrassata

oblasti: Čile

Leucocoryne ixioides

synonyma: Brodiaea ixioides, Hyacinthus chilensis, L. narcissiflora

oblasti: Čile

Dorůstá výšky 40 (i 50)cm. Listy jsou čárkovité a dlouhé. Květy jsou hvězdčovitě, bílé, modré nebo fialové, zpravidla se světlým středem, výrazně sladce aromatické a průměru 5cm.

Množí se cibulkami. Sází se do hloubky 8 - 10cm.

Leucocoryne leucogyna

oblasti: Čile

Leucocoryne lilacea

oblasti: Čile

Leucocoryne lituecensis

oblasti: Čile

Leucocoryne lurida

oblasti: Čile

Leucocoryne macropetala

oblasti: Čile

Leucocoryne maulensis

oblasti: Čile

Leucocoryne modesta

oblasti: Čile

Leucocoryne mollensis

oblasti: Čile

Leucocoryne narcissoides

oblasti: Čile

Leucocoryne odorata

synonyma: Antheroceras odorata

oblasti: Čile

Leucocoryne pachystyla

oblasti: Čile

Leucocoryne pauciflora

oblasti: Čile

Leucocoryne porphyrea

oblasti: Čile

Leucocoryne praealta

oblasti: Čile

Leucocoryne purpurea

synonyma: L. ixioides var. purpurea

oblasti: Čile

Dorůstá výšky 30cm. Květenství je řidší 3 - 8mičetný okolík, vlastní květy jsou růžovofialové s tmavšími žilkami a středem.

Leucocoryne quilimarina

Leucocoryne reflexa

Leucocoryne roblesiana

Leucocoryne rungensis

Leucocoryne simulans

Leucocoryne subulata

Leucocoryne taguataguensis

Leucocoryne talinensis

Leucocoryne tricornis

Leucocoryne ungulifera

Leucocoryne valparadisea

oblasti: Čile

Leucocoryne violacescens

Leucocoryne vittata

<https://www.rostliny.net/>