

Anemopaegma

čeleď: Bignoniaceae

Existuje 30 - 40 druhů. Rostou v tropické Americe v podobě popínavých dřevin. Větve jsou kulaté, mírně v průřezu čtvercové. Listy jsou vstřícné, tvořené 3 - 5ti lístky. Úponky jsou 1 - 3kalnné. Kvete v hroznech zvonkovitými květy s nálevkovitou korunou a 5ti okvětními lístky. Semeníky jsou eliptické. Eliptické jsou i plody v podobě tobolky se stopkou. Semena jsou široce podlouhlá a jsou opatřena průsvitným blanitým křídlem.

Anemopaegma acutifolium

Anemopaegma alatum

Anemopaegma album

synonyma: A. album var. quinquedentata, A. quinquedentatum

Anemopaegma arvense

synonyma: A. mirandum, A. mirandum var. angustifolium, A. mirandum var. glabrum, A. mirandum var. hirsuta, A. mirandum var. latifolium, A. mirandum var. petiolatum, A. mirandum var. puberum, A. mirandum var. pubescens, A. mirandum var. sessilifolium, A. mirandum var. verticellatum, A. sessilifolium, A. subundulatum, Bignonia arvensis, Bignonia miranda, Jacaranda arvensis

oblasti: Střední Brazílie

Anemopaegma brevipes

synonyma: A. bifarium

Anemopaegma chamberlaynii

synonyma: A. chamberlaynii var. brachybotrys, A. chamberlaynii var. tenerior, A. citrifolium, A. longipes, A. racemosum, A. racemosum var. brachybotrys, A. scandens, Bignonia aequinoctialis var. chamberlaynii, Bignonia chamberlaynii, Bignonia scandens, Macfadyena citrifolia, Tabebuia citrifolia

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie, kde roste v podobě liány. Listy jsou zpeřené, tvořené podlouhlými vejčitými až kopinatými lístky s lesklým povrchem, zúženou bází, délkou 5 - 14cm a světlejší spodní stranou. Kvete jasně žlutými tubkovitými květy v úžlabních hroznech.

Anemopaegma chrysanthum

Anemopaegma chrysoleucum

synonyma: A. belizeanum, A. macrocarpum, A. punctulatum, Bignonia chrysoleuca

oblasti: Peru

Roste v Peru. Mladé větve bývají lesklé. Borka je žlutohnědá, místy ochlupená. Palisty jsou dlouhé do 2cm, ale obvykle jsou menší nebo zcela chybí. Listy jsou zepřené, lístky vejčité, obvejčité nebo eliptické a podlouhlé nebo i kopinaté. Báze je zaoblená až tupá či klínovitá, konec špičatý, dorůstají délky do 20cm a šířky do 10cm. Povrch je kožovitý, obvykle lesklý, mírně puchýřnatý, na spodní straně na žilnatině ochlupený až špuinovitý. Kvete žlutými nebo i bílými květy v úžlabním hroznu. Květy mají délku 4 - 8cm a šířku 4,5cm. Plodem jsou lesklé tobolky.

Anemopaegma citrinum

Anemopaegma colombianum

synonyma: Pseudopaegma colombianum

Anemopaegma flavum

synonyma: A. sylvestre, A. symmetricum

Anemopaegma floridum

oblasti: Peru

Anemopaegma foetidum

synonyma: A. maguirei, A. umbellatum

Anemopaegma glaucum

synonyma: A. glaucum var. lanceifolia, A. glaucum var. pubescens, A. glaucum var. triplinervia, A. glaucum var. typus, A. lanceifolium, A. lanceifolium var. puberum, A. triplinervium

oblasti: Střední Brazílie

Anemopaegma goyazense

Anemopaegma gracile

Anemopaegma grandifolium

synonyma: Bignonia adhatodifolia, Bignonia grandifolia, Cupulissa grandifolia

Anemopaegma granvillei

Anemopaegma heringeri

Anemopaegma hilarianum

Anemopaegma insculptum

synonyma: Pseudopaegma insculptum

Anemopaegma ionanthum

Anemopaegma jucundum

synonyma: Pseudopaegma jucundum, Setilobus boae-vistae, Setilobus subcorymbosus

Anemopaegma karstenii

synonyma: A. carrerense, Distictis robinsonii

Anemopaegma laeve

Anemopaegma longidens

synonyma: A. longidentatum, Pseudopaegma longidens

Anemopaegma longipetiolatum

synonyma: A. fiebrigianum

Anemopaegma mirabile

synonyma: Pseudopaegma mirabile

Anemopaegma oligoneuron

synonyma: Pseudopaegma oligoneuron

Anemopaegma orbiculatum

synonyma: Bignonia orbiculata, Jacaranda orbiculata, Peltospermum orbiculatum, Pithecoctenium panamense

Anemopaegma pabstii

Anemopaegma pachyphyllum

Anemopaegma paraense

synonyma: A. grandiflorum, A. surinamense, A. surinamense f. parviflorum

Anemopaegma parkeri

synonyma: A. microcalyx

Anemopaegma patelliforme

Anemopaegma prostratum

Anemopaegma puberulum

synonyma: A. lehmannii, Chodanthus puberulus

oblasti: Guatemala, Honduras, Mexiko

Roste v Guatemale, Hondurasu a Mexiku. Mladé větve jsou ochlupená, řídce žláznatě šupinaté. Listy jsou vstřícné, 2četné s lístky téměř kožovitými, vejčitého nebo podlouhlého tvaru s tupou špičkou a tupou nebo zaoblenou bází, mají délku 6,5 - 11cm, šířku 4 - 7cm, vrchní strana je řídce ochlupená a obě strany jsou huště tečkované. Na spodní straně je zapuštěná žilnatina. Kvete v úžlabním hroznu s 8 - 9mm listeny, kalich je zvonkovitý, zoubkovaný, dlouhý 7 - 8mm, koruna je dlouhá 5,5 - 6,5cm a má 1 - 1,3cm laloky. Plodem je 12,5cm dlouhá a 6,5cm široká zploštělá tobolka se špičatou bází a stopkou délky 3cm. Semena mají široká křídla.

Anemopaegma robustum

Anemopaegma rugosum

synonyma: Bignonia rugosa

Anemopaegma salicifolium

synonyma: Bignonia salicifolia

Anemopaegma santaritense

Anemopaegma scabriusculum

Anemopaegma setilobum

Anemopaegma velutinum

synonyma: A. velutinum var. grandiflorum, Bignonia lanceolata, Doxantha lanceolata

Anemopaegma villosum

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1451>

<https://www.rostliny.net/>