

Sanguinaria (Krevnice)

čeleď: Papaveraceae

Sanguinaria canadensis (Krevnice kanadská)

synonyma: S. australis, S. canadensis var. rotundifolia, S. dilleniana, S. rotundifolia

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Jedná se o hajní až vřesovištní rostlinu. Dorůstá výšky 14 - 20 (i 30)cm. Listy mají ledvinovitý laločnatý tvar s žilnatinou na spodní straně, jsou zelené s modrošedým nádechem a v mládí jsou ztočené. Kvete bílými květy (existují i poloplné a plnokvěté formy). Při poranění roní červenou tekutinu podle které dostala český název. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Flore Pleno' - plnokvětá
- 'Multiplex' - plnokvětá

Vyhovuje ji polostín, vlhko a kyselá dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Další informace:

<http://www.primula.estranky.cz/clanky/abeceda-skalnicek/skalnický-s/sanguinaria.html>

<https://www.rostliny.net/>