

Dudleya

čeleď: Crassulaceae

Roste na jihozápadě Severní Ameriky v přizemních listových růžicích. Listy jsou zelené až šedou a ztlustlé, voskovitě ojíňené, protáhlé až kopistovité. Kvete na až 1m vysokém stvolu v latě, vlastní květy jsou 5tičetné, bílé (i červené nebo žluté).

Vyhovuje ji dobře propustná půda a plné slunce.

Množí se semeny.

Dudleya abramsii

synonyma: *Cotyledon abramsii*, *D. tenuis*, *Echeveria abramsii*, *Echeveria tenuis*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornii a Kalifornském zálivu, Mexiko. Vytváří přizemní listovou růžici kolem centrálního kaudexu. Listy jsou voskovité, ztlustlé, 3úhelníkovitého až vejčitého tvaru se špičkou a celkovou délkou až 11cm. Obvykle bývají ale mnohem kratší. Květenství je vzpřímené a tvoří jej až 15 květů. Mají 5 malých okvětních lístků. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *abramsii* - Peninsular Ranges
- subsp. *affinis* - San Bernardino Mountains
- subsp. *bettinae* - San Louis Obispo County
- subsp. *murina* - San Luis Obispo County
- subsp. *parva* - Santa Monica Mountains

Dudleya acuminata

synonyma: *D. brandegeei*, *D. brevipes*, *Echeveria acuminata*, *Echeveria brandegeei*, *Echeveria brevipes*

Dudleya albida

Dudleya albiflora

synonyma: *D. moranii*, *Echeveria albiflora*

oblasti: Kalifornský záliv

Roste v Kalifornském zálivu, Mexiko.

Dudleya anomala

synonyma: *Stylophyllum anomala*, *Stylophyllum coronatum*, *Stylophyllum insulare*

Dudleya anthonyi

synonyma: *Cotyledon anthonyi*, *Echeveria anthonyi*

Dudleya attenuata

synonyma: *Cotyledon attenuata*, *Cotyledon edulis* var. *attenuata*, *Echeveria attenuata*, *Stylophyllum attenuatum*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornském zálivu, Mexiko.

Dudleya blochmanae

synonyma: *Sedum blochmaniae*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste při pobřeží v Kalifornii a v Kalifornském zálivu. Listy jsou trojúhelníkovité, ztlustlé, zašpičatělé, v barvě hnědé až červenofialové či nazelenalé. Kvete na vzpřímeném květenství s 5ti okvětními bílými lístky ve tvaru hvězdy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *brevifolia* - San Diego Country; výška 1 - 4cm

Dudleya brittonii

oblasti: Kalifornský záliv

Roste v Kalifornském zálivu v Mexiku. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou šedomodré, voskovité, ztlustlé, kopinaté až 3úhlé, špičaté a dlouhé do 10cm. Květenstvím je bohatá lata na větveném stonku s výškou až 1m, vlastní květy jsou žluté a hvězdíkovité.

Dudleya caespitosa

synonyma: *Cotyledon caespitosa*, *Cotyledon helleri*, *Cotyledon linguiformis*, *Cotyledon reflexa*, *D. cotyledon*, *D. helleri*, *Echeveria caespitosa*, *Echeveria californica*, *Echeveria cotyledon*, *Echeveria helleri*, *Sedum cotyledon*

oblasti: Kalifornie

Roste v Kalifornii. Dorůstá výšky až 20cm. Vytváří přízemní růžici o průměru až 20cm a tvoří ji až 30 listů. Listy jsou dužnaté, podlouhlé, zašpičatělé, světlezelené, tlusté až 5 - 15cm, široké 1 - 2cm a na špičce červené. Květenstvím je lata na 60cm vzpřímeném stonku, vlastní květy mohou být zelené, žluté nebo červené a hvězdíkovité.

Dudleya calcicola

synonyma: *D. abramsii* subsp. *calcicola*

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Patří mezi endemity Kalifornie a pohoří Sierra Nevada. Listová růžice dorůstá šířky až 10cm. Listy jsou mečovité až šiškovité, dlouhé až 10cm široké 1cm a jsou i ochlupené. Bývají i narůžovělé nebo nažloutlé. Květenství je vzpřímené a tvoří jej 2 - 8 květů světležluté až červenožluté barvy.

Okvětních lístků je 5 a jsou dlouhé 5mm.

Dudleya campanulata

Dudleya candelabrum

synonyma: *Cotyledon candelabrum*, *Echeveria candelabrum*

oblasti: JZ USA

Patří mezi endemity kalifornských ostrovů. Vytváří přízemní růžici listů. Listy jsou světlezelení, na konci zašpičatělé a narůžovělé. Květenství je na konci rozvětvené, porostlé 25 žlutými květy s růžovými tečkami.

Dudleya candida

synonyma: *Cotyledon bryceae*, *Cotyledon candida*, *D. bryceae*, *Echeveria bryceae*, *Echeveria candida*

Dudleya collomiae

synonyma: *Echeveria collomae*

oblasti: Arizona

Dudleya cultrata

synonyma: *Echeveria cultrata*

Dudleya cymbiformis

Dudleya cymosa

synonyma: *Cotyledon angustiflora*, *Cotyledon californica*, *Cotyledon cymosa*, *Cotyledon gigantea*, *Cotyledon laxa*, *Cotyledon laxa* var. *cymosa*, *Cotyledon laxa* var. *nevadensis*, *Cotyledon nevadensis*, *Cotyledon plattiana*, *Cotyledon purpusii*, *Cotyledon sheldonii*, *D. angustiflora*, *D. cymosa* subsp. *gigantea*, *D. gigantea*, *D. laxa*, *D. nevadensis*, *D. plattiana*, *D. purpusii*, *D. sheldonii*, *Echeveria amadorana*, *Echeveria angustiflora*, *Echeveria cymosa*, *Echeveria laxa*, *Echeveria laxa* var. *cymosa*, *Echeveria laxa* var. *nevadensis*, *Echeveria laxa* var. *paniculata*, *Echeveria nevadensis*, *Echeveria plattiana*, *Echeveria purpusii*, *Echeveria sheldonii*

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste ve skalnatých oblastech Kalifornie a jižního Oregonu. Kvete na červenooranžovém stonku ze zelenošedé přízemní růžice. Květy jsou růžovočervené. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *costifolia*
- subsp. *crebrifolia*
- subsp. *marcescens*
- subsp. *ovatifolia*

Dudleya densiflora

synonyma: *Cotyledon densiflora*, *Cotyledon nudicaulis*, *D. nudicaulis*, *Echeveria nudicaulis*, *Stylophyllum densiflorum*, *Stylophyllum nudicaule*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity San Gabriel Mountains v Kalifornii. Listy jsou dlouhé, hadovité. Dorůstají délky až 15cm a jsou válcovité. Květenství tvoří 2 - 8 květů světlé barvy obvykle v odstínech bílé a růžové.

Dudleya edulis

synonyma: *Echeveria edulis*, *Sedum edule*, *Stylophyllum edule*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v jižní Kalifornii a Kalifornském zálivu na skalnatém podloží. Listy jsou hadovité, válcovité, dlouhé až 20cm a vytvářejí přízemní růžici. Květenství tvoří 10 - 11 květů bílé barvy s 5ti okvětními lístky.

Dudleya farinosa

synonyma: *Cotyledon compacta*, *Cotyledon eastwoodiae*, *Cotyledon farinosa*, *Cotyledon lingula*, *Cotyledon septentrionalis*, *D. compacta*, *D. eastwoodiae*, *D. lingula*, *Echeveria compacta*, *Echeveria eastwoodiae*, *Echeveria farinosa*, *Echeveria lingula*, *Echeveria septentrionalis*

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste na pobřežních svazích Oregonu a severní Kalifornie.

Dudleya formosa

Dudleya gatesii

Dudleya gnoma

oblasti: JZ USA

Patří mezi endemity ostrova Santa Rosa v ostrovech Kalifornského zálivu. Listová růžice má v průměru do 5cm a tvoří je až 20 malých listů. Listy mají trojúhelníkový tvar, barvu šedozelenou, voskovitý povrch, délku 2cm a šířku 1cm. Květenství je vysoké asi 13cm a nese až 10 květů žluté barvy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'White Sprite'

Dudleya greenei

synonyma: *Cotyledon greenei*, *D. echeverioides*, *D. hoffmannii*, *D. regalis*, *Echeveria greenei*

oblasti: JZ USA

Patří mezi endemity ostrovů Kalifornského zálivu. Vytváří listovou růžici o šířce několika cm zakončenou listy délky až 11cm. Květenství je vysoké až 40cm a nese květy žluté barvy.

Dudleya guadalupensis

oblasti: Karibik

Dudleya ingens

synonyma: *D. eximia*, *D. viridicata*, *Echeveria ingens*

oblasti: JZ USA, S Mexiko

Roste na jihu USA a v severním Mexiku.

Dudleya lanceolata

synonyma: *Cotyledon bernardina*, *Cotyledon brauntonii*, *Cotyledon congesta*, *Cotyledon hallii*, *Cotyledon lanceolata*, *Cotyledon lurida*, *Cotyledon minor*, *Cotyledon robusta*, *D. bernardina*, *D. brauntonii*, *D. congesta*, *D. cymosa* subsp. *minor*, *D. elongata*, *D. goldmanii*, *D. hallii*, *D. lurida*, *D. minor*, *D. nevadensis* subsp. *minor*, *D. parishii*, *Echeveria bernardina*, *Echeveria brauntonii*, *Echeveria congesta*, *Echeveria elongata*, *Echeveria hallii*, *Echeveria lanceolata*, *Echeveria lanceolata* var. *composta*, *Echeveria lanceolata* var. *incerta*, *Echeveria lanceolata* var. *lurida*, *Echeveria lanceolata* var. *robusta*, *Echeveria laxa* var. *minor*, *Echeveria minor*, *Echeveria monicae*, *Echeveria parishii*, *Echeveria reflexa*, *Echeveria robusta*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v jižní Kalifornii a v Kalifornském zálivu na skalnatém podloží. Listy jsou variabilní v tvaru. Dohromady vytvářejí listovou růžici. Mají široce kopinatý tvar se špičkou a jsou ztlustlé. Květenství je na konci větvené a nese až 20 květů v barvě žluté, růžové nebo červené s nazelenalou bází.

Dudleya linearis

synonyma: *Cotyledon linearis*, *Echeveria linearis*

Dudleya multicaulis

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Listy jsou válcovité. Květenství je přímé, větvené a každá větev nese po 15ti žlutých květech.

Dudleya nesiotica

oblasti: JZ USA

Patří mezi endemity ostrova Santa Cruz v Kalifornském zálivu. Listy jsou zašpičatělé nebo okrouhlé během zimy, na léto odumírají a zůstává pouze caudex. Kvete drobnými bílými kvítky ve tvaru hvězdy.

Dudleya nubigena

synonyma: *Cotyledon nubigena*, *D. nubigena* subsp. *cerralvensis*, *D. xanti*, *Echeveria nubigena*, *Echeveria rigida*, *Echeveria xantii*

Dudleya orcuttii

Dudleya pachyphytum

oblasti: Kalifornský záliv

Roste v Kalifornském zálivu, Mexiko.

Dudleya palmeri

synonyma: *Cotyledon palmeri*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie kde roste při pobřeží San Luis Obispo a Santa Barbara Counties. Přízemní růžice má průměr do 20cm. Tvoří ji až 25 kopinatých listů v odstínech šedé až zelené, občas i s růžovým nádechem. Kvete na růžovém stonku, květenství tvoří až 40 květů v barvě žluté až červené nebo růžové. Okvětní lístky jsou dlouhé 1 - 2cm.

Dudleya pauciflora

synonyma: *Echeveria pauciflora*

Dudleya pulverulenta

synonyma: *Cotyledon pulverulenta*, *Echeveria argentea*, *Echeveria pulverulenta*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, S Mexiko, Utah

Roste v USA a Mexiku. Listy vytvářejí přízemní růžici o průměru 60cm, jsou kopinaté, špičaté, šedostříbřité a časem se objevuje růžová textura. Květenstvím je lata na až 75cm stonku, vlastní květy jsou červené nebo žluté a hvězdčovitě. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *arizonica*/subsp. *arizonica*

Vyhovuje ji plné slunce až polostín.

Dudleya rigidiflora

synonyma: *Echeveria rigidiflora*

Dudleya rubens

synonyma: *Cotyledon rubens*, *Echeveria rubens*

Dudleya saxosa

synonyma: *Cotyledon lanceolata* var. *saxosa*, *Cotyledon saxosa*, *Echeveria lanceolata* var. *saxosa*, *Echeveria saxosa*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste na skaliskách Peninsular Ranges a Sky Islands v Mohavské poušti v jižní Kalifornii, Arizoně a Kalifornském zálivu. Listy vytvářejí přízemní růžici, mohou být ploché nebo válcovité. Květní stonek je vzpřímený, růžový až červený, občas i se zelenou. Květy mají barvu žlutou.

Dudleya setchellii

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Santa Clara Valley. Vytváří přízemní listovou růžici. Kvete světležlutými květy.

Dudleya stolonifera

oblasti: Kalifornie

Roste na pobřeží Orange County, Kalifornie. Vytváří nevětvený kaudex. Listy vytvářejí malé růžice a mají zelenočervenou barvu.

Dudleya traskae

synonyma: *Cotyledon traskiae*, *Echeveria traskae*, *Stylophyllum traskiae*

oblasti: JZ USA

Patří mezi endemity ostrova Santa Barbara v Kalifornském zálivu. Kaudex je větvený. Vytváří přízemní růžici z 25 - 35 plochých sukulentních kopinatých lístků o délce 4 - 15cm, šířce 1 - 4cm v barvě žlutozelené. Povrch je voskovitý. Kvete žlutými květy s 5ti okvětními lístky v kulovitém květenství.

Dudleya variegata

synonyma: *Sedum variegatum*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornském zálivu a San Diego County v Kalifornii. Vytváří listovou růžici kolem stonku. Listy jsou lžičkovité až obvejčité či zakulacené. Květenství je přímé, větvené na až 20cm větve nesoucí žluté květy hvězdovitého tvaru.

Dudleya verityi

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Ventura County, Kalifornie. Kaudex je větvený a dorůstá délky několika cm. Listy vytvářejí růžici. Mají kopinatý tvar, voskový povrch, barvu šedou s růžovými okraji a délku do 5cm. Květní stonek má délku až 15cm a pak vytváří několik větví. Květy mají barvu žlutou a skládá se z 5ti okvětních lístků délky kolem 1cm.

Dudleya virens

synonyma: *Cotyledon albida*, *Cotyledon hassei*, *Cotyledon insularis*, *Cotyledon virens*, *Echeveria virens*, *Stylophyllum albidum*, *Stylophyllum hassei*, *Stylophyllum insulare*, *Stylophyllum virens*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv, Karibik

Pochází z Kalifornského zálivu (a jeho ostrovů), Kalifornie a Guadalupských ostrovů. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou dužnaté, podlouhlé, špičaté, modrozelené, ožíněné, špičky načervenalé, dlouhé 8 - 20 (i 25)cm a široké 1,5 - 3cm. Květenstvím je lata na až 60cm stonku, vlastní květy jsou 5tičetné, bílé a korunní lístky dlouhé 0,7 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *hassei*
- subsp. *insularis*

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín a dobře propustná půda.

Dudleya viscida

synonyma: *Cotyledon viscida*, *Echeveria viscida*, *Stylophyllum viscidum*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity jižní Kalifornie. Listy vytvářejí přízemní růžici. Mají žlutozelenou barvu. Květenství je bohatě větvené. Každá z větví nese až 10 květů červené barvy.

Dudleya x semiteres

<https://www.rostliny.net/>