

Symphyotrichum (Hvězdnice)

synonyma: Brachyactis, Virgulaster, Virgulus

čeleď: Asteraceae

Existuje asi 90 druhů. Může se jednat o jednoletky nebo i trvalky. Většina z nich pochází ze Severní Ameriky, několik ze střední a Jižní Ameriky a Euroasie. Neznámějším druhem je asi *S. novae-angliae* a *S. novi-belgii*. Hodně se podobají astrám. Kvete v úboru. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji dobře propustné půdy a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Symphyotrichum adnatum

synonyma: *Aster adnatus*, *Lasallea adnata*, *Virgulus adnatus*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi

Symphyotrichum anomalum

synonyma: *Aster anomalus*, *Aster anomalus* f. *albidus*

oblasti: Arkansas, Illinois, Kansas, Missouri, Oklahoma

Symphyotrichum anticostense

synonyma: *Aster anticostensis*, *Aster gaspensis*, *Aster hesperius* f. *albiflorus*, *Aster hesperius* var. *gaspensis*

oblasti: Maine, Nový Brunšvik, Quebec

Symphyotrichum ascendens

synonyma: *Aster armeriifolius*, *Aster ascendens* var. *armeriifolius*, *Aster chilensis* subsp. *adscendens*, *Aster denudatus*, *Aster denudatus* var. *ciliatifolius*, *Aster lonchophyllus*, *Aster macounii*, *Aster nuttallii*, *Aster ramulosus*, *Aster subgriseus*

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Saskatchewan, Utah, Washington, Wyoming

Roste od Britské Kolumbie po Saskatchewan a na jih po Nové Mexiko. Patří mezi trvalky. Stonek je větvený. Dorůstá výšky 20 - 60cm. Listy jsou kopinaté, dorůstají délku do 15cm. Kvete v úboru bílými květy se žlutým středem. Plodem je nažka s chmýrem.

Symphyotrichum bahamense

oblasti: Florida, Georgia, Karibik, Louisiana

Symphyotrichum boreale

synonyma: Aster borealis, Aster franklinianus, Aster junciformis, Aster laxifolius var. borealis

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Symphyotrichum bracei

oblasti: Florida

Symphyotrichum bullatum

synonyma: Aster bullatus, Aster jalapensis

Symphyotrichum burgessii

synonyma: Aster burgessii

Symphyotrichum campestre

synonyma: Aster bloomeri, Aster campestris, Aster campestris subsp. suksdorfii, Aster campestris var. bloomeri, S. campestre var. bloomeri, S. campestre var. campestre, Virgulus campestris

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 50cm. Pod zemí vytváří dlouhý oddenek. Listy mají čárkovitý až oválný tvar několikacentimetrové délky a často jsou ochlupené. Kvete růžovofialovými květy se žlutým středem v úboru. Plodem je nažka s chmýřem.

Symphyotrichum carnerosanum

synonyma: Aster carnerosanus

Symphyotrichum chapmanii

synonyma: Aster chapmanii, Eurybia chapmanii

oblasti: Alabama, Florida

Symphyotrichum chilense

synonyma: Aster chamissonis, Aster chilensis, Aster chilensis var. invenustus, Aster invenustus, Aster neesii, S. chilense var. chilense

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste od Britské Kolumbie po severní Kalifornii a Channel Islands. Navzdory jménu, v Čile se nevyskytuje. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,4 - 1m. Listy jsou ochlupené, úzce oválné, občas zubaté na okraji. Kvete růžovými květy se žlutým středem. Plodem je ochlupená nažka.

Symphyotrichum ciliatum

synonyma: *Aster angustatus*, *Aster brachyactis*, *Aster ciliatus* subsp. *angustus*, *Bindera ciliata*, *Brachyactis angustus*, *Brachyactis ciliata*, *Brachyactis ciliata* subsp. *angusta*, *Chrysocoma humilis*, *Erigeron ciliatus*, *Tripolium angustum*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Symphyotrichum ciliolatum

synonyma: *Aster ciliolatus*, *Aster ciliolatus* f. *comatus*, *Aster ciliolatus* var. *borealis*, *Aster ciliolatus* var. *comatus*, *Aster ciliolatus* var. *wilsonii*, *Aster foliaceus* var. *subgeminatus*, *Aster lindleyanus*, *Aster lindleyanus* var. *borealis*, *Aster lindleyanus* var. *ciliolatus*, *Aster lindleyanus* var. *comatus*, *Aster lindleyanus* var. *eximius*, *Aster paniculatus*, *Aster sanguineus*, *Aster saundersii*, *Aster serratifolius*, *Aster wilsonii*, *S. ciliolatum* var. *comatum*, *S. ciliolatum* var. *wilsonii*

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Illinois, Indiana, Jižní Dakota, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Symphyotrichum concolor

synonyma: *Aster concolor*, *Aster concolor* f. *lasiocaulis*, *Lasallea concolor*, *Virgulus concolor*

oblasti: Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, New York, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Symphyotrichum cordifolium

synonyma: *Aster cordifolius*, *Aster cordifolius* subsp. *laevigatus*, *Aster cordifolius* subsp. *sagittifolius*, *Aster cordifolius* var. *alvearius*, *Aster cordifolius* var. *furberiae*, *Aster cordifolius* var. *glabratus*, *Aster cordifolius* var. *incisus*, *Aster cordifolius* var. *laevigatus*, *Aster cordifolius* var. *lanceolatus*, *Aster cordifolius* var. *moratus*, *Aster cordifolius* var. *pedicellatus*, *Aster cordifolius* var. *polycephalus*, *Aster cordifolius* var. *racemiflorus*, *Aster cordifolius* var. *sagittifolius*, *Aster finkii* var. *moratus*, *Aster heterophyllus*, *Aster leiophyllus*, *Aster leiophyllus* var. *incisus*, *Aster leiophyllus* var. *lanceolatus*, *Aster lowrieanus*, *Aster lowrieanus* var. *incisus*, *Aster lowrieanus* var. *lanceolatus*, *Aster pallidulus*, *Aster plumarius*, *Aster pubescens*, *Aster sagittifolius*, *Leiachenis cordifolia*, *Solidago cordifolia*, *S. cordifolium* var. *furberiae*, *S. cordifolium* var. *lanceolatum*, *S. cordifolium* var. *moratum*, *S. cordifolium* var. *polycephalum*, *S. cordifolium* var. *racemiflorum*, *S. lowrieanum*, *S. sagittifolium*

oblasti: Alabama, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland,

Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky. Kvete modrými (zřídka bílými) květy se žlutým středem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Chieftain'
- 'Little Carlow'
- 'Sweet Lavender'

Symphyotrichum cusickii

synonyma: Aster cusickii, Aster foliaceus var. cusickii

oblasti: Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming

Symphyotrichum defoliatum

synonyma: Aster bernardinus, Aster chilensis var. bernardinus, Aster defoliatum, Aster deserticola, Aster durandii, Aster menziesii, Aster menziesii var. bernardinus

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity jižní Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až téměř 1m. Povrch je ochlupený. Listy jsou kopinaté, nejdelší při zemi dorůstají délky až 12cm. Kvete v úboru bílými nebo narůžovělými květy se žlutým středem. Plodem je ochlupená nažka.

Symphyotrichum depauperatum

synonyma: Aster depauperatus, Aster ericoides var. pusillus, Aster parviceps var. pusillus, Aster pilosus var. pusillus

oblasti: Maryland, Pennsylvania, Západní Virginie

Kvete bílými květy se žlutým středem v úboru.

Symphyotrichum divaricatum

synonyma: Aster divaricatus var. alatus, Aster divaricatus var. curtifolius, Aster divaricatus var. cymulosus, Aster divaricatus var. deltoideus, Aster divaricatus var. fontinalis, Aster divaricatus var. persaliens, Aster divaricatus var. tenebrosus, Aster exilis f. subalpina, Aster exilis var. graminifolius, Tripolium divaricatum

oblasti: Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginie

Symphyotrichum drummondii

synonyma: *Aster drummondii*

oblasti: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum dumosum

synonyma: *Aster dumosus* f. *monocephalus*, *Aster dumosus* var. *foliosus*, *Aster dumosus* var. *subracemosus*, *Aster dumosus* var. *versus*, *Aster dumosus* var. *violaceus*, *Aster foliolosus*, *Aster foliosus*, *Aster sparsiflorus*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum eatonii

synonyma: *Aster bracteolatus*, *Aster cordalenus*, *Aster eatonii*, *Aster foliaceus* var. *eatonii*, *Aster mearnsii*, *S. bracteolatum*

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Saskatchewan, Utah, Washington, Wyoming

Roste od Britské Kolumbie po Saskatchewan, Sierra Nevadu, Skalisté hory a Nové Mexiko. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 1m. Listy jsou kopinaté, dlouhé až 15cm. Kvete bílými až světlefialovými květy se žlutým středem. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují jí vlhčí místa.

Symphyotrichum elliottii

synonyma: *Aster elliottii*, *Aster puniceus* subsp. *elliottii*, *Aster puniceus* var. *elliottii*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Virginie

Symphyotrichum ericoides (Hvězdnice vřesovcová)

synonyma: *Aster ericoides*, *Aster ericoides* f. *caeruleus*, *Aster ericoides* f. *exiguus*, *Aster ericoides* f. *gramsii*, *Aster ericoides* var. *multiflorus*, *Aster ericoides* var. *randi*, *Aster ericoides* var. *reevesii*, *Aster glabellus*, *Aster leptophyllus*, *Aster multiflorus* var. *caeruleus*, *Aster multiflorus* var. *incanopilosus*, *Aster pansus*, *Aster pilosus* var. *reevesii*, *Aster ramulosus* var. *incanopilosus*, *Aster reevesii*, *Aster reversii*, *Chrysopsis ericoides*, *Eucephalus ericoides*, *Galatella leptophylla*

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste na většině území Severní Ameriky včetně severního Mexika v trsech. Dorůstá výšky až 1m. Listy jsou jemné. Květenstvím je úbor o průměru 1cm a okvětní lístky jsou bílé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Star' - okvětní lístky modré
- 'Brimstone' - okvětní lístky běložluté
- 'Cinderella' - okvětní lístky světlefialové
- 'Esther' - okvětní lístky růžové
- 'Finale' - výška až 2m; okvětní lístky tmavěružové
- 'Golden Sprite' - okvětní lístky nažloutlé
- 'Herbstmyrte' - okvětní lístky fialové
- 'Lovely' - výška 80cm; okvětní lístky růžové
- 'Pink Cloud'
- 'Ringdove'
- 'Schneetanne' - okvětní lístky bílé
- 'Snow Flurry'
- 'White Heather' - kompaktní

Symphyotrichum eulae

synonyma: Aster eulae

oblasti: Texas

Symphyotrichum expansum

synonyma: Aster divaricatus var. sandwicensis, Aster madrensis, Aster pauciflorus var. gracilis, Erigeron expansus, Erigeron multiflorus, Tripolium subulatum var. cubensis, Tripolium subulatum var. parviflorum

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Portoriko, Texas, Utah

Symphyotrichum falcatum

synonyma: Aster falcatus, Aster ramulosus

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Manitoba, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Ontario, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Kvete bílými květy se žlutým středem v úboru.

Symphyotrichum fendleri

synonyma: Aster fendleri, Aster nuttallii var. fendleri, Virgulus fendleri

oblasti: Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Roste v USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Listy jsou čárkovité, dlouhé 2 - 3cm. Kvete modrými nebo fialovými květy v úborech se žlutým středem seskupenými do krátkých horznů. V průměru mají kolem 2,5cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji dobře propustné půdy a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Symphyotrichum firmum

synonyma: Aster firmus, Aster lucidulus, Aster puniceus f. lucidulus, Aster puniceus subsp. firmus, Aster puniceus var. albiflorus, Aster puniceus var. firmus, Aster puniceus var. lucidulus

Symphyotrichum foliaceum

synonyma: Aster botryanthus, Aster canbyi, Aster foliaceus

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Symphyotrichum fontinale

synonyma: Aster fontinalis, Aster patens var. floridanus

oblasti: Florida

Symphyotrichum frondosum

synonyma: Aster frondosus, Brachyactis ciliata var. carnosula, Brachyactis frondosa, Tripolium frondosum

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Sierra Nevada (USA), Utah, Washington, Wyoming

Roste od Britské Kolumbie po Nové Mexiko včetně Skalistých hor a Sierry Nevady. Patří mezi trvalky. Povrch je většinou ochlupený. Dorůstá výšky 20 - 60cm. Listy jsou několik cm dlouhé, mají oválný tvar s kulatým koncem. Kvete v úboru menšími růžovými květy se žlutým středem. Plodem je nažka s chmýřem.

Vyhovují ji zásadité nebo zasolené půdy.

Symphyotrichum georgianum

synonyma: Aster georgianus, Aster patens var. georgianus, Virgulus georgianus, Virgulus patens var. georgianus

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Severní Karolína

Roste na jihovýchodě USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou tuhé, tmavězelené, obvejčité až kopinaté se zubatými okraji, dlouhé do 7cm a široké 2cm. Kvete v úborech fialovými květy se žlutým středem a průměrem 5 - 6cm.

Symphyotrichum glabrifolium

Roste v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 12cm. Listy jsou v přízemí čárkovitě kopinaté až kopist'ovité s drsnými okraji. Lodyžní jsou kopinaté se špičkou a napůl objímavé. Kvete bílými nebo modrými květy se žlutým středem v úboru o průměru 1 - 1,5cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji mírně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Symphyotrichum graminifolium

synonyma: Aster cabreræ, Aster divaricatus var. graminifolius, Aster squamatus var. graminifolius, Conyza graminifolia, Conyzanthus graminifolius

Symphyotrichum grandiflorum

synonyma: Aster grandiflorus, Lasallea grandiflora, Virgulus grandiflorus

oblasti: Jižní Karolína, Severní Karolína, Virginie

Symphyotrichum greatae

synonyma: Aster greatae

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity San Gabriel Mountains v jižní Kalifornii. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří dlouhý oddenek. Stonek dorůstá výšky 0,5 - 1,2 (i 2)m. Listy mívají oválný tvar, nejdelší přízemní dorůstají délky až 15cm. Kvete světlefialovými až téměř bílými květy se žlutým středem. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovuje ji vlhčí půda.

Symphyotrichum gypsophilum

synonyma: Aster gypsophila

Symphyotrichum hallii

synonyma: Aster chilensis subsp. hallii, Aster hallii

oblasti: Oregon, Washington

Symphyotrichum hendersonii

synonyma: Aster cusickii var. lyallii, Aster foliaceus var. lyallii, Aster hendersonii, Aster kootenayi

oblasti: Idaho, Kalifornie, Montana, Oregon, Washington

Symphyotrichum hesperium

synonyma: Aster hesperius

Symphyotrichum hintonii

synonyma: Aster hintonii

Symphyotrichum jessicae

synonyma: Aster jessicae

oblasti: Idaho, Washington

Symphyotrichum kralii

oblasti: Alabama, Florida

Symphyotrichum laeve

synonyma: Aster attenuatus, Aster autranii, Aster bupleurifolius, Aster cyaneus, Aster decorus, Aster expansus, Aster glaucescens, Aster glaucus, Aster laevigatus, Aster laevis, Aster laevis var. abbreviatus, Aster laevis var. cyaneus, Aster laevis var. laevigatus, Aster laevis var. latifolius, Aster laevis var. panduratus, Aster laevis var. simplex, Aster laevis var. sourisensis, Aster laevis var. strictiflora, Aster laevis var. thyrsoides, Aster laevis var. undulatifolius, Aster lucidus, Aster pensilvanicus, Aster politus, Aster rubricaulis

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Symphyotrichum lanceolatum

synonyma: Aster abbreviatus, Aster angustus, Aster bellidiflorus var. angustus, Aster bellidiflorus var. rigidulus, Aster bellidiflorus var. rubricaulis, Aster carneus, Aster cornuti, Aster lanceolatus, Aster lanceolatus var. monocephalus, Aster pallens, Aster paniculatus var. acutidens, Aster paniculatus var. bellidiflorus, Aster paniculatus var. cinerascens, Aster paniculatus var. lanatus, Aster rigidulus, Aster simplex, Aster strictus

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Kanadě a USA. Dorůstá výšky až 1,5m. Listy jsou kopinaté a střídavé. Kvete v úboru o

průměru 2,5cm.

Symphyotrichum lateriflorum

synonyma: *Aglotoma multiflora*, *Aster diffusus*, *Aster diffusus* var. *bifrons*, *Aster diffusus* var. *hirsuticaulis*, *Aster diffusus* var. *horizontalis*, *Aster diffusus* var. *variifolius*, *Aster divergens*, *Aster divergens* var. *diffusus*, *Aster divergens* var. *humilior*, *Aster divergens* var. *pendulus*, *Aster foliolosus*, *Aster glaber*, *Aster lateriflorus*, *Aster lateriflorus* var. *bifrons*, *Aster lateriflorus* var. *glomerullus*, *Aster miser*, *Aster miser* var. *abbreviatus*, *Aster miser* var. *divergens*, *Aster miser* var. *glomerellus*, *Aster miser* var. *miserrimus*, *Aster miser* var. *myrtifolius*, *Aster miser* var. *vimineus*, *Aster multiflorus*, *Aster myrtifolius*, *Aster secundiflorus*, *Aster seliger*, *Aster vimineus* var. *columbianus*, *Aster vimineus* var. *dubius*, *Aster vimineus* var. *foliolosus*

oblasti: Alabama, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum laurentianum

synonyma: *Aster ciliatus* subsp. *laurentianus*, *Aster laurentianus*, *Aster laurentianus* var. *contiguus*, *Aster laurentianus* var. *laurentianus*, *Aster laurentianus* var. *magdalenensis*, *Brachyactis ciliata* subsp. *laurentiana*, *Brachyactis laurentiana*

oblasti: Nový Brunšvik, Quebec

Symphyotrichum lentum

synonyma: *Aster chilensis* var. *lentus*, *Aster chilensis* var. *sonomensis*, *Aster lentus*, *Aster sonomensis*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie a trvalky. Dorůstá výšky 0,4 - 1,5m. Pod zemí vytváří dlouhý oddenek. Listy jsou čárkovité až kopinaté, zašpičatělé, nejdelší při zemi dlouhé do 15cm. Kvete růžovofialovými květy se žlutým středem v úboru. Plodem je nažka s chmýrem.

Symphyotrichum leone

Symphyotrichum lowrieianum

oblasti: Alabama, Connecticut, Georgia, Kentucky, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Symphyotrichum lucayanum

synonyma: *Aster lucayanus*

Symphyotrichum martii

synonyma: Aster martii

Symphyotrichum molle

synonyma: Aster mollis

oblasti: Wyoming

Symphyotrichum moranense

synonyma: Aster lima, Aster moranensis, Aster moranensis var. turneri, S. moranense var. moranense, S. moranense var. turneri, Virgulus lima

Symphyotrichum nahanniense

synonyma: Aster nahanniensis

Roste v trsech. Dorůstá výšky 5 - 40cm. Lodyha je poléhavé. Přízemní listy jsou obkopinaté, lodyžní přisedlé, čárkovitěkopinaté se špičkou. Kvete bílými nebo narůžovělými květy se žlutým středem v úborech. Plodem je nažka s chmýřem.

Vyhovují ji štěrkovité úrodné propustné vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Symphyotrichum novae-angliae (Hvězdnice novoanglická)

synonyma: Aster altissimus, Aster concinnus, Aster novae-angliae, Aster novae-angliae f. geneseensis, Aster novae-angliae f. rosarius, Aster novae-angliae f. roseus, Aster novae-angliae f. spurius, Aster novae-angliae var. monocephalus, Aster spurius, Lasallea novae-angliae, Virgulus novae-angliae

oblasti: Alabama, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste ve velké části Severní Ameriky, rozšířil se i do Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,6 -) 0,7 - 1,2 (i 2)m. Stonek je ve spodní části drsně ochlupený, horní část je žláznatá. Listy mají kopinatý tvar a objímavou bázi. Kvete fialovými až růžovými (vzácně i bílými) květy se žlutým středem v úboru o průměru 2 - 4cm, zákrovní listeny úzce kopinaté stejné délky a žláznaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Andenken An Alma Pötschke'/'Alma Pötschke' - kompaktní habitus; výška 1,2m; květenství růžovofialové až růžovočervené
- 'Barr's Pink' - květenství růžovočervené
- 'Harrington's Pink' - květenství růžové, pozdní

- 'Hella Lacy'
- 'September Rubby' - květenství červené
- 'Violetta' - květenství bleděfialové

Dobře snáší sucho. Vyhovuje ji plné slunce a vlhká nevápenitá půda bohatá na živiny.

Symphyotrichum novi-belgii (Astríčka novobelgická)

synonyma: *Amellus divaricatus*, *Aster adulterinus*, *Aster argutus*, *Aster brumalis*, *Aster caespitosus*, *Aster floribundus*, *Aster laevigatus*, *Aster luxurians*, *Aster mutabilis*, *Aster novi-belgii* f. *roseus*, *Aster novi-belgii* subsp. *floribundus*, *Aster novi-belgii* subsp. *laevigatus*, *Aster novi-belgii* subsp. *stenolepis*, *Aster novi-belgii* var. *adulterinus*, *Aster novi-belgii* var. *ampliflorus*, *Aster novi-belgii* var. *atlanticus*, *Aster novi-belgii* var. *brittonii*, *Aster novi-belgii* var. *floribundus*, *Aster novi-belgii* var. *minor*, *Aster novi-belgii* var. *thyrsiflorus*, *Aster onustus*, *Aster onustus* var. *squarrosus*, *Aster serotinus*, *Aster thyrsiflorus*, *Aster thyrsiflorus* var. *squarrosus*, *Crinitaria humilis*

oblasti: Andalusie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Jižní Karolína, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Dorůstá výšky 0,4 - 1,2m. Listy jsou střídavé a kopinaté. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 5 - 7mm. Plodem je nažka délky 2,5mm s chmýrem délky 4 - 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Fellowship'

Symphyotrichum oblongifolium

synonyma: *Aster kumleinii*, *Aster multiceps*, *Aster oblongifolius*, *Aster oblongifolius* f. *albaligulatus*, *Aster oblongifolius* f. *roseoligulatus*, *Aster oblongifolius* f. *roseus*, *Aster oblongifolius* var. *angustatus*, *Aster oblongifolius* var. *orientis*, *Aster oblongifolius* var. *rigidulus*, *Lasallea oblongifolia*, *Virgulus oblongifolius*

oblasti: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Vyskytuje se ve středu a východě USA. Patří mezi trvalky. Kvete růžovofialovými květy.

Symphyotrichum ontarionis

synonyma: *Aster diffusus* var. *thyrsoideus*, *Aster lateriflorus* var. *thyrsoideus*, *Aster ontariensis*, *Aster ontarionis*, *Aster pantotrichus*, *Aster pantotrichus* var. *thyrsoideus*, *Aster tradescantii* var. *thyrsoideus*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Quebec, Tennessee, Texas, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum oolentangiense

synonyma: *Aster azureus*, *Aster azureus* var. *incarnatus*, *Aster azureus* var. *laevicaulis*, *Aster*

azureus var. poaceus, Aster azureus var. scabrior, Aster capillaceus, Aster oolentangiensis, Aster oolentangiensis f. incarnatus, Aster oolentangiensis var. laevicaulis, Aster oolentangiensis var. poaceus, Aster poaceus, Aster vernalis, S. oolentangiense var. oolentangiense, S. oolentangiense var. poaceum

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Wisconsin

Symphyotrichum parviceps

synonyma: Aster depauperatus var. parviceps, Aster ericoides var. parviceps, Aster parviceps, Aster pilosus subsp. parviceps

oblasti: Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína

Symphyotrichum parviflorum

synonyma: Aster leucanthemus, Aster parviflorus

Symphyotrichum patagonicum

synonyma: Aster patagonicus

oblasti: Patagonie

Symphyotrichum patens

synonyma: Aster auritus

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Symphyotrichum patulum

synonyma: Aster patulus

Symphyotrichum peteroanum

synonyma: Aster riparius

Symphyotrichum phlogifolium

synonyma: Aster patens var. phlogifolius, Aster phlogifolius, Virgulus patens var. phlogifolius

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Symphyotrichum pilosum

synonyma: *Aster chrysogonii*, *Aster ericoides* f. *villosus*, *Aster ericoides* var. *pilosus*, *Aster ericoides* var. *platyphyllus*, *Aster ericoides* var. *villosus*, *Aster pilosus*, *Aster pilosus* f. *pulchellus*

oblasti: Alabama, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum plumosum

synonyma: *Aster plumosus*, *S. concolor* var. *plumosum*

Symphyotrichum porteri

synonyma: *Aster ericoides* var. *strictus*, *Aster porteri*

oblasti: Kolorado, Nové Mexiko, Wyoming

Listy jsou čárkovité až obkopinaté se špičkou, dlouhé 5 - 10cm. Kvete v úborech seskupených do laty nebo chocholíku. Plodem je nažka s chmýrem.

Symphyotrichum potosinum

synonyma: *Aster coerulescens* var. *angustior*, *Aster coerulescens* var. *laetevirens*, *Aster coerulescens* var. *subasper*, *Aster lemmonii*, *Aster potosinus*, *Aster salicifolius* f. *coerulescens*, *Aster salicifolius* var. *stenophyllus*, *Aster schaffneri*, *S. praealtum*, *S. schaffneri*

oblasti: Arizona

Symphyotrichum praealtum

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum pratense

synonyma: *Aster phyllolepis*, *Aster pratensis*, *Aster sericeus* var. *microphyllus*, *Lasallea sericea* subsp. *pratensis*, *S. sericeum* var. *microphyllum*, *Virgulus pratensis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Symphyotrichum prenanthoides

synonyma: *Aster prenanthoides*

oblasti: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts,

Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě USA a Kanady. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky i více než 1m. Stonek se s věkem barví do růžova a tuhne. Listy mají různorodý tvar i velikost. Kvete modrými (vzácně bílými) květy se žlutým středem v úboru s okvětními lístky délky do 1,5cm.

Symphyotrichum priceae

synonyma: *Aster kentuckiensis*, *Aster pilosus* var. *priceae*, *Aster priceae*

oblasti: Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee

Symphyotrichum puniceum

synonyma: *Aster amoenus*, *Aster blandus*, *Aster carneus*, *Aster carneus* var. *ambiguus*, *Aster confertus*, *Aster hispidus*, *Aster obliquus*, *Aster puniceus* f. *candidus*, *Aster puniceus* f. *colbyi*, *Aster puniceus* f. *demissus*, *Aster puniceus* f. *etiamalbus*, *Aster puniceus* f. *rufescens*, *Aster puniceus* var. *colbyi*, *Aster puniceus* var. *crawfordii*, *Aster puniceus* var. *laevicaulis*, *Aster puniceus* var. *lucidus*, *Aster puniceus* var. *monocephalus*, *Aster puniceus* var. *purpureus*, *Aster puniceus* var. *rufescens*, *Aster puniceus* var. *vimineus*, *Aster rigidulus*, *Aster salicifolius* f. *obliquus*, *Aster virgatus*

oblasti: Alabama, Alberta, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kentucky, Labrador, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi trvalky. Kvete namodralými nebo nafialovělými květy se žlutým středem v úboru.

Symphyotrichum pygmaeum

synonyma: *Aster pygmaeus*, *Aster sibiricus* subsp. *pygmaeus*, *Aster sibiricus* var. *pygmaeus*, *Eurybia pygmaea*

oblasti: Aljaška, Nunavut, Severozápadní Teritorium

Přízemní listy jsou kopist'ovité, zakulacené. Lodyžní jsou přisedlé, kopinaté až podlouhlé s mírně zvlněným okrajem. Kvete tmavě růžovofialovými květy se žlutým středem v úborech.

Symphyotrichum racemosum

synonyma: *Aster brachypholis*, *Aster fragilis*, *Aster fragilis* var. *brachypholis*, *Aster fragilis* var. *subdumosus*, *Aster fragilis* var. *subinteger*, *Aster racemosus*, *Aster tradescantii* var. *fragilis*, *Aster vimineus* var. *subdumosus*, *S. racemosum* var. *subdumosum*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum regnellii

synonyma: Aster regnellii, Aster regnellii subsp. mattogrosensis

Symphyotrichum retroflexum

synonyma: Aster curtisii, Aster retroflexus

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Tennessee

Symphyotrichum robynsianum

synonyma: Aster robynsianus

oblasti: Manitoba, Michigan, Minnesota, Ontario, Quebec, Wisconsin

Symphyotrichum sericeum

synonyma: Aster argenteus, Aster sericeus, Aster sericeus var. montanus, Lasallea sericea, Virgulus sericeus

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Manitoba, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Severní Dakota, Texas, Wisconsin

Roste v centrální části Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří oddenek. Stonek je vzpřímený, občas větvený. Listy jsou stříbrozelené. Kvete modrými až světlefialovými květy se žlutým středem v úboru. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují mu štěrkovité a písčité půdy a dobře snáší sucho.

Symphyotrichum shortii

synonyma: Aster camptosorus, Aster shortii, Aster shortii f. candidus, Aster shortii f. gronemannii, Aster shortii var. monroei

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum simmondsii

synonyma: Aster simmondsii, Aster sulznerae

oblasti: Florida, Jižní Karolína, Severní Karolína

Symphyotrichum spathulatum

synonyma: Aster aestivus, Aster ascendens var. delectabilis, Aster occidentalis var. scabriusculus, Aster spathulatus

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Severozápadní Teritorium, Utah, Washington, Wyoming

Symphyotrichum squamatum

synonyma: Aster bangii, Aster barcinonensis, Aster moelleri, Aster squamatus, Aster subtropicus, Baccharis asteroides, Conyza berteriana, Conyzanthus squamatus, Erigeron depilis, Erigeron semiamplexicaule, Tripolium conspicuum, Tripolium moelleri, Tripolium oliganthum, Tripolium subulatum var. brasilianum

oblasti: Andalusie, Florida, Havajské ostrovy, Írán, Katalánsko, Louisiana, Severní Karolína, Střední střeozemí, Texas

Může se jednat o jednoletku nebo trvalku. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Listy jsou střídavé a úzce kopinaté. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 5 - 6,5mm. Plodem je nažka délky 2 - 3mm s chmýrem délky 3,5 - 4,5mm.

Symphyotrichum subgeminatum

synonyma: Aster subgeminatus

Symphyotrichum subspicatum

synonyma: Aster butleri, Aster ciliolatus var. maccallae, Aster douglasii, Aster grayi, Aster maccallae, Aster oregonum, Aster simplex, Aster subspicatus, Aster subspicatus var. grayi, S. ciliolatum var. maccallae, S. subspicatum var. grayi, S. subspicatum var. subspicatum

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Oregon, Washington

Symphyotrichum subulatus

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Symphyotrichum tenuifolium

synonyma: Aster bracei, Aster flexuosus, Aster polyphyllus, Aster recurvatus, Aster sparsiflorus, Aster tenuifolius, Aster tenuifolius var. aphyllus, Aster virgatus, Fimbristima flexuosa, Fimbristima sparsiflora, S. bracei, S. tenuifolium var. aphyllum

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie

Symphyotrichum tradescantii

synonyma: Aster artemisiaeflorus, Aster bellidiflorus, Aster miser, Aster recurvatus, Aster scoparius, Aster tradescantii, Aster tradescantii var. saxatilis, Aster vimineus var. saxatilis

oblasti: Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Polsko, Quebec, Rhode Island, Vermont

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky 40 - 60cm. Listy jsou úzce kopinaté až čárkovité. Květenstvím je úbor o průměru 5 - 7mm s 30 - 35ti zákrovními listeny.

Symphyotrichum trilineatum

synonyma: Aster bimater, Aster trilineatus, Virgulus bimater

Symphyotrichum turbinellum

synonyma: Aster turbinellus

oblasti: Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Nebraska, Oklahoma

Symphyotrichum undulatum

synonyma: Amphirhapis peduncularis, Aster asperifolius, Aster asperulus, Aster autumnalis, Aster baldwinii, Aster claviger, Aster corrigiatus, Aster diversifolius, Aster gracilescens, Aster heteromallus, Aster linguiformis, Aster loriformis, Aster mohrii, Aster proteus, Aster sagittifolius, Aster scaber, Aster sylvestris, Aster triangularis, Aster truellius, Aster undulatus, Aster undulatus var. abruptifolius, Aster undulatus var. asperulus, Aster undulatus var. diversifolius, Aster undulatus var. loriformis, Aster undulatus var. sylvestris, Aster undulatus var. torquatus, Aster undulatus var. triangularis, Cineraria ovata, Diplopappus asperulus

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Symphyotrichum urophyllum

synonyma: Aster hirtellus, Aster sagittifolius var. dissitiflorus, Aster sagittifolius var. glomerellus, Aster sagittifolius var. urophyllum, Aster urophyllum, Aster urophyllum var. glomerellus

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum vahlii

Listy mají obvejčitý až úzce kopist'ovitý nebo čárkovitý tvar délky 3 - 6cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. vahlii

Symphyotrichum walteri

synonyma: Aster walteri, Lasallea walteri, Virgulus walteri

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Symphyotrichum welshii

synonyma: Aster welshii

oblasti: Utah

Symphyotrichum x amethystinum (Hvězdnice ametystová)

synonyma: *Aster bostoniensis*, *Lasallea x amethystina*, *Virgulus x amethystinus*

oblasti: Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Kolorado, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Dakota, Vermont, Washington, Wisconsin

Hybrid *Aster novae-angliae* a *A. ericoides*. Roste na východě USA jako trvalka. Povrch je drsně ochlupený. Květenstvím je úbor o průměru 1 - 1,5cm a okvětní lístky jsou bělavé, namodralé nebo narůžovělé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Freiburg' - výška 1,3 - 1,7m; květy modré
- 'Kylie' - rozkladitější habitus; výška do 1,2 (i 1,4)m

Vyhovuje ji plné slunci nebo polostín a dobře propustná lehká půda. Dobře snáší sucho.

Symphyotrichum x batesii

synonyma: *Aster batesii*, *Aster ericoides* var. *batesii*

oblasti: Nebraska

Symphyotrichum x columbianum

synonyma: *Aster columbianus*, *Aster multiflorus* var. *columbianus*

oblasti: Oregon, Washington

Symphyotrichum x finkii

oblasti: Iowa, Wisconsin, Západní Virginie

Symphyotrichum x gravesii

synonyma: *Aster gravesii*

oblasti: Connecticut

Symphyotrichum x longulum

synonyma: *Aster longulus*, *Aster x longulus*

oblasti: Minnesota, New Jersey, Wisconsin

Symphyotrichum x salignum

synonyma: *Aster auriculatus*, *Aster frutetorum*, *Aster hungaricus*, *Aster leiophyllus*, *Aster salicifolius*, *Aster salicinus*, *Aster salignus*

Dorůstá výšky 0,8 - 1,2m. Listy zpravidla úzce kopinaté, na bázi mohou být mírně ouškaté. Kvete v úboru, zákrovní listeny prakticky stejně dlouhé nebo vnější o 1/3 kratší, široké do 0,7mm.

Vyhovují ji pobřežní křoviny.

Symphyotrichum x schistosum

oblasti: Kentucky, Virginie

Symphyotrichum x tardiflorum

synonyma: Aster novi-belgii subsp. tardiflorus, Aster novi-belgii var. tardiflorus, Aster tardiflorus, Aster tardiflorus var. lancifolius, Aster tardiflorus var. vestitus, S. novi-belgii var. tardiflorum

oblasti: Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Quebec

Symphyotrichum x versicolor (Hvězdnice různobarvá)

synonyma: Aster confertus, Aster mutabilis, Aster novi-belgii var. laevigatus, Aster versicolor

oblasti: Česká republika

Dorůstá výšky 0,6 - 1,5m. Horní a střední lodyžní listy jsou vejčité až vejčitěkopinaté, 2 - 4 (i 5)x delší než široké, na větvích květenství menší. Kvete v úboru, zákrovní listeny se střechovitě překrývají, jsou široké 1mm, ploška v horní 1/2 vnějších listenů rozšířená, málo kosočtvercovité s bělavým okrajem, mají 30 - 50 okvětních lístků v barvě modrofialové.

Symphyotrichum x woldenii

synonyma: Aster woldenii

oblasti: Iowa

Symphyotrichum yukonense

synonyma: Aster yukonensis, Virgulus yukonensis

oblasti: Aljaška, Severozápadní Teritorium, Yukon

Roste v trsech. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Přízemní listy jsou křídlatě řapíkaté, čepel je úzce obkopinatá a má drsné okraje. Lodyžní listy jsou přisedlé, čárkovitěkopinaté. Kvete modrými nebo modrofialovými květy se žlutým středem v úborech. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji úrodné vlhké půdy se suchým zimním režimem a polostín.

Množí se dělením nebo řízkem.

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Symphyotrichum.htm>

<https://www.rostliny.net/>