

Tradescantia (Poděňka)

čeleď: Commelinaceae

Roste od jižní Kanady po Argentinu. Dorůstají výšky 30 - 60cm a délka listů se pohybuje v rozmezí 3 - 45cm, můžete se setkat ale i s 1m exempláři. Je velmi vhodná do závěsných květináčů nebo pro pokrytí půdy (kde to teplotní podmínky dovolují). V obchodech se spíše setkáte s hybridy než s čistými druhy. Nejznámějším druhem je *T. fluminensis*.

Důležité je pravidelné zaštipování pro dosažení bohatého větvení. Na dobře osvětleném místě získává rostlina výraznější kresbu listů, ale o to má rostlina zase větší spotřebu vody. Vyhovují jim lehké propustné půdy. Teplota by nikdy neměla klesnout pod 18°C. Vyhovuje jí teplota 18 - 25°C, v zimě o něco nižší, ideálně 7 - 10°C. Nesnáší průvan a rychlé změny teploty. Důležité je také rostlině dopřávat vysokou vlhkost, např. mlžením. Přesazujeme až v okamžiku, kdy kořeny vyplní květináč.

Velmi jednoduše se množí řízků z převislých stonků. Hnojí se jednou za 14 dní tekutým hnojivem.

Tradescantia ambigua

synonyma: *Skofitzia boliviana*, *T. ambigua* var. *glabriuscula*, *T. ambigua* var. *pilosula*

Tradescantia anagallidea

Tradescantia andrieuxii

synonyma: *Setcreasea australis*, *Setcreasea tumida*, *T. semisomna*, *T. virginiana* var. *tumida*

Tradescantia blossfeldiana

Má fialovozelené listy.

Tradescantia boliviana

synonyma: *Mandonia boliviana*

Tradescantia brachyphylla

Tradescantia bracteata

synonyma: *T. bracteata* f. *albiflora*, *T. bracteata* f. *rosea*

oblasti: Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Severní Dakota, Vermont, Wisconsin, Wyoming

Tradescantia brevifolia

synonyma: *Neotreleasea brevifolia*, *Setcreasea brevifolia*, *Setcreasea ovata*, *T. leiandra* var. *brevifolia*, *T. leiandra* var. *ovata*, *Treleasea brevifolia*, *Zebrina leiandra*

oblasti: Texas

Tradescantia buckleyi

synonyma: *Setcreasea brevifolia* var. *buckleyi*, *Setcreasea brevifolia* var. *nanella*, *Setcreasea brevifolia* var. *pulchella*, *Setcreasea buckleyi*

oblasti: Texas

Tradescantia burchii

Tradescantia cerinthoides

synonyma: *T. blossfeldiana*, *T. koernickeana*

Tradescantia cirrifera

synonyma: *T. tolimanensis*

Tradescantia commelinoides

synonyma: *Cymbispatha commelinoides*, *Cymbispatha commelinoides* var. *glabrata*, *T. commelinoides* var. *glabrata*, *T. coscomatepecana*, *T. macropoda*

Tradescantia crassifolia

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Tradescantia crassula

synonyma: *T. crassipes*, *T. crassula* var. *gaudichaudii*, *Tropitria crassula*

oblasti: Arkansas, Florida

Tradescantia cymbispatha

synonyma: *Cymbispatha geniculata*, *T. cymbispatha* var. *villosissima*

Tradescantia deficiens

Tradescantia edwardsiana

oblasti: Texas

Tradescantia ernestiana

synonyma: *T. ernestiana* f. *alba*

oblasti: Alabama, Arkansas, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas

Tradescantia exaltata

Tradescantia fluminensis (Poděňka světlá)

synonyma: *T. albiflora*, *T. decora*, *T. fluminensis* f. *tenella*, *T. fluminensis* var. *pubescens*, *T. fluminensis* var. *tenella*, *T. fluminescens*, *T. laekenensis*, *T. mundula*, *T. mundula* var. *scabrida*, *T. tenella*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Louisiana

Má bílé, žluté a stříbřitě zbarvené pruhované listy. Kvete drobnými bílými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureo-Vittata'/'Aureovitata' - listy s nažloutlými podélnými proužky
- 'Maiden's Blush'
- 'Rochford Silver' - listy s bílou kresbou
- 'Tricolor' - listy zelené, bílé a žluté
- 'Variegata' - bílé podélné pruhy na listech

Tradescantia fuscata (Poděňka nahnědlá)

Tradescantia gentryi

Tradescantia gigantea

oblasti: Louisiana, Texas

Tradescantia gracillima

synonyma: *Cymbispatha commelinoides* var. *rotundifolia*, *Cymbispatha venezuelensis*, *T. commelinoides* var. *rotundifolia*, *T. venezuelensis*

Tradescantia grantii

Tradescantia guatemalensis

synonyma: *T. anisophylla*, *T. guatemalensis* f. *alba*, *T. guatemalensis* var. *tacana*, *T. guatemalensis* var. *tacanana*, *T. tacanana*

Tradescantia guiengolensis

Tradescantia gypsophila

Tradescantia hirsuticaulis

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee

Tradescantia hirsutiflora

synonyma: *T. australis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas

Tradescantia hirta

synonyma: *Setcreasea hirsuta*

Tradescantia huehueteca

synonyma: *Zebrina huehueteca*

Tradescantia humilis

synonyma: *T. diffusa*, *T. eglandulosa*, *T. intermedia*

oblasti: Texas

Tradescantia iridescens

Tradescantia leiandra

synonyma: *Commelina leiandra*, *Neotrelasea leiandra*, *Setcreasea leiandra*, *Setcreasea leiandra* var. *glandulosa*, *T. biandra*, *T. leiandra* var. *glandulosa*, *Trelasea leiandra*

oblasti: Texas

Tradescantia llamasii

Tradescantia longipes

oblasti: Arkansas, Missouri

Tradescantia masonii

Tradescantia maysillesii

synonyma: *T. subramosa*, *T. subtilis*

Tradescantia mcvaughii

Tradescantia mirandae

Tradescantia mlutiflora

oblasti: Jižní Amerika

Pochází z Jižní Ameriky. Kvete bílými 3četnými květy, korunní lístky jsou široce vejčité a zašpičatělé.

Tradescantia monosperma

Tradescantia navicularis

Pochází ze severního Peru. Vytváří husté porosty dobře pokrývající povrch. Vrchní strana je zelená, spodní bíle tečkovaná s nafialovélou kresbou. Kvete růžovými květy.

Důležité je dopřát rostlině dostatek světla, jinak bude docházet k její tvarové deformaci. Vyžadují také přísun čerstvého vzduchu. Min. teplota je 5°C.

Tradescantia nuevoleonensis

synonyma: *T. potosina*

Tradescantia occidentalis

synonyma: *T. virginiana* var. *occidentalis*

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Illinois, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Louisiana, Manitoba, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Wisconsin, Wyoming

Tradescantia ohiensis

synonyma: *Tradescantella incarnata*, *T. canaliculata*, *T. canaliculata* f. *albiflora*, *T. canaliculata* f. *lesteri*, *T. canaliculata* f. *mariae*, *T. difformis*, *T. foliosa*, *T. incarnata*, *T. ohiensis* f. *pilosa*, *T. ohiensis* var. *paludosa*, *T. paludosa*, *T. reflexa*, *T. reflexa* f. *albiflora*, *T. reflexa* f. *lesteri*, *T. reflexa* f. *mariae*, *T. reflexa* var. *eloiseana*, *T. riparia*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Tradescantia orchidophylla

Tradescantia ozarkana

oblasti: Arkansas, Missouri, Oklahoma

Tradescantia pallida (Podeňka světlá)

synonyma: Setcreasea jaumavensis, Setcreasea lanceolata, Setcreasea pallida, Setcreasea purpurea, T. purpurea

oblasti: Florida, Louisiana, Mexiko, Portoriko

Roste na jihu Severní Ameriky a v Karibiku. Dorůstá výšky až 40cm. Listy jsou špičaté, růžově fialově červené a ochlupené. Kvete růžovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Purple Heart'
- 'Variegata'

Nesnází plné slunce.

Tradescantia paludosa

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Texas

Tradescantia pedicellata

oblasti: Texas

Tradescantia peninsularis

Tradescantia petiolaris

Tradescantia petricola

Tradescantia pinetorum

synonyma: Aneilema pinetorum

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Tradescantia plusiantha

synonyma: Cymbispatha plusiantha, T. tonalamonticola

Tradescantia poelliae

Tradescantia pygmaea

synonyma: Separothesa pumila, Treleasea pumila, Zebrina pumila

Tradescantia reverchonii

oblasti: Arkansas, Louisiana, Texas

Tradescantia roseolens

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Tradescantia rozynskii

Tradescantia schippii

synonyma: Campelia hirsuta

Tradescantia sillamontana

synonyma: T. pexata

Tradescantia soconuscana

synonyma: Campelia standleyi, Zebrina pendula var. villosa

Tradescantia spathacea (Voděnka toulcovitá)

synonyma: Ephemereum bicolor, Ephemereum discolor, Rhoeo discolor, Rhoeo spathacea, Rhoeo spathacea f. concolor, Rhoeo spathacea f. variegata, Rhoeo spathacea var. concolor, Rhoeo spathacea var. variegata, T. discolor, T. discolor var. concolor, T. discolor var. variegata, T. versicolor

oblasti: Belize, Florida, Guatemala, Havajské ostrovy, J Mexiko, Louisiana, Portoriko

Roste ve střední Americe. Dorůstá výšky 25 - 60cm. Stonek je krátký a dužnatý. Tvoří ji zprvu listová růžice (později vystoupavá) z mečovitých až kopinatých listů, jsou tmavě zelené, dlouhé 15 - 45cm, široké 2,5 - 8cm a spodní strana je tmavě fialová. Kvete bílými květy velikosti 1 - 1,5cm v paždí listů v člunkovitých listenech. Plodem je eliptická 2 - 3pouzdrá tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Vittata' - listy se žlutými proužky

Tradescantia standleyi

Tradescantia stenophylla

synonyma: Tripogandra stenophylla

Tradescantia subacaulis

synonyma: T. harbisonii, T. texana

oblasti: Texas

Tradescantia subaspera

synonyma: *T. axillaris* f. *subaspera*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, New York, Ohio, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Tradescantia tepoxtlana

Tradescantia tharpaii

oblasti: Kansas, Missouri, Oklahoma, Texas

Tradescantia umbraculifera

Tradescantia valida

Tradescantia velutina

Tradescantia virginiana (Poděnká virginská)

synonyma: *Ephemerum congestum*, *Knowlesia spicata*, *Leiandra divaricata*, *T. axillaris* var. *flexuosa*, *T. barbata*, *T. brevicaulis*, *T. caricifolia*, *T. congesta*, *T. crinigera*, *T. divaricata*, *T. elata*, *T. flexuosa*, *T. levigata*, *T. lyonii*, *T. pilosissima*, *T. pumila*, *T. rupestris*, *T. speciosa*, *T. spicata*, *T. splendens*, *T. villosissima*, *T. virginiana* var. *flexuosa*, *T. virginica*, *T. virginica* f. *albiflora*, *T. virginica* var. *drummondii*, *T. virginica* var. *flexuosa*, *T. virginica* var. *glabra*, *T. virginica* var. *villosa*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Pochází z jihovýchodu Severní Ameriky. Dorůstá výšky 30 - 70cm. Listy jsou úzké, kopinaté, dlouhé až 35cm při max. šířce 3,5cm.

Není náročná na substrát, vystačí si s běžnou zahraní zeminou. Neměla by být nikdy zcela suchá.

Množí se dělením trsů nejlépe v období jara.

Tradescantia wrightii

synonyma: *T. wrightii* var. *glandulopubescens*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Tradescantia x andersoniana

oblasti: Massachusetts

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Innocence'

Tradescantia x diffusa

oblasti: Texas

Tradescantia zanoniana (Poděnká Zanonihó)

synonyma: *Campelia bibracteata*, *Campelia boucheana*, *Campelia fastigiata*, *Campelia fendleri*, *Campelia glabrata*, *Campelia hoffmannii*, *Campelia mexicana*, *Campelia pseudozanonia*, *Campelia scandens*, *Campelia zanoniana*, *Campelia zanoniana* var. *glabrata*, *Campelia zanoniana* var. *sessilis*, *Commelina bibracteata*, *Commelina boucheana*, *Commelina fastigiata*, *Commelina glabrata*, *Commelina hoffmanni*, *Commelina mexicana*, *Commelina pseudo-zanoniana*, *Commelina zanoniana*, *Dichorisandra albomarginata*, *Dichorisandra albomarginata* var. *marginata*, *Dichorisandra marginata*, *Gonatandra tradescantioides*, *Sarcoperis bibracteata*, *Stickmannia albomarginata*, *T. capitata*, *T. gentianifolia*, *T. gonatandra*, *Zanoniana bibracteata*

oblasti: Portoriko

Pochází ze Střední Ameriky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Mexican Flag'

Tradescantia zebrina

synonyma: *Cyanotis zebrina*, *Zebrina pendula*

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Jižní Amerika, Kentucky, Louisiana, Portoriko

Roste ve střední a Jižní Americe. Délka převislých stonků může dosáhnout i několik desítek cm. Pěstuje se především pro ozdobné listy, které mají základ šedozelený, prostředkem a na krajích se táhnou tmavě zelené pásy, okraj může navíc i červenat a spodní strana je červená. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *zebrina*/*Zebrina purpusii*

Vyhovuje jí světlé místo bez přímého slunce a střední zálivka.

Tragopogon x neohybridus

oblasti: Illinois, Indiana, New Jersey, New York

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K678.php>

<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/344769-tradescantia>

<http://www.chovatelka.cz/chovatelka/clanek/592--tradeskancie--tradescantia---charakteristika-a-zakladni-rady-pro-pestovani.html>

<http://www.levnekytky.cz/product/tradescantia-vodenka-309/>

<http://www.sukulenty.estranky.cz/clanky/pestitelska-praxe/tradescantia-navicularis---peruanske-lodicky>

<http://www.temere.com/view.php?navezclanku=&cislclanku=2005092701>

<https://www.rostliny.net/>