

## Ammophila (Kamýš)

synonyma: Psamma

čeleď: Poaceae

Rostev v pobřežních dunách a díky tomu je dokáže stabilizovat. Kvůli této vlastnosti byla rozvezena po celém světě. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Pod zemí vytváří bohatý systém oddenků. Listy jsou tuhé, sedozelené, zašpičatělé, žebrovité a zatočené. Kvete v klasu složeném z 1cm klásků.

Množí se semeny.

### Ammophila arenaria (Kamýš písečný)

synonyma: A. arenaria var. arundinacea, A. arundinaceae, A. australis, A. littoralis, Arundo arenaria, Calamagrostis arenaria, Calamagrostis arenaria subsp. australis, Calamagrostis arenaria var. australis, Diarrhena littoralis, Psamma arenaria, Psamma australis, Psamma littoralis, Psamma pallida

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Argentina, Austrálie, Baleáry, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Čile, Egypt, Francie, Havajské ostrovy, Irsko, Island, Itálie, Izrael, J Afrika, Japonsko, JV Asie, JZ Asie, JZ Indie, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Maryland, Německo, Nové Skotsko, Nový Zéland, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Srbsko, Střední Asie, SV Evropa, Sýrie, Tunisko, Turecko, Washington

Roste na pobřeží Evropy, severní Afriky, dále až po Indii a střední Asii jako sedozelená trvalka. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,6 - 1,2m. Pod zemí vytváří až 2m oddenek a to během pouhých 6ti měsíců. Listy jsou tuhé, s voskovitým povrchem, čárkovité, ostré, žilnaté, jemně ochlupené, nadvinuté, dlouhé až 1m, široké do 5mm, na spodní straně lesklé, pochvy jsou vystouplé žilnaté, mají 2cípý jazýček a délku 1 - 3cm. Květenstvím je úzce válcovitá lata délky 10 - 30cm, tvoří ji zploštělá slámovité klásky délky 1 - 1,6cm, plevy jsou kopinaté, špičaté, hladké, na kýlu mírně drsné, dlouhé 1 - 1,3cm, dolní pleva 1žilná, horní 3žilná, plucha kopinatá, dlouhá 0,9 - 1,2cm a na bázi má svazeček až 5mm chloupků. Kvete zelenými květy. Každý rok dokáže vyprodukovať až 100 semen na až 30cm květenství. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. arenaria (Kamýš písečný pravý) - francouzské pobřeží atlantiku
- subsp. arundinacea (Amofila písečná rákosovitá) - středozemí a španělský atlantik; využívána ke zpevňování písků
- subsp. australis

Vyhovují ji písčiny a duny.

### Ammophila breviligulata

synonyma: A. arenaria var. breviligulata

oblasti: Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kalifornie, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin

Pochází ze Severní Ameriky z písečného pobřeží Atlantického oceánu a velkých jezer. Dorůstá výšky 60 - 90cm. Květenství má délku do 25cm.

### Ammophila champlainensis

synonyma: A. breviligulata subsp. *champlainensis*

oblasti: Maine, Massachusetts, New York, Vermont

Pochází od strání při jezeru Ontario. Květenství je dlouhé až 22cm.

### Ammophila pallida

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kam%C3%BD%C5%A1>

<https://www.rostliny.net/>