

# Asperugo (Ostrolist)

čeleď: Boraginaceae

Existuje pouze jediný druh.

## Asperugo procumbens (Ostrolist poléhavý)

synonyma: *A. alba*, *A. erecta*, *A. vulgaris*

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Grónsko, Idaho, Illinois, Írán, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kolorado, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, S Afrika, Severní Dakota, Středozeří, Švýcarsko, Ťan-šan, Ural, Utah, Virginie, Washington, Wyoming, Yukon, Z Sibiř

Pochází z Evropy, severní Afriky, středozeří, subtropy Asie a zavlečený byl do Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 60 (i 90)cm. Lodyha je poléhavá až vystoupavá, řídce drsně štětinatě ochlupená se zpětně zahnutými chloupky, chudě větvená, hranatého průřezu. Listy mají tvar mají eliptický, může být i mírně zubatý a povrch je ochlupený, bazální jsou střídavé, lodyžní jsou vstřícné nebo dvouřadě střídavé, krátce řapíkaté, dlouhé 2 - 8cm a široké 0,6 - 1,9 (i 2,2)cm. Kvete drobnými samostatnými nebo párovými oboupohlavnými modrofialovými květy s bílým středem a s 5ti korunními lístky, kalich má délku 0,8 (i 1)cm, šířku 1,2 (i 1,6)cm a koruna má velikost 2 - 3 (i 4)mm. Plodem je podlouhle vejčitá zploštělá světlehnědá tvrdka délky 2,5 - 3,2mm a šířku 1,4 - 2mm.

Vyhovují mu skály, skalní stepy, občas i písčiny, rumišťe, navážky, skládky, křoviny, atp.

Množí se semeny.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/asperugo-procumbens/>

<http://naseflora.cz/ostrolist-polehavy-asperugo-procumbens/>

[http://www.jvsystem.net/app19/Species.aspx?pk=10052&lng\\_user=1](http://www.jvsystem.net/app19/Species.aspx?pk=10052&lng_user=1)

<https://www.rostliny.net/>