

Cyanotis

synonyma: Tonningia

čeleď: Commelinaceae

Roste v tropické Africe a Asii v podobě zpravidla stálezelené byliny. Rozrůstá se do šířky, zatímco v centrální části odumírá. Listy jsou dužnaté, pokryté drobnými chloupky různé barvy zabraňující většímu odpařování vody. Květenství je vidlanovité, opatřené listeny, vlastní květy jsou růžové, namodralé nebo fialové.

Potřebuje hodně světla a pokojovou teplotu. Zálivka musí být pouze malá. Dáváme při ní pozor, aby voda nepřišla do styku s listy, objevovaly by se pak na nich skvrny. Substrát potřebuje propustný, vzdušný, ideálně pískový. Hnojí se jednou za 3 týdny tekutým hnojivem.

Množí se vrcholovými řízků.

Cyanotis adscendens

Cyanotis ake-assii

Cyanotis angusta

Cyanotis arachnoidea

Cyanotis arcotensis

Cyanotis axillaris

Cyanotis barbata

oblasti: Čína, Himálaj, Malajsie, Pákistán

Roste v Himálaji, Malajsii a Číně. Dorůstá délky 15 - 30 (i 45)cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou podlouhlé až úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 7,5cm a široké 3 - 7mm. Květy jsou tmavěmodré. Plodem je 4hranná tobolka obsahující zpravidla 6 hnědých semen délky 1mm.

Cyanotis beddomei

Cyanotis burmanniana

Cyanotis caespitosa

Cyanotis cerifolia

Cyanotis ceylanica

Cyanotis cristata

oblasti: Afrika, Pákistán

Roste v tropické Africe a Asii. Dorůstá délky 15 - 30 (i 45)cm. Větvě jsou vzpřímené nebo vystoupavé a mohou být ochlupené. Listy jsou vejčité až podlouhlé, přisedlé, špičaté, dlouhé 5 - 10cm, široké 1 - 1,5cm a na bázi srdčité až zakulacené. Květenství je vrcholové, vlastní květy jsou modré. Plodem je 3hranná zašpičatělá tobolka délky 3 - 4mm obsahující zpravidla 6 semen délky 1,2mm.

Cyanotis cucullata

Cyanotis cupricola

Cyanotis dybowskii

Cyanotis fasciculata

Cyanotis flexuosa

Cyanotis foecunda

Cyanotis ganganensis

Cyanotis grandidieri

Cyanotis hepperi

Cyanotis homblei

Cyanotis karliana

Cyanotis kewensis

oblasti: J Indie, Střední Asie

Roste v Indii jako trvalka. Lodyha je poléhavá. Listy vyrůstají ve 2 řadách, vzájemně se překrývají, jsou sivozelené, nafialovělé na spodní straně hnědě ochlupené. Květenství je nepravidelné během celého roku, přisedlé, listeny modrofialové, vlastní květy jsou 3četné a také modrofialové.

Potřebuje dostatek světla, ne však přímého slunce a mírnou zálivku. Teplota mu vyhovuje pokojová, v zimě snižte na 13 - 15°C a ještě více snižte zálivku.

Množí se semeny a stonkovými řízků.

Cyanotis lanata

Cyanotis lapidosa

Cyanotis longifolia

Cyanotis loureiroana

Cyanotis lourensis

Cyanotis minima

Cyanotis nilagirica

Cyanotis nyctitropa

Cyanotis obtusa

Cyanotis pachyrrhiza

Cyanotis paludosa

Cyanotis papilionacea

Cyanotis pauciflora

Cyanotis pedunculata

Cyanotis pilosa

Cyanotis polyrrhiza

Cyanotis racemosa

Cyanotis repens

Cyanotis reutiana

Cyanotis robusta

Cyanotis scaberula

Cyanotis somaliensis

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku. Stonky jsou plazivé. Listy jsou husté, kopinaté, tmavězelené, na okrajích bíle ochlupené a dlouhé 5cm. Kvete sytě růžovomodrými až fialovými květy.

Cyanotis speciosa

Cyanotis thwaitesii

Cyanotis tuberosa

Cyanotis vaga

Cyanotis vaginata

Cyanotis villosa

Cyanotis vivipara

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/cyanotis/>

<http://www.abecedazahrady.cz/default.aspx?section=4&server=1&catalog=1&catitem=6012>

<http://www.celysvet.cz/cyanotis-kewensis.php>

<http://www.zelenelisty.estranky.cz/clanky/werbar---sukulenty/cyanotis-somaliensis>

<https://www.rostliny.net/>