Borassus (Lontar)

čeleď: Arecaceae

Dělí se na 6 druhů. Pocházejí z tropických částí Afriky, Madagaskaru, Asie a Nové Guineje. Dorůstají výšky 30m. Listy mají délku 2 - 3m.

Borassus aethiopium (Lontar etiopský)

oblasti: Etiopie, Madagaskar, Tropická Afrika

Pochází z tropické Afriky. Vytváří asi 20cm velké plody ebenové barvy ve tvaru vejce.

Borassus akeassii

oblasti: Z Afrika

Pochází ze západní Afriky. Vytváří asi 20cm velké plody ebenové barvy ve tvaru vejce.

Borassus flabellifer (Vějířovník)

oblasti: Indie, JV Asie, Pákistán

Pochází z jižní a jihovýchodní Asie. Dorůstá výšky 20 - 25 (i 30)m. Kmen u starších stromů mývá často nepravidelný tvar. Ze svých až 3m dlouhých vějířových listů vytváří téměř pravidelnou kulovitou korunu, kde na spodní straně naleznete zbytky suchých odumřelých listů, řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm nepravidelně zubaté, čepel má délku 0,6 - 1,2m a tvoří ji 60 - 80 úzce kopinatých lístků. Samčí květenství je dlouhé 0,9 - 1,5m, má 7 hlavních větví, sekundární jsou dlouhé 30cm, průměru 2cm, kališní lístky jsou uťaté, korunní lístky jsou kratší, obvejčité až lžičkovité, samičí květenství má délku do 30cm, průměru 2,5cm, obsahuje 8 - 16 květů ve spirále a koruna má průměr 2,5cm. Plody mají kulatý průřez průměru (12 -) 15 - 20cm a po délce jsou kapkovitě protáhlé. Jsou poživatelné.

Vyhovuje mu světlé místo, pokojová teplota a vysoká vzdušná vlhkost.

Borassus heineanus

oblasti: Nová Guinea

Pochází z Nové Guineje.

Borassus madagascariensis

oblasti: Střední Madagaskar

Pochází z Madagaskaru. Listy mají drobné přímé zelené zuby na řapících, které jsou jinak žluté až žlutozelené. Plody jsou špičaté, dlouhé 15 (i 25)cm.

Borassus sambiranensis

oblasti: SZ Madagaskar

Pochází z Madagaskaru. Listy mají ostře zubatý okraj řapíků se zpětně zahnutými zuby, má žlutou barvu, u báze přechází do hnědé (v mládí na slunci až černé).

Další informace:
http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?722
http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/palma-lontar

https://www.rostliny.net/