

Podocarpus (Nohoplod)

čeleď: Podocarpaceae

Rodové jméno vzniklo z řeckých slov podos = noha a karpos = plod. Pochází většinou z vyšších poloh tropů. Patří mezi stálezelené keře nebo stromy dorůstající výšky 1 - 25 (i 40)m. Listy jsou dlouhé 0,5 - 15cm. Používá se pro bonsajové pěstování.

Podocarpus acuminatus

Podocarpus acutifolius

synonyma: Nageia acutifolia

Podocarpus affinis

synonyma: Nageia affinis

oblasti: J Čína, Malajsie, Melanésie

Pochází z jižní Číny přes Malajsii do Fidži.

Podocarpus alpinus (Nohoplod alpský)

synonyma: Nageia alpina, Nageia parvifolia, P. parvifolius, P. totara var. alpinus

oblasti: J Čile, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Tasmánie

Roste v Austrálii, Tasmánii, Novém Zélandu, Nové Kaledonii a v Čile. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Gem'
- 'Chocklat Box' - plné slunce nebo polostín
- 'Pink Tip'

Vyhovují mu vlhké půdy. V chladnějších oblastech se doporučuje zimní kryt. Dobře snáší řez.

Podocarpus andinus

Podocarpus angustifolius

synonyma: P. ekmanii

oblasti: Guyana, Karibik

Pochází z jižního Karibiku a vyšších poloh Guyany.

Podocarpus annamiensis

oblasti: Borneo, Nová Kaledonie, Sumatra, Tchaj-wan, Vietnam

Pochází z Tchaj-wanu, Vietnamu, Sumatry, Bornea a Nové Kaledonie.

Podocarpus aracensis

Podocarpus archboldii

synonyma: Margbensonia archboldii

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus aristulatus

synonyma: Nageia aristulata, P. angustifolius subsp. buchii, P. angustifolius subsp. buchiii, P. angustifolius var. aristulatus, P. angustifolius var. latifolius, P. angustifolius var. leonii, P. angustifolius var. wrightii, P. aristulatus var. buchii, P. buchii, P. buchii var. latifolius, P. leonii, P. victorinianus

oblasti: Guyana, Karibik

Pochází z jižního Karibiku a vyšších poloh Guyany.

Podocarpus atjehensis

synonyma: Margbensonia atjehensis, P. neriifolius var. atjehensis

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus ballivianensis

Podocarpus barretoii

Podocarpus beecherae

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus borneensis

synonyma: P. polystachyus var. rigidus

oblasti: Borneo, Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus bracteatus

synonyma: *Nageia bracteata*, *P. bracteatus* var. *brevipes*, *P. neriifolius* var. *bracteatus*, *P. neriifolius* var. *brevipes*

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus brasiliensis

oblasti: Bolívie, S Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází ze střední Ameriky a severu Jižní Ameriky po Bolívii.

Podocarpus brassii

oblasti: Nová Guinea

Pochází z jihovýchodní Asie po Novou Guineu.

Podocarpus brevifolius

synonyma: *P. neriifolius* var. *brevifolius*

oblasti: Nová Guinea

Pochází z jihovýchodní Asie po Novou Guineu.

Podocarpus buchholzii

synonyma: *P. buchholzii* var. *neblinensis*

oblasti: Guyana, Karibik

Pochází z jižního Karibiku a vyšších poloh Guyany.

Podocarpus capuronii

oblasti: Madagaskar, V Afrika

Pochází z Madagaskaru a východní Afriky.

Podocarpus celatus

oblasti: Bolívie, S Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází ze střední Ameriky a severu Jižní Ameriky po Bolívii.

Podocarpus chinensis

synonyma: Margbensonia chinensis, Margbensonia maki, Nageia appressa, Nageia chinensis, Nageia corrugata, Nageia flagelliformis, Nageia macrophylla var. maki, P. appressus, P. chinensis var. maki, P. corrugatus, P. flagelliformis, P. japonicus, P. macrophyllus subsp. maki, P. macrophyllus var. chinensis, P. macrophyllus var. maki, P. makoyi

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus chingianus

synonyma: Margbensonia chingiana, P. macrophyllus var. chingii

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus confertus

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus coriaceus

synonyma: Nageia coriacea, P. coriaceus var. sulcatus, Taxus lancifolia

oblasti: Bolívie, J Mexiko, Portoriko, Venezuela

Pochází z jižního Mexika, Portorika, Malých Antil, Venezuely a vyšších oblastí Bolívie.

Podocarpus costalis (Nohoplod žebernatý)

synonyma: Nageia costalis

oblasti: Filipíny, Nová Guinea, Tchaj-wan

Roste od Filipín po Tchaj-wan.

Podocarpus costaricensis

Podocarpus crassigemmis

oblasti: Nová Guinea

Pochází z jihovýchodní Asie po Novou Guineu.

Podocarpus cunninghamii

synonyma: Nageia hallii, P. hallii, P. totara var. hallii

oblasti: J Čile, JV Austrálie, Nová Kaledonie, Nový Zéland

Pochází z jihovýchodu Austrálie, Nového Zélandu, Nové Kaledonie a jižního Čile.

Podocarpus decumbens

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus deflexus

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guineje a Toga.

Podocarpus degeneri

synonyma: Margbensonia degeneri, P. neriifolius var. degeneri

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus dispermus

synonyma: Margbensonia disperma

oblasti: Borneo, Nová Guinea, Queensland

Pochází ze severu Queenslandu, Nové Guineje a Bornea.

Podocarpus drouynianus

synonyma: Margbensonia drouyniana, Nageia drouyniana

oblasti: JV Austrálie, JZ Austrálie

Pochází z jihovýchodního a jihozápadního pobřeží Austrálie.

Podocarpus elatus

synonyma: Margbensonia elata, Nageia elata

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus elongatus

synonyma: Nageia elongata, P. elongata, P. pruinus, P. thunbergii var. angustifolius, Taxus capensis, Taxus elongata

oblasti: J Afrika, JV Afrika, V Afrika

Pochází z východní a jižní Afriky.

Podocarpus epiphyticus

Podocarpus falcatus

Podocarpus fasciculus

synonyma: P. macrophyllus f. grandifolius, P. macrophyllus var. liukuensis

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus gaussonii

Podocarpus gibbsii

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus glaucus

oblasti: J Čína, Malajsie, Melanésie

Pochází z jižní Číny přes Malajsii do Fidži.

Podocarpus globulus

oblasti: Borneo, Nová Kaledonie, Sumatra, Tchaj-wan, Vietnam

Pochází z Tchaj-wanu, Vietnamu, Sumatry, Bornea a Nové Kaledonie.

Podocarpus glomeratus

synonyma: Nageia glomerata, P. cardenasii, P. rigidus

oblasti: Andy, Argentina, Ekvádor, J Brazílie, Střední Čile

Pochází ze středního Čile, jižní Brazílie a z And od Argentiny po Ekvádor.

Podocarpus gnidioides

synonyma: Nageia gnidioides, P. alpinus var. arborescens, P. alpinus var. caespitosus, P. caespitosus

oblasti: J Čile, JV Austrálie, Nová Kaledonie, Nový Zéland

Pochází z jihovýchodu Austrálie, Nového Zélandu, Nové Kaledonie a jižního Čile.

Podocarpus grayae

Podocarpus grayii

oblasti: Hainan, Malajsie, Queensland

Pochází z pásu od ostrova Hainan na jih přes Malajsii po severní Queensland.

Podocarpus guatemalensis

synonyma: P. allenii, P. guatemalensis var. allenii, P. guatemalensis var. pinetorum, P. pinetorum

oblasti: Bolívie, Guatemala, S Jižní Amerika

Pochází ze střední Ameriky a severu Jižní Ameriky po Bolívii.

Podocarpus henkelii

synonyma: P. ensiculus

oblasti: Madagaskar, V Afrika

Pochází z Madagaskaru a východní Afriky.

Podocarpus hispaniolensis

Podocarpus humbertii

oblasti: Madagaskar, V Afrika

Pochází z Madagaskaru a východní Afriky.

Podocarpus indonesiensis

Podocarpus insularis

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guineje a Toga.

Podocarpus lambertii

synonyma: *Nageia lambertii*, *P. lambertii* var. *horsmanii*, *P. lambertii* var. *tigreensis*

oblasti: Andy, Argentina, Ekvádor, J Brazílie, Střední Čile

Pochází ze středního Čile, jižní Brazílie a z And od Argentiny po Ekvádor.

Podocarpus latifolius

synonyma: *Nageia thunbergii*, *P. latifolius* var. *confertus*, *P. latifolius* var. *latior*, *Taxus latifolia*

oblasti: J Afrika, V Afrika

Pochází z východní a jižní Afriky.

Podocarpus laubenfelsii

oblasti: Hainan, Malajsie, Queensland

Pochází z pásu od ostrova Hainan na jih přes Malajsii po severní Queensland.

Podocarpus lawrencei

synonyma: *P. alpinus* var. *lawrencei*

oblasti: J Čile, JV Austrálie, Nová Kaledonie, Nový Zéland

Pochází z jihovýchodu Austrálie, Nového Zélandu, Nové Kaledonie a jižního Čile.

Podocarpus ledermannii

synonyma: *P. idenburgensis*

oblasti: Borneo, Nová Guinea, Queensland

Pochází ze severu Queenslandu, Nové Guineje a Bornea.

Podocarpus levis

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guineje a Toga.

Podocarpus longifoliolatus

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus lophatus

oblasti: J Čína, Malajsie, Melanésie

Pochází z jižní Číny přes Malajsii do Fidži.

Podocarpus lucienii

oblasti: Borneo, Nová Kaledonie, Sumatra, Tchaj-wan, Vietnam

Pochází z Tchaj-wanu, Vietnamu, Sumatry, Bornea a Nové Kaledonie.

Podocarpus macrocarpus

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus macrophyllus (Nohoplod velkolistý)

synonyma: Margbensonia forrestii, Margbensonia macrophylla, Nageia macrophylla, P. forrestii, P. macrophyllus f. angustifolius, P. macrophyllus var. angustifolius, P. macrophyllus var. rubra, P. verticillatus, Taxus macrophylla, Taxus makoya

oblasti: Florida, J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, Portoriko, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii. Vytváří husté útvary.

Vyhovuje mu rozptýlené světlo a pokojová teplota. Ta by nikdy neměla klesnout pod 8°C. Zálivka stačí pouze mírná, ale důležitá je vyšší vzdušná vlhkost.

Podocarpus madagascariensis

synonyma: Nageia madagascariensis

oblasti: Madagaskar, V Afrika

Pochází z Madagaskaru a východní Afriky.

Podocarpus magnifolius

oblasti: Bolívie, S Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází ze střední Ameriky a severu Jižní Ameriky po Bolívii.

Podocarpus matudae

synonyma: *P. matudae* var. *jaliscanus*, *P. matudae* var. *macrocarpus*, *P. matudae* var. *reichei*, *P. reichei*

Podocarpus matudai

oblasti: Bolívie, J Mexiko, Portoriko, Venezuela

Pochází z jižního Mexika, Portorika, Malých Antil, Venezuely a vyšších oblastí Bolívie.

Podocarpus micropedunculatis

oblasti: Borneo, Nová Guinea, Queensland

Pochází ze severu Queenslandu, Nové Guineje a Bornea.

Podocarpus micropedunculatus

Podocarpus milanjanus

synonyma: *P. milanjanus* f. *arborescens*, *P. ulugurensis*

Podocarpus monteverdeensis

Podocarpus nagi

Podocarpus nakaii (Nohoplod Nakaiův)

synonyma: *P. macrophyllus* var. *nakaii*

oblasti: Borneo, Nová Kaledonie, Sumatra, Tchaj-wan, Vietnam

Pochází z Tchaj-wanu a dále roste ve Vietnamu, Sumatře, Borneu a Nové Kaledonii.

Podocarpus neriifolius

synonyma: *Margbensonia neriifolia*, *Nageia discolor*, *Nageia endlicheriana*, *Nageia leptostachya*, *Nageia neglecta*, *Nageia neriifolia*, *P. decipiens*, *P. discolor*, *P. endlicherianus*, *P. junghuhnianus*, *P. leptostachyus*, *P. macrophyllus* var. *acuminatissimus*, *P. neglectus*, *P. neriifolius* var. *decipiens*, *P. neriifolius* var. *linearis*, *P. neriifolius* var. *membranaceus*, *P. neriifolius* var. *penibukanensis*, *P. neriifolius* var. *polyanthus*, *P. neriifolius* var. *staintonii*

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Thajsko, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus nivalis (Nohoplod sněžný)

synonyma: *Nageia nivalis*, *P. nivalis* var. *erectus*

oblasti: J Čile, JV Austrálie, Nová Kaledonie, Nový Zéland

Roste v Austrálii, Nového Zélandu, Nové Kaledonii a Čile v podobě stálezeleného hustého rozkladitého 1/2kulatého dvoudomého keře. Dorůstá výšky 2 (i 5)m. Poléhavé větve dokáží znovu zakořenit. Listy jsou jehlicovité, asymetrické, podlouhlé, zploštělé, na okraji ztlustlé, dlouhé 0,5 - 2cm, spodní strana je lesklá, kýlnatá a má 2 rýhy. Samčí šištice vyrůstají po 1 - 4ks, samičí samostatně na vrcholcích větví. Plody jsou jedlé, mají eliptická semena velikosti 4 - 5mm se 7mm dlouhým epimatiem. Používá se jako alternativa k tis. Růst je pomalý. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Pink Tip' - v 10ti letech výška 70 - 90cm, šířka 1,5 - 1,8m; větve na vrcholcích růžové; jehlice ve spirále, tmavězelené
- 'Rockery Gem'

Je mrazuvzdorný do -25°C. Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, vlhká půda libovolného složení (od písčité po jílovitou), lepší je ale dobře propustná, neutrální nebo kyselá.

Množí se semeny, řízky nebo hřížením.

Podocarpus novae-caledoniae

synonyma: *Nageia novae-caledoniae*, *P. beecherae*, *P. novae-caledoniae*

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Nová Kaledonie, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus nubigenus

synonyma: *Nageia nubigena*

oblasti: J Čile, JV Austrálie, Nová Kaledonie, Nový Zéland

Pochází z jihovýchodu Austrálie, Nového Zélandu, Nové Kaledonie a jižního Čile.

Podocarpus oleifolius

synonyma: *Nageia macrostachya*, *Nageia oleifolia*, *P. ingensis*, *P. macrostachys*, *P. oleifolius* var. *costaricensis*, *P. oleifolius* var. *costaricensis*, *P. oleifolius* var. *equadorensis*, *P. oleifolius* var. *macrostachys*, *P. oleifolius* var. *trujillensis*

oblasti: Guyana, Mexiko, Peru

Pochází z Peru a oblasti od Mexika po Guyanu.

Podocarpus palawanensis

Podocarpus pallidus

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus parlatorei

synonyma: Nageia angustifolia

oblasti: Andy, Argentina, Ekvádor, J Brazílie, Střední Čile

Pochází ze středního Čile, jižní Brazílie a z And od Argentiny po Ekvádor.

Podocarpus pendulifolius

oblasti: Guyana, Mexiko, Peru

Pochází z Peru a oblasti od Mexika po Guyanu.

Podocarpus perrieri

synonyma: P. rostratus var. perrieri

Podocarpus pilgeri

synonyma: P. schlechteri, P. tixieri, P. wangii

oblasti: J Čína, Malajsie, Melanésie

Pochází z jižní Číny přes Malajsii do Fidži.

Podocarpus polyspermus

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus polystachyus

synonyma: Margbensonia polystachya, Nageia polystachya, Nageia thevetiifolia, P. polystachyus var. thevetiifolius, P. thevetiifolius

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus pseudobracteatus

synonyma: *P. archboldii* var. *crassiramosus*

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus purdieanus

synonyma: *Nageia purdieana*

oblasti: Bolívie, S Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází ze střední Ameriky a severu Jižní Ameriky po Bolívii.

Podocarpus ramosii

Podocarpus ridleyi

synonyma: *Margbensonia ridleyi*, *P. neriifolius* var. *ridleyi*

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, Nová Guinea, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus roraimae

oblasti: Guyana, Karibik

Pochází z jižního Karibiku a vyšších poloh Guyany.

Podocarpus rostratus

oblasti: Madagaskar, V Afrika

Pochází z Madagaskaru a východní Afriky.

Podocarpus rotundus

oblasti: J Čína, Malajsie, Melanésie

Pochází z jižní Číny přes Malajsii do Fidži.

Podocarpus rubens

synonyma: *P. neriifolius* var. *timorensis*, *P. rubens* var. *pabinamaensis*, *P. rubens* var. *sumatranus*

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus rumphii

synonyma: *Cerbera nereifolia*, *Margbensonia koordersii*, *Margbensonia philippinensis*, *Margbensonia rumphii*, *Nageia rumphii*, *P. koordersii*, *P. philippinensis*, *P. rumphii* var. *arbainii*, *P. rumphii* var. *aruensis*

oblasti: Malajsie, Queensland

Pochází z pásu od ostrova Hainan na jih přes Malajsii po severní Queensland.

Podocarpus rusbyi

oblasti: Bolívie, J Mexiko, Portoriko, Venezuela

Pochází z jižního Mexika, Portorika, Malých Antil, Venezuely a vyšších oblastí Bolívie.

Podocarpus salicifolius

synonyma: *Nageia chilina*, *Nageia salicifolia*, *P. pittieri*

oblasti: Bolívie, J Mexiko, Portoriko, Venezuela

Pochází z jižního Mexika, Portorika, Malých Antil, Venezuely a vyšších oblastí Bolívie.

Podocarpus salignus

synonyma: *P. chilinus*, *P. chilinus* var. *glaucus*

oblasti: Andy, Argentina, Ekvádor, J Brazílie, Střední Čile

Pochází ze středního Čile, jižní Brazílie a z And od Argentiny po Ekvádor.

Podocarpus salomoniensis

oblasti: Borneo, Melanésie, Sumatra

Pochází ze Sumatry, Bornea a Fidži.

Podocarpus sellowii

synonyma: *Nageia sellowii*, *P. sellowii* var. *angustifolius*

oblasti: Andy, Argentina, Ekvádor, J Brazílie, Střední Čile

Pochází ze středního Čile, jižní Brazílie a z And od Argentiny po Ekvádor.

Podocarpus smithii

oblasti: Queensland

Pochází ze severovýchodu Queenslandu.

Podocarpus spathoides

synonyma: *P. spathoides* var. *solomonensis*

oblasti: Filipíny, Nepál, Nová Guinea, Sumatra, Togo

Pochází z pásu od Nepálu po Sumatru, Filipín, Nové Guinei a Toga.

Podocarpus spinulosus

synonyma: *Margbensonia spinulosa*, *Nageia ensifolia*, *Nageia laeta*, *Nageia spinulosa*, *P. bidwillii*, *P. ensifolius*, *P. laetus*, *P. pungens*, *Taxus spinulosa*

oblasti: JV Austrálie, JZ Austrálie

Pochází z jihovýchodního a jihozápadního pobřeží Austrálie.

Podocarpus sprucei

synonyma: *Nageia sprucei*

oblasti: Andy, Argentina, Ekvádor, J Brazílie, Střední Čile

Pochází ze středního Čile, jižní Brazílie a z And od Argentiny po Ekvádor.

Podocarpus steyermarkii

oblasti: Bolívie, J Mexiko, Portoriko, Venezuela

Pochází z jižního Mexika, Portorika, Malých Antil, Venezuely a vyšších oblastí Bolívie.

Podocarpus subtropicalis

synonyma: *P. subtropicalis* var. *medogensis*

oblasti: J Čína, Japonsko, Malajsie, S Austrálie

Pochází z jižní Číny a Japonska, dále na jih přes Malajsii, Novou Guineu a severní Austrálii.

Podocarpus sylvestris

synonyma: *P. colliculatus*, *P. novae-caledoniae* var. *colliculatus*

oblasti: Borneo, Nová Kaledonie, Sumatra, Tchaj-wan, Vietnam

Pochází z Tchaj-wanu, Vietnamu, Sumatry, Bornea a Nové Kaledonie.

Podocarpus tepuiensis

oblasti: Guyana, Mexiko, Peru

Pochází z Peru a oblasti od Mexika po Guyanu.

Podocarpus teysmannii

synonyma: *Nageia teysmannii*, *P. neriifolius* var. *teysmannii*

oblasti: Borneo, Nová Kaledonie, Sumatra, Tchaj-wan, Vietnam

Pochází z Tchaj-wanu, Vietnamu, Sumatry, Bornea a Nové Kaledonie.

Podocarpus tixieri

oblasti: Nová Guinea

Pochází z jihovýchodní Asie po Novou Guineu.

Podocarpus totara

synonyma: *Nageia totara*, *P. totara* var. *waihoensis*, *P. variegatus*

oblasti: J Čile, JV Austrálie, Nová Kaledonie, Nový Zéland

Pochází z jihovýchodu Austrálie, Nového Zélandu, Nové Kaledonie a jižního Čile.

Podocarpus transiens

synonyma: *P. lambertii* var. *transiens*, *P. transiens* var. *harleyi*

oblasti: Andy, Argentina, Ekvádor, J Brazílie, Střední Čile

Pochází ze středního Čile, jižní Brazílie a z And od Argentiny po Ekvádor.

Podocarpus trinitensis

oblasti: Bolívie, S Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází ze střední Ameriky a severu Jižní Ameriky po Bolívii.

Podocarpus urbanii

oblasti: Guyana, Karibik

Pochází z jižního Karibiku a vyšších poloh Guyany.

Podocarpus woltzii

synonyma: *P. capuronii* var. *woltzii*

Podocarpus x loderi

Další informace:

<http://www.albatrostravel.cz/expedice/podle-zeme/stredni-a-jizni-amerika/ekvador/podocarpus-np.html>

<http://www.celysvet.cz/podocarpus.php>

<https://www.rostliny.net/>