Clinostigma

čeleď: Arecaceae

Jméno rodu odkazuje na ukloněnou bliznu typickou pro tento rod. Patří sem pouhých 13 druhů rozšířených po různých pacifických ostrovech, takže jmenování jejich lokalit by bylo náročným zeměpisným testem. Všechny druhy jsou statné se zpeřenými listy. Rostou v podrostu velmi vlhkých lesů na svazích ve vyšších polohách a jsou přizpůsobené hodně vlhkým až mlžným podmínkám. V kultuře jsou tyto rostliny hodně vzácné. Jejich kořeny můžou nad zemí vytvářet chůdovité kořeny.

Clinostigma exorrhizum

Vytváří chůdovité kořeny.

Clinostigma haerestigma

Clinostigma harlandii

Clinostigma samoense

Clinostigma savoryanum

oblasti: Tichý oceán

Pochází z malého souostroví Bonin, dnes uváděného spíše pod japonským jménem Ogasawara. Je to nevbelké pacifické souostroví s přibližně 30 ostrovy severně od rovníku někde mezi Japonskem a Hawají, asi 100km od Tokya. Za války zde Japonci měli důležitou základnu (patrně dosud mají) a tyto dříve běžné palmy výrazně likvidovali. O izolaci souostroví svědčí i zařazení druhu v celosvětovém červeném seznamu v kolonce data deficient, tedy chybějící informace. Růst rostlin je velmi rychlý.

https://www.rostliny.net/