

Latania

čeleď: Arecaceae

Do rodu *Latania* patří pouhé tři druhy nádherných palm endemických na Maskarénách. Všechny tři byly dříve častým prvkem otevřených biotopů, ale vlivem odlesňování jsou dnes velmi vzácné. Jsou to statné stromy s jedním kmenem. Mají dlanité, hluboké dělené listy a jejich listové pochvy se na bázi trhají na dvě poloviny. Jednopohlavné květy vyrůstají na samčích a samičích jedincích. *Latanie* mají protáhlá semena s výraznou skulpturou, jednoznačně jedna z nejhezčích mezi všemi palmami a druhově výrazně odlišná. Všechny tři druhy se mohou v kulture křížit. Jejich rozlišování je nejsnazší podle barvy řapíků, v angličtině jsou podle barvy všechny tři druhy pojmenovány jakok modrá, červená a žlutá *latanová palma*.

Latania loddigesii

Je to nejstatnější druh *latanie* s kmenem až 8m vysokým. V mládí má načervenalé zbarvení řapíků, ovšem v dospělosti mají celé listy i řapíky nasivělé, modré zbarvení. Plody mají švestkovitý tvar a jsou hnědé. Roste na maličkém ostrůvku Round Island ležícím severně od ostrova Mauritius a je ze všech tří druhů v kulture nejčastější.

Latania lontaroides

Pochází z Reunionu. Roste na nevelkém území na pobřežních útesech, kde přežívá již jen nemnoho jedinců, takže patří mezi druhy uvedené v celosvětovém červeném seznamu ohrožených druhů.

Latania verschaffeltii

Tento druh pochází z ostrova Rodriguez, kde roste na pobřežních skaliskách a v roklinách. Jeho řapíky jsou výrazně žlutooranžové a u starších jedinců jsou včetně bází listů pokryté bílou vlnou.

<https://www.rostliny.net/>