

# Rhopalostylis

čeleď: Arecaceae

Nejjižnější palma světa patří do rodu, který je domovem na Novém Zélandu a přilehlých ostrovech. Na kmenech jsou patrné jizvy po odumřelých listech. Délka listů může dosáhnout 3 - 5m.

V létě by teplota neměla přesáhnout 20°C a v zimě klesnout pod 8°C. Potřebuje pravidelnou zálivku.

## Rhopalostylis baueri

oblasti: Tichý oceán

Patří mezi endemity Norfolků a Kermadekových ostrovů. Druhové jméno bylo vybráno na počest rakouských bratřích Bauerových, kteří provázeli botanika Sira J. Bankse jako malíři na cestě po tichomoří a Austrálii. Na kmenech jsou patrné jizvy po shozených listech. Listy dorůstají délky až 4m.

## Rhopalostylis sapida

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na obou hlavních ostrovech Nového Zélandu a také na Chathamových ostrovech, kde dosahuje na 44° nejjižnější místo palmového rozšíření. Na každém z ostrovů vypadá tento druh poněkud jinak a patrně zasluhuje další taxonomickou pozornost. Druh je dosti stínomilný a také vlhkomilný a chladomilný. Horké léto mu nesvědčí, ale nepřežije ani naše zimy. Roste velmi pomalu, kmen začíná tvořit po 15ti letech a poprvé kvete ve více než 30ti letech. Typickým znakem jsou vzhůru vzpřímené lístky a nápadná ztlustěná pod chocholem listů. Menší vystavená rostlina z Little Barrier Island u Severního ostrova má užší lístky a nejmenší rostlinka je z Chathamu.

Další informace:

[http://rostliny.wz.cz/pages/palmy/vypis\\_stranky.php?id=13](http://rostliny.wz.cz/pages/palmy/vypis_stranky.php?id=13)

<https://www.rostliny.net/>