

Akebia (Akebie)

čeleď: Lardizabalaceae

Roste v Japonsku, Číně a Koreji v podobě dvoudomé liány. Stonky jsou štíhlé a ovíjivé. Listy jsou složené, lístky jsou vejčitěeliptické, zpravidla celokrajné a opadávají v závislosti na teplotě. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou červenofialové až hnědé, aromatické a jednopohlavné. Plody jsou dužnaté, jedlé, modré až fialové.

Vyhovuje ji vlhká půda bohatá na živiny. Min. báze rostliny by měla být alespoň v částečném stínu.

Množí se semeny, hřížením nebo kořenovými řízků.

Akebia chingshuiensis

Akebia longiracemosa

Akebia quinata (Akebie pětičetná)

oblasti: Connecticut, Čína, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Japonsko, Jižní Karolína, Kentucky, Korea, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pákistán, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie, Západní Virginie

Roste v Japonsku, Koreji a Číně v podobě 1/2opadavého jednodomé cizosprašné ovíjivé liány. Dorůstá výšky až 10 - 12m. Kmínek dřevnatí. Listy jsou dlanitě složené, (3 -) 5 (i 7)mi četné, vlastní lístky jsou pravidelně oválné, na konci i mírně zpětně vykrojené. Kvete v převislém klasovitém květenství, vlastní květy jsou světle fialové (samčí) a hnědočervenými (samičí) průměru 2,5 - 3cm, kališní lístky jsou vypouklé, složené tvoří zploštěnou kouli a korunní lístky chybějí. Plodí nejdříve v 5ti letech. Plodem je světlá fialově zelená až fialová, eliptická, uvnitř dutá ovinutá bobule, délky (5 -) 6 - 10 (i 12)cm, šířky 5cm, obsahuje bílý průhledný váček, který slouží jako válcový obal pro velké množství drobných černých semínek. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Variegata'

Vyhovuje ji plné světlo nebo polostín. Půda by měla být vlhká, lehká (písčitá), bohatá na živiny a snáší i sušší místa. Řez lépe snášejí pouze starší rostliny. Roste rychlostí 1,5 - 2m/rok.

Množí se semeny, kořenovými nebo letními řízků a také vlnkovitým hřížením jednoletých výhonů.

Akebia trifoliata (Akebie trojčetná)

oblasti: Čína, Japonsko

Roste v Číně a Japonsku. Dorůstá výšky do 9m. Listy jsou 3četné, vlastní lístky jsou zvlněné nebo vroubkované a dlouhé 3,5 - 6cm. Květy jsou hnědé až světle růžovofialové bez aroma. Plodem je světle růžovofialová bobule délky do 15cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. australis
- subsp. longisepala
- subsp. trifoliata (Akebie trojčetná pravá)

Akebia x pentaphylla (Akébie pětilistá)

oblasti: Massachusetts

Další informace:

<http://botany.cz/cs/akebia-quinata/>

<http://www.dreviny-okrasne.cz/listnace/akebie/akebia-quinata-3>

<http://www.garten.cz/e/cz/57-akebia-quinata-akebie-peticetna/>

<https://www.rostliny.net/>