

Brahea

čeleď: Arecaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest astronoma Tycha Brahe (1546 - 1601). Roste v Mexiku a střední Americe jako palma. Listy jsou dlanitě dělené. Květenstvím je lata, která může dosahovat větší délky než délka listů a vlastní květy jsou drobné.

Některé druhy snáší mírný mráz. Na půdu nejsou náročné, ale potřebují pravidelnou zálivku.

Množí se semeny.

Brahea aculeata

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika.

Brahea armata (Brahea ozbrojená)

oblasti: Kalifornský záliv

Roste v Kalifornském zálivu. Dorůstá výšky 6 - 10 (i 15)m a koruna může dosáhnout šířky 3 - 5m. Kmen je obalený odumřelými listy. Listy jsou dlanité, úkrojky modrozelené, dlouhé i více než 5m, široké 1 - 1,5 (i 2)m, spodní strana je sivozelená a řapíky jsou ostnité. Kvěst začíná po desítkách let, květenstvím je obloukovitá lata délky 4 - 6m, vlastní květy jsou oboupohlavné a běžovobílé. Plodem je tmavěhnědá vejčitá hnědě skvrnitá peckovice délky 1,5 - 2 (i 2,5)cm se sladkou lepivou jedlou dužinou.

Odolává teplotám do -10°C.

Brahea brandegeei

Brahea calcareo

oblasti: Guatemala, Mexiko

Pochází z Guatemaly a Mexika.

Brahea decumbens

Brahea dulcis

Brahea edulis

oblasti: Karibik

Pochází z mexického ostrova Guadalupe. Dorůstá výšky 4,5 - 13m. Dožívá i 150 let.

Brahea moorei

Brahea pimo

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika.

Brahea salvadorensis

Brahea sarukhanii

<https://www.rostliny.net/>