

Syringa (Šeřík)

čeleď: Oleaceae

Nejznámějším druhem je *S. vulgaris*.

Vyhovuje mu plné slunce, postačí i mírná zálivka. Zemina by měla být pokud možno vápenitá.

Množí se řízkováním, hřížením anebo odkopky.

Syringa afghanica

oblasti: Afganistán

Syringa debelderi

Syringa emodi (Šeřík himálajský)

Syringa josikaea (Šeřík karpatský)

oblasti: J Karpaty, Massachusetts, Pennsylvania, V Evropa

Pochází ze střední a východní Evropy. Listy na zimu opadají. Dorůstá výšky 2 - 4m. Listy vyrůstají vstřícně, mají eliptický tvar se zašpičatěním délky 6 - 12cm a zvlněným okrajem. Květy jsou tmavě růžové až do fialova. Plodem je hnědá tobolka s okřídlenými semeny.

Syringa komarowii (Šeřík Komarovův)

Keř dorůstá výšky 3 - 6m. Listy jsou oválné s protáhlým zašpičatěním. Délka dosahuje 5 - 19cm a šířka 2 - 7cm. Barva květů se pohybuje od růžové po světle fialovou. Kvete v hroznech. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. komarowii
- subsp. reflexa

Syringa mairei

Syringa meyeri (Šeřík Meyerův)

Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Kvete fialovými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Palibin' - zakrslý habitus; výška do 1m

Syringa microphylla (Šeřík malolistý)

oblasti: Čína

Pochází z Číny. Dorůstá výšky 1 - 2m. Vyznačuje se malými listy. Jsou dlouhé pouhý 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Superba' - výška do 2m, šířka 3m; květy růžovofialové

Využívá se pro bonsajové pěstování.

Syringa oblata (Šeřík širokolistý)

Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Betsy Ross'
- var. dilatata

Syringa pekinensis (Šeřík pekingský)

synonyma: S. reticulata

oblasti: Pennsylvania, S Japonsko

Pochází z východní Asie a severního Japonska. Roste v podobě malého opadavého stromu dorůstajícího výšky 12 - 15m s průměrem kmenu do 30 - 40cm. Listy mají eliptický tvar se špičatým zakončením. Délka se pohybuje v rozmezí 2,5 - 15cm a šířka 1 - 8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. amurensis - synonymum je S. reticulata var. mandschurica
- 'Copper Curls'
- 'Ivory Silk'
- subsp. pekinensis
- 'Presiden Lincoln'
- subsp. reticulata
- 'SunDak'

Syringa pinetorum

Syringa pinnatifolia

Syringa protolaciniata

Syringa pubescens (Šeřík pýřitý)

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. julianae
- subsp. microphylla
- subsp. patula/S. velutina/S. patula (Šeřík sametový)

- subsp. patula 'Miss Kim'

Syringa reflexa (Šeřík přepadavý)

Syringa reticulata (Šeřík síťnatý)

synonyma: Ligustrina amurensis

oblasti: Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont, Wyoming

Dorůstá výšky až 10m. Kvete bílými květy v latě. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. amurensis (Šeřík amurský)
- 'Ivory Silk'
- subsp. pekinensis
- subsp. reticulata

Syringa spontanea

Syringa sweginzowii (Šeřík Sweginzowův)

Syringa tibetica

oblasti: Xizang (Tibet)

Syringa tomentella

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. sweginzowii/S. sweginzowii/S. tetanoloba/S. tigerstedtii/S. wilsonii
- subsp. yunnanensis/S. yunnanensis/S. yunnanensis f. pubicalyx/S. yunnanensis var. pubicalyx

Syringa villosa (Šeřík chlupatý)

oblasti: Massachusetts

Syringa vulgaris (Šeřík obecný)

oblasti: Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jugoslávie, JV Evropa, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Malá Asie (Anatolie), Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Balkánského poloostrova, jihovýchodní Evropy a Malé Asie. Patří mezi opadavé rostliny. Keř dorůstá výšky 6 - 7m, šířky 10m a průměrem kmene do 20cm. Borka je šedohnědá, rozpukaná. Prostistojné listy má jednoduché, široce vejčitého tvaru se srdčitou bází, délka dosahuje 4 - 10 (i 12)cm a šířka 3 - 8cm. Kvete na starém dřevě. Květy mají fialkovou nebo bílou barvu, mají 4 okvětní lístky a příjemně voní. Často se v době květu trhají do vázy. Plodem je tobolka velikosti 1cm obsahující dvě okřídlená semena. Existuje velké množství vnitrodruhových taxonů, např.:

- 'Acubifolia'/'Acubaefolia' - listy žlutě kropenaté; květy fialové
- 'Admiral Farragut'
- 'Agincourt Beauty'
- 'Alice Harding'
- 'Alphonse Lavallee'
- 'Ami Schott'
- 'Andenken an Ludwig Spaeth'/'Andenken an Ludwig Späth' - květenství dlouhé až 30cm, květy tmavě růžovofialové
- 'Anna Nickels'
- 'Anne Schiach'
- 'Aucubaefolia'
- 'Belle de Nancy' - dlouhá lata
- 'Boussingault'
- 'Candeur'
- 'Capitaine Perrault'
- 'Cavour'
- 'Charles Joly' - vzpřímený keřovitý strom, menší lata
- 'Chmurka'
- 'Christophe Colomb'
- 'Danton'
- 'De Louvain'
- 'De Saussure'
- 'Decaisne' - bohatě kvetoucí, namodralé květy, silná vůně
- 'Diderot'
- 'Doctor Brethour'
- 'Dr.Charles Jacobs'
- 'Dr.Maillot'
- 'Dresden China'
- 'Dusk'
- 'Edith Cavell'
- 'Edouard Andre'
- 'Emile Lemoine'
- 'Excellent'
- 'Firmament'
- 'Flora'
- 'Fran Wilhelm Pfitzer'
- 'Frank Patterson'
- 'Fred Payne'
- 'Furst Bulow'
- 'G. J. Baardse' - velká hustá lata, sladká vůně
- 'General Pershing'
- 'Georges Claude'
- 'Gilbert'
- 'Glory'
- 'Grace Orthwaite'

- 'Helene Agathe Keesen'
- 'Henri Robert'
- 'Hippolyte Maringer'
- 'Hugo Koster'
- 'Hugo Mayer'
- 'Hyazinthenlieder'
- 'J. R. Koning'
- 'Jan van Tol'
- 'Jeanne d'Arc'
- 'Jessie Gardner'
- 'Jonkheer G.P.van Tets'
- 'Jules Simon'
- 'Karel Hynek Mácha'
- 'Katherine Havemeyer' - nízký strom, růžovofialové květy
- 'Kingsville'
- 'Krasavitsa Moskvý'
- 'Lady Lindsay'
- 'Laplace'
- 'Lucie Baltet'
- 'Madame Florent Stepman'
- 'Madame Charles Souchet'
- 'Madame Rosel'
- 'Marceau'
- 'Marechal Lannes'
- 'Martha'
- 'Maximowicz'
- 'Michel Buchner'
- 'Mildred Luetta'
- 'Milton'
- 'Miss Ellen Willmott' - bílé květy, nesymetrická lata
- 'Mme Abel Chatenay'
- 'Mme Casimir Perier'
- 'Mme Felix'
- 'Mme Lemoine'
- 'Monge'
- 'Montaigne'
- 'Mood Indigo'
- 'Mrs W.E. Marshall' - slézovitě zbarvené květy, vzpřímená lata
- 'Night'
- 'Oliver de Serres' - namodralé květy, bohatá lata
- 'Paul Deschanel' - vzpřímený strom, slabá vůně
- 'Peerless Pink'
- 'President Fallieres'
- 'Primrose' - žluté květy, slabá nepříjemná vůně
- 'Prince Wolkonsky'
- 'Prinses Beatrix'
- 'Prodige'
- 'Purple Glory'
- 'Riet Bruidegom'
- 'Rochester'
- 'Ruhm von Hosenstein' - růžovofialové květy, intenzivní vůně
- 'Rustica' - hustá lata, růžové květy, lehká vůně
- 'Saint Joan'

- 'Sensation' - fialové květy s bílým okrajem, slabá nepříjemná vůně
- 'Stefan Makowiecki'
- 'Sweethert' - květy plnokvěté, světle růžové, poupata tmavěružová
- 'Thunberg'
- 'Vesuve'
- 'Violetta'
- 'Voorzitter Dix'

Je mrazuvzdorný, odolný na sucho i znečištěný vzduch a vyskytuje se na plném slunci, v neutrálních až zásaditých půdách bohatých na živiny, ale i v kamenitých stráních. Naopak mu nevyhovují mokré nebo kyselé půdy a stín. Dobře snáší řez. Počítejte s tím, že na zahradě bude potřebovat větší prostor se šířkou 2m i více. Staré kultivary se rozrůstají kořenovými odnožemi, nové kultivary již tuto vlastnost obvykle nemají. Odstraněním odkvetlých květů zachováte rostlině více síly na další sezónu.

Množí se odnožemi, zelenými řízkami nebo hřížením.

Syringa wardii

Syringa wolfii (Šeřík Wolfův)

oblasti: Korea, SV Čína, V Čína

Pochází z Koreje a Mandžuska. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky do 6m. Kvete prakticky bílými květy, poupata jsou růžová.

Syringa x chinensis (Šeřík čínský)

synonyma: *S. x chinensis*, *S. x chinensis* f. *alba*, *S. x chinensis* f. *bicolor*, *S. x chinensis* f. *saugeana*, *S. x chinensis* var. *dubia*

oblasti: Česká republika, Čína

Kříženec *S. vulgaris* a *S. persica*. Dorůstá výšky 3 - 5m. Větve vyrůstají do oblouku. Listy mají vejčitékopinatý tvar s klínovitou bází. Celková délka dosahuje 4 - 8cm. Kvete růžovofialovými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Saugeana'

Syringa x henryi (Šeřík Henryův)

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

Syringa x hyacinthiflora

Syringa x josiflexa

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Bellicent'

Syringa x nanceiana

Syringa x persica (Šeřík perský)

oblasti: Connecticut, Delaware, Írán, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota

Syringa x prestoniae (Šeřík Prestonové)

Kříženec *S. reflexa* a *S. villosa*. Kvete červenofialovými dlouze trubkovitými květy v hroznu.

Syringa x swegiflexa

Syringa yunnanensis

oblasti: Yunnan

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K544.php>

<http://botany.cz/cs/syringa-vulgaris/>

<http://fyzika.ft.utb.cz/podzamka/karta.php?id=175>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/syringa/>

<http://www.dreviny-okrasne.cz/listnace/serik/syringa-meyeri>

<https://www.rostliny.net/>