Howea (Kencie)

synonyma: Howeia

čeleď: Arecaceae

Rod byl pojmenován po Lordu Howe a roste pouze na Ostrově Lorda Howea. Kmen je slabý, hladký a kroužkovaný. Listy jsou obloukovité, zpeřené, s dlouhým holým řapíkem. Květenství je dlouhé, latnaté, převislé, vlastní květy jsou malé a masité. Plody jsou malé a červené.

Růst je pomalý. Jsou málo náročné na pravidelný režim zalévání, teploty i světlo, vyhovuje ji dobře propustná vlhká půda i vzduch a polostín.

Množí se semeny.

Howea belmoreana

synonyma: Grisebachia belmoreana, Kentia belmoreana

oblasti: JV Austrálie, Tichý oceán

Pochází Norfolku a Ostrovu Lorda Howea. Je vzrůstnější s menším počtem listů než H. forsteriana. Dorůstá výšky do 8m a šířky 2 - 3m. Kmen je nevětvený, vzpřímený a kroužkovaný. Listy jsou zpětně zahnuté a zelené. Vytváří 3 - 5 (i 8) latnatých květenství vyrůstajících ze společné báze. Plody jsou hnědé až červené.

Howea forsteriana

synonyma: Denea forsteriana, Grisebachia forsteriana, Kentia australis, Kentia forsteriana

oblasti: Karibik, Tichý oceán, V Austrálie

Roste na Ostrově Lorda Howea a na Norfolku. Dorůstá výšky 3 (i 10)m a šířky 6m. Listy jsou ploché, dělené na špičaté úkrojky.

Má ráda hodně světla, ne však přímé slunce. Zeminu udržujte stále vlhkou, ne však přemokřenou, měla by obsahovat hodně živin, zároveň by měla být lehká, používejte například směs kompostu, rašeliny a písku. Při přezimování by teplota neměla klesnout pod 18°C, snáší však až 10°C (a krátkodobě několik hodin i -5°C). Standardní letní teplota by měla být 18 - 25°C. Hnojit můžete zhruba 2x měsíčně speciálním hnojivem pro palmy nebo vícesložkovým tekutým hnojivem pro pokojové rostliny. Při pěstování dávejte pozor na napadení mšicemi.

Množíme semeny při teplotě 25 - 30°C.

https://www.rostliny.net/