

Davallia (Davalie)

synonyma: Parestia, Stenolobus, Wibelia

čeleď: Davalliaceae

Roste zejména v tropech, dále i subtropech a mírném pásu jako kapradina, často epifytická. Vytváří dlouhý plazivý nadzemní oddenek, zpravidla s hnědobronzovými ochlupenými šupinami. Listy jsou zpeřené, nejčastěji 3x a u některých druhů mohou být opadavé. Na koncích se tvoří pohárkovité výtrusnice.

Vyhovuje jim světlé místo bez přímého slunce nebo polostín. Dále pokojová teplota, v zimě s poklesem k 10°C, vysoká vzdušná vlhkost a rosení. Substrát se udržuje stále vlhký, nikdy nesmí vyschnout.

Množí se nejčastěji dělením a řízky z oddenků.

Davallia amabilis

Davallia assamica

synonyma: Acrophorus assamicus, D. micans, Humata assamica, Humata micans, Leucostegia assamica

Davallia austrosinica

Davallia brevisora

Davallia bullata

oblasti: Čína, Japonsko, JV Asie, Makaronésie

Pochází z Japonska, Číny, Azorských ostrovů a tropické Asie. Má šupinovitý povrch oddenků. Délka zpeřených listů dosahuje 30cm. Konečky listů jsou měchýřkovitě ztlustlé.

Potřebuje vzdušnou vlhkost vyšší než 50%.

Davallia canariensis (Davalie kanárská)

synonyma: Trichomanes canariense

oblasti: Andalusie, Makaronésie, Maroko, Pyreneje, S Afrika

Roste na Kanárských ostrovech, jihozápadní Evropě a v severní Africe v podobě stálezelené nebo 1/2opadavé epifytické kapradiny. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Je charakteristická vyrůstáním

chlupatých šupinatých oddenků ven z květináče, což je normální stav, není to signál k přesazení. Listy jsou 3x zpeřené, tmavě zelené, dlouhé do 50cm a lístky jsou na okrajích laločnaté.

Potřebuje humózní zem, nejlépe rašelinovou bez hnojení. Substrát udržujte stále mírně vlhký. Pravidelně ji roste a to včetně kořenů. Potřebuje dostatek světla (ne přímé sluneční) nebo polostín, na zimu teplotu snižte třeba až na úroveň blížící se k bodu mrazu, ale ideální je 15°C.

Množí se dělením oddenků.

Davallia chrysanthemifolia

synonyma: Humata chrysanthemifolia, Humata macrostegia, Pachypleuria macrostegia

Davallia cylindrica

Davallia denticulata

synonyma: Adiantum denticulatum, D. chaerophylloides, D. denticulata var. intermedia, D. dissecta, D. elegans, D. schnellii, D. vogelii, Humata chaerophylloides, Humata elegans, Parestia elegans, Trichomanes chaerophylloides, Trichomanes denticulatum, Trichomanes elegans

oblasti: Queensland, Tichý oceán

Roste na Vánočním ostrově a v Queenslandu.

Davallia divaricata

synonyma: D. polyantha

oblasti: JV Asie

Pochází z tropické Asie.

Davallia fejeensis (Davalie Fejeensova)

synonyma: D. fijiensis

oblasti: Austrálie, Melanésie, Tichý oceán

Roste na Fidži a v Austrálii v podobě epifytické stálezelené kapradiny. Oddenky jsou pokryté tmavěhnědými ochlupenými šupinami. Listy jsou zelené, obrysem 3úhlé, jemně zpeřené a zpravidla delší než 1m.

Davallia griffithiana

synonyma: Humata griffithiana, Leucostegia griffithiana

Davallia henryana

synonyma: Humata henryana

Davallia heterophylla

synonyma: Humata heterophylla

Davallia lobata

Davallia mariesii (Davalie Mariesova)

synonyma: D. stenolepis

oblasti: Iberský poloostrov, Japonsko, Korea, Makaronésie, Malajsie, Maroko, Tchaj-wan, Tichý oceán

Roste v tropické Asii a Malajsii v podobě opadavé epifytické kapradiny. Vytváří oddenky o tloušťce do 1,5cm s hnědými šupinami. Listy mají 3úhlý obrys s řapíkem přibližně o stejné délce jako čepel, čepel je 3 - 4x zpeřená, dlouhá 12 - 50cm, široká 10 - 30cm a úkrojky jsou vejčité až kopinaté.

Vyhovují ji vlhká stinná místa na kmenech i skalách či vlhkých zdech na rozptýleném světle. Ideální letní teplota je 21°C, v zimě 15°C. Na zálivku se používá dešťová měkká voda. 2x týdně rosíme, protože špatně snáší suchý vzduch. Sází se do lehkého substrátu s mírně kyselým pH.

Množí se dělením nebo řízkováním oddenků.

Davallia pectinata

synonyma: D. parallela, Humata gaimardiana, Humata parallela, Humata pectinata, Nephrodium gaimardiana

Davallia platylepis

synonyma: Humata platylepis

Davallia pyxidata

oblasti: V Austrálii

Roste v Austrálii v podobě epifytické kapradiny. Vytváří trsy plazivých oddenků s hnědými šupinami. Listy jsou 3 - 4x zpeřené, tmavě zelené a dlouhé až 1m.

Davallia repens (Davalie plazivá)

synonyma: Adiantum repens, D. pedata, Humata pedata, Humata repens, Pachypleuria repens

oblasti: Austrálie, Filipíny, Indie, Japonsko, Madagaskar, Tichý oceán, Tropická Afrika

Roste v tropické Africe, Madagaskaru, Seychelských ostrovech, Maskarénách, Indii, Japonsku, Filipínách, Austrálii a v Tichém oceánu.

Davallia sinensis

synonyma: D. solida var. sinensis

Davallia solida (Davalie pevná)

oblasti: Malajsie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tichý oceán, Viktorie

Roste v Malajsii, Polynésii a Austrálii. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. fejeensis - endemit Fidži
- var. pycnidata
- var. solida

Davallia subsolida

synonyma: D. solida

Davallia teyermannii

synonyma: Humata griffithiana var. tyermannii, Humata tyermannii

Davallia trichomanoides

synonyma: D. dissecta

oblasti: Malajsie, Queensland

Roste v Malajsii v podobě epifytní opadavé kapradiny. Oddenky jsou žlutohnědé a ochlupené. Listy jsou lesklé, zelené, jemně zpeřené a dlouhé 40cm.

Vyhovují ji deštné pralesy.

Davallia truncata

Davallia tyermanni (Davalie Tyemannova)

oblasti: Čína

Roste v Číně.

Davallia vestita

synonyma: Humata kinabaluensis, Humata vestita

Davallia villosa

Další informace:

<http://mechy-kapradiny.atlasrostlin.cz/davale>

<http://www.celysvet.cz/davallie.php>

