

Microlepia (Šupinovka)

čeleď: Dennstaedtiaceae

Pochází z tropů Afriky a Asie. Dorůstá do výšky 0,5m. Vyznačuje se jemnými listy.

Vydrží na světle (ne přímém slunci) nebo v polostínu. Důležitá je vysoká vzdušná vlhkost a nevysychající půda (v létě bohatá zálivka). Jsou také náročně na výživu a proto je musíme každý týden hnojit.

Množí se výtrusy nebo dělením trsů.

Microlepia ampla

Microlepia angustipinna

Microlepia aspidioides

Microlepia attenuata

Microlepia calvescens

Microlepia caudifolia

Microlepia caudiformis

Microlepia caudipinnata

Microlepia chingii

Microlepia chrysocarpa

Microlepia communis

Microlepia crassa

Microlepia crenata

Microlepidia crenatoserrata

Microlepidia critica

Microlepidia firma

Microlepidia flaccida

Microlepidia formosana

Microlepidia fujianensis

Microlepidia ganlanbaensis

Microlepidia gigantea

Microlepidia glabra

Microlepidia hainanensis

Microlepidia hancei

Microlepidia herbacea

Microlepidia hirsuta

Microlepidia hirta

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie.

Microlepidia hispida

Microlepidia hookeriana

Microlepidia intermedia

Microlepidia jamaicensis

Microlepidia japonica

Microlepidia kansuensis

Microlepidia khasiyana

Microlepidia kurzii

Microlepidia kwangtungensis

Microlepidia lofoushanensis

Microlepidia longipilosa

Microlepidia madagascariensis

Microlepidia marginalis

Microlepidia marginata (Mikrolepidie okrajová)

Microlepidia matthewii

Microlepidia mauiensis

oblasti: Havajské ostrovy

Microlepidia medogensis

Microlepidia membranacea

Microlepidia modesta

Microlepia mollifolia

Microlepia neostrigosa

Microlepia obtusiloba

Microlepia omeiensis

Microlepia pallida

Microlepia paucipinnata

Microlepia phanerophlebia

Microlepia pilosissima

Microlepia pingpienensis

Microlepia pinnata

Microlepia platyphylla (Šupinovka širolistá)

Microlepia polypodioides

Microlepia pseudostrigosa

Microlepia puberula

Microlepia scabra

Microlepia scyphoformis

Microlepia setosa (Mikrolepije osinatá)

oblasti: Indie, Srí Lanka

Roste v Indii a Srí Lance.

Microlepia singpienensis

Microlepia sinostrigosa

Microlepia speluncae (Šupinovka jeskynní)

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z tropických oblastí. Světlezelené 2 - 4x zpeřené listy jsou velice jemné. Dorůstají v přírodě délky až 2m. Listy mají trojúhelníkový tvar.

Potřebuje minimálně 60% vlhkost vzduchu. Proto je důležité pravidelné rosení a to dešťovou vodou. I substrát by měl být stále vlhký a propustný. Nikdy jej nenechte vyschnout. Navíc potřebuje velké množství živin. Ideální je používání hravského hnoje nebo v případě nouze rozpustným hnojivem. Minimální teplota (včetně zimy) je 15°C.

Microlepia straminea

Microlepia strigosa (Šupinovka hřebílečnatá)

oblasti: Havajské ostrovy

Je menšího vzrůstu. Listy jsou 2 - 3x zpeřené.

Microlepia subrhomboidea

Microlepia subspeluncae

Microlepia substrigosa

Microlepia subtrichosticha

Microlepia szechuanica

Microlepia taiwaniana

Microlepia tenella

Microlepia tenera

Microlepia trapeziformis

Microlepia trichocarpa

Microlepia trichoclada

Microlepia trichosora

Microlepia tripinnata

Microlepia villosa

Microlepia wentongensis

Microlepia x adulteriana

oblasti: Havajské ostrovy

Microlepia yunnanensis

Další informace:

<http://mechy-kapradiny.atlasrostlin.cz/supinovka>

http://rostliny.wz.cz/pages/kapradiny/vypis_stranky.php?id=8

<https://www.rostliny.net/>