

Daphne mezereum (Lýkovec jedovatý)

synonyma: *Daphne albiflora*, *Daphne florida*, *Daphne houtteana*, *Daphne lateriflora*, *Daphne liottardi*, *D. var. albaplena*, *D. var. albida*, *D. var. album*, *D. var. rubrum*, *Mezereum officinarum*, *Thymelaea mezereum*, *Thymelaea praecox*

čeleď: Thymelaeaceae

oblasti: Aljaška, Anglie, Apeniny, Bajkal, Connecticut, Česká republika, Finsko, Írán, Jugoslávie, Katalánsko, Kavkaz, Maďarsko, Maine, Malá Asie (Anatolie), Massachusetts, Montana, Německo, New Hampshire, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Polsko, Quebec, Rakousko, Rhode Island, Slovensko, Střední Rusko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ural, Vermont, Z Čína, Z Rusko, Z Sibiř

Roste od Evropy po Ural v podobě vzpřímeného opadavého krátkověkého keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1,5 (i 2)m. Kůra je sraštělá. Větve vyrůstají téměř vertikálně vzhůru, jsou dobře ohebné, v mládí hnědozelené a ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou střídavé, brvité, úzce kopinaté až dlouze obvejčité či obkopinaté, tmavězelené, našedlé, krátce řapíkaté, dlouhé do 6 - 10cm, široké 1 - 2cm, báze klínovitá. Kvete max. 1cm růžovými, červenými nebo červenofialovými květy ve svazcích po 2 - 3 (i 5)ks ještě před listy s velikostí 0,5 - 1cm, jsou aromatické, trubkovité, se 4mi kališními cípy (korunní lístky chybí). Plodem je červená jedovatá vejčitá až kulatá dužnatá peckovice velikosti 5 - 8mm. Patří mezi chráněné druhy C4. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba'/f. alba - květy bílé
- 'Autumnalis' - kvete v zimě
- 'Grandiflora' - výška až 2m
- subsp. *rechingeri*/D. *rechingeri*
- 'Rubra' - květy fialově červené
- 'Riby Glowe' - květy fialově červené

Vyhovuje mu mírně kyselá až zásaditá stále mírně vlhká hlinitá až písčité půda bohatá na živiny a polostín především v listnatých nebo smíšených lesích. Na slunci je bohatěji větvený až bochníkovitý. Snáší mrazy až do -35°C.

Množí se hřížením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>