

Sinningia (Gloxínie)

čeleď: Gesneriaceae

Rod byl pojmenován podle univerzitního zahradníka Wilhelma Sinninga (1794 - 1874). Pochází ze střední a Jižní Ameriky, především z Brazílie. Patří mezi velmi efektní hrnkové rostliny a způsobem pěstování i způsobem růstu se podobají fialkám. Mělce pod zemí až mírně nad zemí vytvářejí zploštělou kulovitou hlízu. Na rozdíl od nich ale mají protáhlejší listy, ale jsou stejně chlupaté, plastické a barevné. Tvar květu je ovšem odlišný, trubkovitý až zvonkovitý, tvoří jej velký kalich na konci roztažený do velmi efektních barevných 5ti korunních lístků v barvě červené, oranžové, nažloutlé, růžovofialové, nazelenalé nebo bílé, občas se skvrnami. Opyluje je zpravidla kolibříci. Délka květonosné lodyhy může dosáhnout 15 - 20cm. Plodem je tobolka.

Vyhovuje jí světlé místo (bez přímého slunce), pokojová teplota 18 - 22°C. Substrát udržujte stále mírně vlhký zálivkou do podmisky vodou o pokojové teplotě. Měl by být lehký, vzdušný, mírně kyselý a vybavený výbornou drenáží. Líbí se ji také vyšší vzdušná vlhkost. Na podzim listy odumírají. V tomto okamžiku zastavte zálivku a rostlinu přemístěte na chladné nebo i temné místo s min. teplotou 10°C. Na jaře postupně obnovte zálivku. Hnojí se každý týden hnojivy pro kvetoucí pokojové rostliny.

Množí se semeny, listovými řízkami z mladých listů (využijeme vlhký říční písek zakrytý sklem, teplota 22°C, světlé místo bez přímého slunce) nebo dělením hlíz.

Sinningia aggregata (Sinningie shloučená)

synonyma: Rechsteineria aggregata

oblasti: Brazílie, Paraguay

Pochází z Brazílie a Paraguaye. Patří mezi sukulenty. Kvete úzkými dlouhými trubkovitými květy oranžové barvy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Pendulina'

Sinningia aghensis

Sinningia allagophylla

synonyma: Corytholoma allagophyllum, Gesneria allagophylla, Gesneria betonicifolia, Gesneria clauseniana, Gesneria flacourtifolia, Gesneria grandis, Gesneria nitida, Gesneria palustris, Gesneria paluviensis, Gesneria pulchella, Rechsteineria allagophylla, Rechsteineria clausenii, Rechsteineria montevidensis

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Sinningia amambayensis

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia araneosa

synonyma: *Corytholoma pusillum*, *Rechsteineria pusilla*

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Sinningia barbata

Sinningia brasiliensis

synonyma: *Lietzia brasiliensis*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia bulbosa

synonyma: *Corytholoma bulbosum*, *Rechsteineria bulbosa*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia calcaria

synonyma: *Rechsteineria calcaria*, *Rechsteineria calcaria f. macrophylla*, *Rechsteineria oligantha*

Sinningia canescens

synonyma: *Rechsteineria canescens*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia carangolensis

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia cardinalis

synonyma: *Corytholoma cardinale*, *Dircea cardinalis*, *Dircea lobulata*, *Gesneria cardinalis*,
Gesneria lateritia, *Gesneria macrantha*, *Rechsteineria cardinalis*

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Patří mezi sukulenty.

Sinningia carolinae

synonyma: *Tapeinotes carolinae*, *Tapina carolinae*

Sinningia cochlearis

synonyma: *Gesneria cochlearis*, *Rechsteineria cochlearis*

Sinningia concinna

synonyma: *Ligeria concinna*, *Stenogastra concinna*

Sinningia conspicua

synonyma: *Rosanowia conspicua*, *S. caulinia*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia cooperi

synonyma: *Corytholoma cooperi*, *Rechsteineria cooperi*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia curtiflora

synonyma: *Rechsteineria curtiflora*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia defoliata

synonyma: *Rechsteineria defoliata*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia discolor

synonyma: Ligeria discolor

Sinningia douglasii (Sinningie Douglasova)

synonyma: Rechsteineria confertifolia, Rechsteineria douglasii, Rechsteineria polyantha

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii. V době sucha přežívá pouze hlíza, ostatní části odumírají.

Sinningia elatior

synonyma: Corytholoma elatius, Corytholoma igneum, Corytholoma igneum var. villosum, Corytholoma strictum, Gesneria elatior, Gesneria stricta, Isoloma elatior, Rechsteineria elatior, Rechsteineria ignea, Rechsteineria ignea var. anomala, Rechsteineria ignea var. loefgrenii, Rechsteineria ignea var. villosa, Rechsteineria sceptroides, Rechsteineria sceptrum var. rubra, Rechsteineria stachydifolia, Rechsteineria stricta, Rechsteineria stricta var. parvifolia, Rechsteineria tenera, S. stricta

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia eumorpha

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kvete bílými květy.

Sinningia gesneriifolia

synonyma: Ligeria gesnerifolia

Sinningia gigantifolia

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia glazioviana

synonyma: Corytholoma glaziovianum, Rechsteineria glazioviana

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia guttata

synonyma: *Gloxinia guttata*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia harleyi

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia hatschbachii

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia helleri

synonyma: *Gloxinia helleri*, *Gloxinia schottii*

Sinningia iarae

oblasti: J Brazílie

Roste v Brazílii. Listy jsou tmavězelené, na okraji světlé, vroubkované, vejčité, špičaté a na bázi srdčité. Kvete dlouze trubkovitými růžovofialovými květy.

Sinningia incarnata

synonyma: *Besleria incarnata*, *Corytholoma caracasanum*, *Corytholoma ellipticum*, *Corytholoma gracile*, *Corytholoma rutilum*, *Corytholoma warszewiczii*, *Corytholoma warszewiczii*, *Fimbrolina incarnata*, *Gesnera eggersii*, *Gesnera lehmannii*, *Gesneria aurantiaca*, *Gesneria caracasana*, *Gesneria chelonoides*, *Gesneria coccinea*, *Gesneria elliptica*, *Gesneria elliptica* var. *lutea*, *Gesneria erubescens*, *Gesneria flavescens*, *Gesneria fragilis*, *Gesneria gollmeriana*, *Gesneria gracilis*, *Gesneria guianensis*, *Gesneria lindeniana*, *Gesneria punctata*, *Gesneria rutila*, *Gesneria sceptroides*, *Gesneria schomburgkiana*, *Gesneria stachydifolia*, *Gesneria vargasii*, *Gesneria warszewiczii*, *Rechsteineria aurantiaca*, *Rechsteineria caracasana*, *Rechsteineria chelonoides*, *Rechsteineria elliptica*, *Rechsteineria erubescens*, *Rechsteineria flavescens*, *Rechsteineria gollmeriana*, *Rechsteineria incarnata*, *Rechsteineria rutila*, *Rechsteineria schomburgkiana*, *Rechsteineria vargasii*, *Rechsteineria warczewiczii*, *S. schomburgkiana*, *S. warszewiczii*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia insularis

synonyma: *Rechsteineria insularis*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia kautskyi

Sinningia lateritia

synonyma: Rechsteineria lateritia

Sinningia latifolia

Sinningia leopoldii

synonyma: Rechsteineria leopoldii, Rechsteineria oligantha f. rupestris

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia leucotricha

synonyma: Rechsteineria leucotricha

oblasti: J Brazílie

Pochází z Brazílie. Patří k sukulentním rostlinám. Pod zemí vytváří hlízu. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)cm. Listy mají výrazně plstnatý povrch z bílých chloupců, jsou kopinaté a seskupené do přeslenů. Kvete dlouhými trubkovými červenými květy o délce 3 - 5cm.

Vyhovuje jí rozptýlené světlo a střední zálivku. Zaléváme ale vždy až po proschnutí substrátu. Hnojí se 1x za 14 dní. Přezimuje při teplotě 10 - 15°C.

Sinningia lindleyi

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia lineata

synonyma: Rechsteineria lineata

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia macrophylla

synonyma: *Gloxinia macrophylla*, *Ligeria macrophylla*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia macropoda

synonyma: *Rechsteineria cyclophylla*, *Rechsteineria macropoda*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia macrorrhiza

synonyma: *Rechsteineria macrorrhiza*

Sinningia macrostachya

synonyma: *Rechsteineria latifolia*, *Rechsteineria macrostachya*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Vytváří hlízu, jejíž průměr může dosáhnout až 1m.

Sinningia magnifica (Sinningie nádherná)

synonyma: *Rechsteineria magnifica*

oblasti: Rio de Janeiro

Pochází z Brazílie.

Sinningia mauroana

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia maximiliana

synonyma: *Ligeria maximiliana*

Sinningia micans

synonyma: *Corytholoma micans*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia nivalis

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia nordestina

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia piresiana

synonyma: Rechsteineria piresiana

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia polyantha

synonyma: Corytholoma discolor, Gesneria discolor, Gesneria polyantha, Rechsteineria discolor

Sinningia pusilla (Gloxínie maličká)

synonyma: Ligeria pusilla, Tapeinotes pusilla, Tapina pusilla

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Kvete dlouhými tenkými fialovými trubkovitými kvítky.

Sinningia regina (Gloxínie královská)

Spodní strana listu je tmavě červená s bílými žilkami. Kvete purpurovými květy.

Sinningia reitzii

synonyma: Rechsteineria reitzii

Sinningia richii

Sinningia rupicola

synonyma: Rechsteineria rupicola

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia sceptrum

synonyma: Rechsteineria sceptrum

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia schiffneri

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia sellovii

synonyma: Rechsteineria ramboi, Rechsteineria sellovii

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia speciosa (Gloxínie nádherná)

synonyma: Gloxinia caulescens, Gloxinia discolor, Gloxinia diversiflora, Gloxinia fyfiana, Gloxinia immaculata, Gloxinia maxima, Gloxinia menziesiana, Gloxinia merkii, Gloxinia passinghamii, Gloxinia rubra, Gloxinia speciosa, Gloxinia speciosa var. albiflora, Gloxinia speciosa var. candida, Gloxinia speciosa var. lactea, Gloxinia speciosa var. macrophylla, Gloxinia speciosa var. menziesii, Gloxinia teuchleri, Ligeria caulescens, Ligeria menziesiana, Ligeria speciosa, Ligeria speciosa var. caulescens, S. menziesiana

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Listy jsou široce eliptické, srdčité, vroubkované, na horní straně s kresbou a spodní strana je růžovofialová. Barva květů může být růžovofialová, světlefialová, bílá, červená až růžovočervená. Existují různobarevné odrůdy. Některé z nich dokáží vytvořit květy s až 14cm v průměru. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Carangola'
- 'Paschia'
- 'Regina'

Vyhovuje ji světlé místo bez přímého slunce a průvanu a teploty kolem 18°C. Substrát udržujte stále mírně vlhký. Používejte vodu o pokojové teplotě a zálivku provádějte do podmiský. Na podzim po odumření listů zálivku zcela zastavte a přemístěte ji na chladné místo až do jarního vyrašení.

Množí se semeny, řízky nebo dělením hlíz na jaře.

Sinningia striata

synonyma: Corytholoma striatum, Rechsteineria striata

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia sulcata

synonyma: Rechsteineria sulcata

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia tribracteata

synonyma: Rechsteineria tribracteata

Sinningia tuberosa

synonyma: Rechsteineria tuberosa

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia tubiflora

Kvete dlouhými trubkovitými bílými květy krátce se rozvíjejícími na konci. Opylují ji netopýři.

Sinningia valsuganensis

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia verticillata

synonyma: Orobanche verticillata, Rechsteineria verticillata

Sinningia villosa

Sinningia warmingii

synonyma: Corytholoma multiflorum, Corytholoma sceptrum var. arenosa, Corytholoma warmingii, Gesneria rutila var. atrosanguinea, Gesneria warmingii, Rechsteineria atrosanguinea, Rechsteineria lindleyi, Rechsteineria lindleyi var. macrophylla, Rechsteineria multiflora, Rechsteineria peruviana, Rechsteineria schlickmannii, Rechsteineria stenantha, Rechsteineria warmingii, Rechsteineria weberbaueri, S. claybergiana

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Sinningia x cerina

Sinningia x ornata

synonyma: Rosanowia x ornata

Sinningia x rosea

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/gloxinie-sinningia-speciosa/>

<http://pokojove-rostliny.atlasrostlin.cz/gloxinie>

<http://www.celysvet.cz/gloxinie.php>

<http://www.garten.cz/a/cz/5093-sinningia-speciosa-gloxinie-nadherna/>

<http://www.zelenelisty.estranky.cz/clanky/werbar---sukulent/sinningia-aggregata>

<http://www.zelenelisty.estranky.cz/clanky/werbar---sukulent/sinningia-leucotricha>

<https://www.rostliny.net/>