

Lamium amplexicaule (Hluchavka objímavá)

synonyma: Galeobdolon amplexicaule, Lamiella amplexicaulis, Lamiopsis amplexicaulis, L. subsp. mauritanicum, L. var. albiflorum, L. var. album, L. var. arenicola, L. var. breviflorum, L. var. calyciflorum, L. var. clandestinum, L. var. cryptanthum, Lamium lassithiense, Lamium mauritanicum, Lamium mesogaeon, Lamium rumelicum, Lamium stepposum, Pollichia amplexicaulis

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická Republika (JAR), Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Labrador, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Čína, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Evropě, západní Asii a severní Africe jako vzpřímená nebo vystoupatavá jednoletka, jinde je zavlečená. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 40 (i 55)cm. Stonek bývá od báze větvený. Listeny jsou poloobjímavé a v obrysu ledvinité. Listy jsou vstřícné, vejčité, vroubkované, v horní části jsou objímavé a kulaté o průměru 0,8 - 2 (i 3)cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 4 (i 6,5)cm, u bazálních až 10 - 20cm. Květenství tvoří 1 - 5 až 16 květových lichopřeslenů, listence chybějí, vlastní květy mají délku 1,5 - 2cm, kalich je úzce trubkovitý, ochlupený, dlouhý (3 -) 4 - 7 (i 9)mm, zuby jsou úzce 3úhlé, délky trubky, koruna je růžovofialová až růžová (i bílá), dlouhá (1,2 -) 1,5 - 2 (i 2,5)cm, trubka je uvnitř holá, dlouhá 0,9 - 1,6 (i 2)cm, horní pysk je ochlupený a spodní kratší. Plodem je hnědá zakulacená tvrdka délky 2 - 2,5mm a šířky 1 - 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. allepicum
- var. incisum
- var. orientale

Vyhovuje ji teplo, rumiště, vinice, suché trávníky, atp. Nesnáší vápno.

<https://www.rostliny.net/>