

# Cymbidium (Člunatec)

čeleď: Orchidaceae

Roste v Austrálii, subtropické a tropické Asie v podobě stálezelené terestrické orchideje. Dorůstá výšky 60 - 90cm. Úzké mečovité obloukovité listy vyrůstají z pahlíz ve 2 řadách. Květenství je až 30tkvěté, vzpřímené, obloukovité nebo převislé, vlastní květy mají průměr 5 - 10cm, barvu v kombinacích zelené, žluté, bílé, růžové, červené nebo hnědé a zpravidla se skvrnitým spodním pyskem. Kvete na podzim a v zimě. Existuje nespočetné množství hybridů.

Mezi orchidejemi patří k jednodušším rodům na pěstování. Pro bohaté kvetení je důležité dodržet alespoň 5°C rozdíl mezi dnem a nocí. Potřebují světlé místo bez přímého poledního slunce, bohatou zálivku (kořeny nesmí být trvale ve vodě, využívejte výhradně měkkou nejlépe dešťovou vodu o pokojové teplotě). Dobré je také rosit listy. Po odkvětu snižte teplotu i zálivku a nechte rostlinu odpočívat. Přesazuje se až v okamžiku, kdy se kořeny nevejdou do květináče, vždy však až po odkvětu. Je vhodná pro letnění, na slunce si však musejí pomalu zvykat nejlépe v polostínu. V okamžiku, kdy teploty začnou klesat pod 10°C, rostlinu přemístěte domů. Hnojí se speciálními hnojivy pro orchideje. Jako substrát používáme směs hrubé borové kůry, polystyrenu, molitanu, suchého rašeliníku, keramzitu, atp.

## Cymbidium acuminatum

synonyma: *C. ensifolium* subsp. *acuminatum*

## Cymbidium aestivum

oblasti: J Čína, Střední Čína

Roste v Číně.

## Cymbidium aliciae

synonyma: *C. cyperifolium* var. *aliciae*

oblasti: Filipíny

Pochází z Filipín.

## Cymbidium aloifolium

synonyma: *Aerides borassii*, *C. erectum*, *C. intermedium*, *C. pendulum*, *C. simulans*, *Epidendrum aloides*, *Epidendrum aloifolium*, *Epidendrum pendulum*

oblasti: Himálaj, J Čína, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste od Himálají po Malajsii jako epifyt. Pahlízy jsou zakrznělé. Řemenové tuhé listy dosahují délky až 40cm. Kvete v až 50cm květenství.

Vyhovuje jim substrát pro epifyty nebo přímo umístění na kůře s rašeliníkem. Na zimu potřebuje pauzu.

### Cymbidium atropurpureum

synonyma: *C. atropurpureum* var. *olivaceum*, *C. finlaysonianum* var. *atropurpureum*, *C. pendulum* var. *atropurpureum*

oblasti: Malajsie, Thajsko

Pochází z jižního Thajska a Malajsie.

### Cymbidium banaense

### Cymbidium bicolor

oblasti: Borneo, Himálaj, Indie, Indočína, J Čína, Malajsie, Srí Lanka

Pochází z jižní Číny, Indie a Bornea. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bicolor* - Indie, Srí Lanka
- subsp. *obtusum* - Himálaje, Indočína
- subsp. *pubescens* - Malajsie

### Cymbidium borneense

oblasti: Borneo

Pochází ze severozápadu Bornea.

### Cymbidium canaliculatum

synonyma: *C. canaliculatum* f. *aureolum*, *C. canaliculatum* f. *barrettii*, *C. canaliculatum* f. *fuscum*, *C. canaliculatum* f. *purpurascens*, *C. canaliculatum* f. *sparkesii*, *C. canaliculatum* var. *barrettii*, *C. canaliculatum* var. *marginatum*, *C. canaliculatum* var. *sparkesii*, *C. sparkesii*

oblasti: Queensland

Pochází ze severovýchodu Austrálie.

### Cymbidium changningense

synonyma: *C. lowianum* var. *changningense*

### Cymbidium chawalongense

oblasti: Xizang (Tibet)

Objevena i v Tibetu.

### Cymbidium chloranthum

synonyma: *C. pulchellum*, *C. sanguineum*, *C. sanguinolentum*, *C. variciferum*

oblasti: Malajsie, Velké Sundy

Pochází ze západní Malajsie a Indonésie.

### Cymbidium cochleare

synonyma: *C. babae*, *C. kanran* var. *babae*, *Cyperorchis babae*, *Cyperorchis cochleare*, *Cyperorchis cochlearis*, *Cyperorchis kanran* var. *babae*

oblasti: Himálaj, Tchaj-wan

Roste od Himálaje po Tchaj-wan.

### Cymbidium concinnum

### Cymbidium cultum (Člunatec pěstovaný)

### Cymbidium cyperifolium

synonyma: *C. carnosum*, *C. viridiflorum*, *Cyperorchis wallichii*, *Geodorum longifolium*, *Limodorum cyperifolium*, *Limodorum longifolium*

oblasti: Filipíny, Himálaj, Indočína

Roste od Himálaje po Filipíny. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cyperifolium* - Himálaje až jižní Čína
- subsp. *indochinese* - Indočína až Filipíny

### Cymbidium dayanum

synonyma: *C. acutum*, *C. alborubens*, *C. angustifolium*, *C. dayanum* subsp. *leachianum*, *C. dayanum* var. *albiflorum*, *C. dayanum* var. *austrojaponicum*, *C. dayanum* var. *leachianum*, *C. eburneum* var. *austrojaponicum*, *C. eburneum* var. *dayanum*, *C. eburneum* var. *dayi*, *C. leachianum*, *C. poilanei*, *C. pulcherrimum*, *C. simonsianum*, *C. simonsianum* f. *vernale*, *C. sutepense*

oblasti: Himálaj, Japonsko, Malajsie

Roste od Himálaje po jižní Japonsko a Malajsi.

### Cymbidium defoliatum

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Cymbidium devonianum

synonyma: *C. rigidum*, *C. sikkimense*

oblasti: Nepál, Thajsko

Roste od Nepálu po severní Thajsko.

### *Cymbidium eburneum*

synonyma: *C. eburneum* var. *longzhouense*, *C. eburneum* var. *philbrickianum*, *C. eburneum* var. *williamsianum*, *C. syringodorum*, *Cyperorchis eburnea*

oblasti: Hainan, Himálaj, Myanmar (Barma)

Roste od Himálaje po Myanmar a Hainan.

### *Cymbidium elegans*

synonyma: *C. densiflorum*, *C. elegans* var. *lutescens*, *C. elegans* var. *obcordatum*, *C. longifolium*, *Cyperorchis elegans*, *Cyperorchis longifolia*, *Limodorum angustifolium*

### *Cymbidium elongatum*

oblasti: Borneo

Pochází ze severozápadního Bornea.

### *Cymbidium ensifolium*

synonyma: *C. albomarginatum*, *C. arrogans*, *C. ensifolium* f. *arcuatum*, *C. ensifolium* f. *falcatum*, *C. ensifolium* f. *flaccidior*, *C. ensifolium* var. *misericors*, *C. ensifolium* var. *rubrigemmum*, *C. ensifolium* var. *striatum*, *C. ensifolium* var. *susin*, *C. ensifolium* var. *xiphiifolium*, *C. ensifolium* var. *yakibaran*, *C. estriatum*, *C. gonzalesii*, *C. gyokuchin*, *C. gyokuchin* var. *arrogans*, *C. gyokuchin* var. *soshin*, *C. kanran* var. *misericors*, *C. koran*, *C. micans*, *C. misericors*, *C. misericors* var. *oreophilum*, *C. niveomarginatum*, *C. prompovenium*, *C. rubrigemmum*, *C. shimaran*, *C. xiphiifolium*, *C. yakibaran*, *C. yongfuense*, *Epidendrum ensifolium*, *Jensoa ensata*, *Limodorum ensatum*, *Liuguishania taiwanensis*

oblasti: Indočína, J Indie, Nová Guinea, Střední Asie, Vietnam

Pochází z tropů a jiných teplých částí Asie. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ensifolium* - Indočína, teplé části Aise
- subsp. *haematodes* - jižní Indie až Nová Guinea

### *Cymbidium erythraeum*

synonyma: *C. hennisianum*, *Cyperorchis hennisiana*

oblasti: Himálaj, J Čína, Myanmar (Barma), Nepál, Střední Čína, Vietnam

Roste od Himálaje po jižní a střední Čínu.

### Cymbidium erythrostylum

synonyma: *Cyperorchis erythrostyla*

oblasti: Vietnam

Pochází z Vietnamu.

### Cymbidium faberi

synonyma: *C. cerinum*, *C. fukiense*, *C. oiwakense*, *C. scabroserrulatum*, *Eulophia yunnanensis*, *Semiphajus evrardii*

oblasti: J Čína, Střední Asie, Střední Čína, Tchaj-wan, Uttarákhand

Roste od Uttaranchalu po Tchaj-wan. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *faberi* - střední a jižní Čína po Tchaj-wan
- var. *szechuanicum* - Uttarákhand až střední a jižní Čína

### Cymbidium finlaysonianum

synonyma: *C. pendulum* var. *brevilabre*, *C. tricolor*, *C. wallichii*

oblasti: Kambodža, Malajsie

Roste od Indočíny po Malajsi jako epifyt. Pahlízy jsou zakrnělé. Řemenovité listy dorůstají délky až 50cm. Kvete 3 - 5cm žltorůžovými květy v převislém květenství.

Potřebuje teplo a vlhko. Ani v zimě by teplota neměla klesnout pod 20°C.

### Cymbidium flavum

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Cymbidium floribundum

synonyma: *C. chawalongense*, *C. floribundum* f. *virescens*, *C. floribundum* var. *pumilum*, *C. illiberale*, *C. pumilum*, *C. pumilum* f. *virescens*

oblasti: J Čína, Tchaj-wan

Roste od jižní Číny po Tchaj-wan.

### Cymbidium gaoligongense

### Cymbidium goeringii

synonyma: *C. formosanum*, *C. formosanum* f. *albiflorum*, *C. forrestii*, *C. goeringii* f. *albiflorum*, *C. goeringii* var. *formosanum*, *C. goeringii* var. *mackinnonii*, *C. mackinnonii*, *C. pseudovirens*, *C. tentyozanense*, *C. uniflorum*, *C. virens*, *C. virescens*, *C. yunnanense*, *Maxillaria goeringii*

oblasti: Himálaj, V Asie

Roste od Himálaje po teplé části východní Asie. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *goeringii*
- var. *gracillimum*
- var. *longibracteatum*
- var. *tortisepalum*

### *Cymbidium gongshanense*

oblasti: J Čína

Pochází z jižní Číny.

### *Cymbidium haematodes*

synonyma: *C. ensifolium* subsp. *haematodes*, *C. ensifolium* var. *haematodes*, *C. siamense*, *C. sinense* var. *haematodes*, *C. sundaicum*, *C. sundaicum* var. *estriatum*

oblasti: Nová Guinea

Roste v džunglích jižní a jihovýchodní Asie.

### *Cymbidium hartinahianum*

oblasti: Sumatra

Pochází ze severu Sumatry.

### *Cymbidium hookerianum*

synonyma: *C. giganteum* var. *hookerianum*, *C. grandiflorum*, *C. grandiflorum* var. *punctatum*, *Cyperorchis grandiflora*

oblasti: Himálaj, J Čína, Nepál

Roste od Nepálu po Čínu.

### *Cymbidium induratifolium*

### *Cymbidium insigne* (Člunatec skvělý)

synonyma: *C. insigne* f. *album*, *C. insigne* var. *album*, *C. insigne* var. *sanderi*, *C. sanderi*, *Cyperorchis insignis*

oblasti: Hainan, Thajsko, Vietnam

Roste od severního Thajska po Hainan.

### Cymbidium iridioides

synonyma: *C. giganteum*, *Cyperorchis gigantea*, *Iridorchis gigantea*, *Limodorum longifolium*

oblasti: Himálaj, J Čína, Střední Čína

Roste od Himálaje po střední a jižní Čínu.

### Cymbidium kanran

synonyma: *C. kanran* f. *purpurascens*, *C. kanran* var. *aestivale*, *C. kanran* var. *purpureohiemale*, *C. linearisepalum*, *C. linearisepalum* f. *atropurpureum*, *C. linearisepalum* f. *atrovirens*, *C. linearisepalum* var. *atropurpureum*, *C. linearisepalum* var. *atrovirens*, *C. nigrovenium*, *C. oreophilum*, *C. purpureohiemale*, *C. sinokanran*, *C. sinokanran* var. *atropurpureum*, *C. tosyense*

oblasti: J Čína, J Japonsko

Roste od jižní Číny po jižní Japonsko.

### Cymbidium lancifolium

synonyma: *Cymbidiopsis lancifolia*, *C. aspidistrifolium*, *C. bambusifolium*, *C. caulescens*, *C. cuspidatum*, *C. gibsonii*, *C. javanicum*, *C. javanicum* var. *aspidistrifolium*, *C. javanicum* var. *pantlingii*, *C. kerrii*, *C. lancifolium* f. *aspidistrifolium*, *C. lancifolium* var. *aspidistrifolium*, *C. lancifolium* var. *papuanum*, *C. lancifolium* var. *syunitianum*, *C. longifolium* var. *aspidistrifolium*, *C. maclehoseae*, *C. nagifolium*, *C. papuanum*, *C. syunitianum*

oblasti: Nová Guinea, Vietnam

Pochází z tropické a subtropické Asie. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *lancifolium*
- var. *papuanum* - Nová Guinea

### Cymbidium longifolium

oblasti: Himálaj, J Čína, Střední Čína

Roste od Himálaje po střední a jižní Čínu.

### Cymbidium longipes

### Cymbidium lowianum

synonyma: *C. giganteum* var. *lowianum*, *C. hookerianum* var. *lowianum*, *C. lowianum* f. *concolor*, *C. lowianum* var. *concolor*, *C. lowianum* var. *superbissimum*, *C. lowianum* var. *viride*, *Cyperorchis lowiana*

oblasti: Himálaj, Indie, JZ Čína, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam

Rodové jméno bylo vybráno na počest sběratele sira Huga Lowia (1824 - 1905). Roste od Číny po severní Indočínu jako epifyt. Pahlízy jsou oválné. Listy jsou řemenovité, dlouhé až 75cm a na jediné rostlině jich naleznete až 10ks. Květenství má až 1m vysoký stonek, vlastní květy jsou žlutozelené, s červeně zakončeným pyskem a průměrem do 10cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Concolor' - květy bronzově zelené, pysk béžový
- var. kalawense
- var. lowianum

Potřebuje chladnější teploty v létě a stále vlhký substrát.

### Cymbidium macrorhizon

synonyma: *Aphyllorchis aberrans*, *Bletia nipponica*, *Cymbidiopsis macrorhiza*, *C. aberrans*, *C. aphyllum*, *C. macrorhizon* var. *aberrans*, *C. nipponicum*, *C. pedicellatum*, *C. sagamiense*, *C. szechuanensis*, *Pachyrhizanthus aberrans*, *Pachyrhizanthus aphylla*, *Pachyrhizanthus macrorhizos*, *Pachyrhizanthus nipponica*, *Pachyrhizanthus sagamiensis*, *Yonia aberrans*

oblasti: Ásám, Myanmar (Barma), Pákistán, Thajsko, V Asie

Roste v Pákistánu, Indii, Myanmaru a Thajsku. Dorůstá délky do 30cm. Květenství je 4 - 8mikvěté, listeny jsou malé, kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 1,2cm, kališní lístky jsou světle hnědosivozelené, občas narůžovofialové, zašpičatělé, dlouhé do 3cm, široké 5mm a korunní lístky jsou mírně kratší než široké.

### Cymbidium madidum

synonyma: *C. albuciflorum*, *C. iridifolium*, *C. leae*, *C. leroyi*, *C. madidum* var. *leroyi*, *C. queeneanum*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste od Queenslandu po severní Nový Jižní Wales, Austrálie.

### Cymbidium maguanense

### Cymbidium mannii

synonyma: *C. bicolor* subsp. *obtusum*, *C. crassifolium*, *C. flaccidum*, *C. pendulum* var. *purpureum*

### Cymbidium mastersii

synonyma: *C. affine*, *C. mastersii* var. *album*, *C. micromeson*, *Cyperorchis mastersii*

oblasti: Čína, V Himálaj

Roste od východního Himálaje po Čínu.

### Cymbidium micranthum



oblasti: J Čína, JV Asie, Střední Čína

Roste od jižní a střední Číny po další teplé oblasti Asie.

### Cymbidium multiradicatum

oblasti: JZ Čína, V Himálaj

Roste od východního Himálaje po jihozápadní Čínu.

### Cymbidium munroanum

synonyma: *C. ensifolium* var. *munroanum*

### Cymbidium munronianum

oblasti: Himálaj, SV Indie

Roste od východního Himálaje po Assam.

### Cymbidium nanulum

oblasti: Hainan, Yunnan

Roste od jihozápadního Yunnanu po Hainan.

### Cymbidium omeiense

synonyma: *C. faberi* var. *omeiense*

### Cymbidium parishii

synonyma: *C. eburneum* var. *parishii*, *Cyperorchis parishii*

oblasti: Myanmar (Barma)

Pochází z jižního Myanmaru.

### Cymbidium paucifolium

### Cymbidium qiubeiense

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Cymbidium rectum

oblasti: Borneo, Malajsie

Pochází z Malajsie a severního Bornea.

### Cymbidium recurvatum

### Cymbidium rhizomatosum

### Cymbidium roseum

synonyma: *Cyperorchis rosea*

oblasti: Malajsie

Pochází ze západní Malajsie.

### Cymbidium sanderae

synonyma: *C. parishii* var. *sanderae*

oblasti: Vietnam

Pochází z Vietnamu.

### Cymbidium schroederi

synonyma: *Cyperorchis schroederi*

oblasti: Vietnam

Pochází ze středního Vietnamu.

### Cymbidium serratum

synonyma: *C. formosanum* var. *gracillimum*, *C. goeringii* var. *gracillimum*, *C. goeringii* var. *serratum*, *C. gracillimum*

### Cymbidium sichuanicum

### Cymbidium sigmoideum

synonyma: *C. kinabaluense*, *Cyperorchis sigmoidea*

oblasti: Malajsie

Pochází ze západní Malajsie.

### Cymbidium sinense

synonyma: *C. albojucundissimum*, *C. chinense*, *C. fragrans*, *C. hoosai*, *C. hoosai* f. *hakuran*, *C. sinense* f. *albojucundissimum*, *C. sinense* f. *aureomarginatum*, *C. sinense* f. *margicoloratum*, *C. sinense* f. *pallidiflorum*, *C. sinense* f. *taiwanianum*, *C. sinense* f. *viridiflorum*, *C. sinense* var. *albojucundissimum*, *C. sinense* var. *album*, *C. sinense* var. *bellum*, *C. sinense* var. *margicoloratum*, *C. sinense* var. *pallidiflorum*, *C. sinense* var. *taiwanianum*, *Epidendrum sinense*, *Wutongshania guangdongensis*

oblasti: Střední Asie, SV Indie, Vietnam

Pochází z Assamu.

### Cymbidium suave

synonyma: *C. gomphocarpum*

oblasti: Nový Jižní Wales

Pochází z východní Austrálie.

### Cymbidium suavissimum

oblasti: Myanmar (Barma)

Pochází ze severu Myanmaru.

### Cymbidium teretipetiolatum

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Cymbidium tigrinum

synonyma: *Cyperorchis tigrina*

oblasti: Čína, Střední Asie, SV Indie

Roste od Assamu po Čínu.

### Cymbidium tortisepalum

synonyma: *C. faberi* f. *viridiflorum*, *C. goeringii* f. *viridiflorum*, *C. goeringii* var. *tortisepalum*, *C. longibracteatum* var. *tortisepalum*, *C. tortisepalum* var. *viridiflorum*, *C. tsukengensis*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *longibracteatum*

### Cymbidium tracyanum

synonyma: *Cyperorchis tracyana*

oblasti: JZ Čína, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet)

Roste od jihovýchodního Tibetu po Čínu a Indočínu.

### Cymbidium wadae

### Cymbidium wenshanense

synonyma: *C. quinquelobum*, *C. wenshanense* var. *quinquelobum*

oblasti: Čína, Vietnam

Roste od Číny po Vietnam.

### Cymbidium whiteae

synonyma: *Cyperorchis whiteae*

### Cymbidium wilsonii

synonyma: *C. giganteum* var. *wilsonii*, *Cyperorchis wilsonii*

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Cymbidium x ballianum

synonyma: *Cyperorchis x balliana*

### Cymbidium x baoshanense

### Cymbidium x florinda

### Cymbidium x gammieanum

synonyma: *Cyperorchis x gammieana*

### Cymbidium x glebelandense

synonyma: *C. x cooperi*, *Cyperorchis x glebelandensis*

### Cymbidium x hillii

### Cymbidium x nomachianum

Cymbidium x nujiangense

Cymbidium x oblancifolium

Cymbidium x pauwelsii

Cymbidium x purpuratum

Cymbidium x rosefieldense

synonyma: *Cyperorchis x rosefieldensis*

Cymbidium x woodlandense

synonyma: *Cyperorchis x woodlandensis*

Další informace:

[http://hobbyzahrada.cz/clanek-1747-orchideje\\_cymbidium\\_pro\\_pestovani\\_v\\_byte.htm](http://hobbyzahrada.cz/clanek-1747-orchideje_cymbidium_pro_pestovani_v_byte.htm)

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/cymbidium/>

[http://neviditelnypes.lidovky.cz/priroda-cymbidium-neboli-clunatec-drv-/p\\_zviretnik.asp?c=A070305\\_221328\\_p\\_zviretnik\\_dru](http://neviditelnypes.lidovky.cz/priroda-cymbidium-neboli-clunatec-drv-/p_zviretnik.asp?c=A070305_221328_p_zviretnik_dru)

<http://orchidej.wz.cz/cymbidium.html>

<http://rozkvetly-dum.cz/obchod/detail/59>

<http://www.garten.cz/a/cz/5137-cymbidium-hybridy-clunatec/>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/4724-cymbidium-clunatec/>

<http://www.tvujdum.cz/tipy-triky/cymbidium-zaver-roku-se-spetkou-napeti.aspx>

<http://www.zeny.cz/magazin/pokojove-rostliny/jak-pestovat-orchideje--tentokrat-cymbidium-neboli-clunatec.aspx>

<https://www.rostliny.net/>