

Oxydendrum (Kysloun)

čeleď: Ericaceae

Existuje pouze jediný druh.

Oxydendrum arboreum (Kysloun stromový)

oblasti: Alabama, Apalačské pohoří, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky. Roste v podobě opadavého malého stromu nebo velkého keře. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 30)m při průměru kmene až 50 (i 60)cm. Kořeny jsou mělké. Borka je šedá s červeným nádechem, povrch je hluboce zbrázděný a šupinatý. Mladé větve jsou žlutozelené, později červenohnědé. Listy vyrůstají ve spirále, mají délku 8 - 20cm a šířku 4 - 9cm. Okraje jsou mírně zvlněné, barva tmavězelená. Kvete bílými tvonkově tvarovanými květy délky 6 - 9mm v 15 - 25cm jednostranných prohnutých hroznech. Plodem je dřevěná tobolka. Využívá se v léčitelství.

Potřebuje kyselou vlhkou propustnou půdu na plném slunci nebo v polostínu. Měl by být mrazuvzdorný až do -29°C.

Další informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysloun_stromov%C3%BD

http://dendroz.dendrologie.cz/html_stranky/Oxydendrum.htm

<http://okrasne-kere.cz/tag/oxydendrum-arboreum/>

<https://www.rostliny.net/>