

Rhaponticum

čeleď: Asteraceae

Roste v Africe, Asii, Austrálii a Evropě jako trvalka. Stonek je větvený pouze zřídka. Listy mohou být jednoduché nebo zpeřené. Plodem je nažka s chmýrem.

Rhaponticum acaule

synonyma: *Centaurea chamaerhaponticum*, *Centaurea chamaerhaponticum* var. *ochroleuca*, *Centaurea chamaerhaponticum* var. *purpurea*, *Cestrinus carthamoides*, *Cynara acaulis*, *Leuzea acaulis*, *R. acaule* var. *ochroleucum*, *R. acaule* var. *purpureum*, *Stemmacantha acaulis*

Rhaponticum aulieatense

synonyma: *Leuzea aulieatensis*

Rhaponticum australe

synonyma: *Centaurea australis*, *Stemmacantha australis*

Rhaponticum bicknellii

oblasti: Itálie

Rhaponticum canariense

synonyma: *Centaurea cynaroides*, *Leuzea cynaroides*, *Serratula canariensis*, *Stemmacantha cynaroides*

oblasti: Makaronésie

Rhaponticum carthamoides

synonyma: *Centaurea carthamoides*, *Cirsium carthamoides*, *Cnicus carthamoides*, *Halocharis carthamoides*, *Leuzea altaica*, *Leuzea carthamoides*, *Serratula carthamoides*, *Stemmacantha carthamoides*

oblasti: Altaj, Kazachstán

Rhaponticum centauroides

synonyma: *Carduus centauroides*, *Carduus inermis*, *Cnicus centauroides*, *Leuzea centauroides*, *Leuzea cynaroides*, *R. cynaroides*, *Serratula centauroides*, *Serratula cynarifolia*, *Serratula cynaroides*, *Stemmacantha centauroides*, *Stemmacantha cynaroides*

Rhaponticum coniferum

synonyma: *Centaurea conifera*, *Centaurea pitycephala*, *Leuzea conifera*

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá výšky 6 - 40 (i 45)cm. Listy jsou střídavé, kopinaté až podlouhlé. Květenství má průměr 3 - 5cm, délku 2 - 3,5cm. Plodem je nažka délky 4 - 4,2mm s chmýrem délky 2 - 3cm.

Rhaponticum cossonianum

synonyma: *Centaurea cossoniana*, *Leuzea caulescens*, *R. caulescens*, *Stemmacantha caulescens*

Rhaponticum exaltatum

synonyma: *Centaurea rhaponticoides*, *Leuzea cynaroides* var. *rhaponticoides*, *Leuzea exaltata*, *Leuzea rhaponticoides*, *Rhacoma rhaponticoides*, *Stemmacantha exaltata*

Rhaponticum heleniifolium

synonyma: *Centaurea heleniifolia*, *Centaurea lyrata*, *Leuzea rhapontica* subsp. *heleniifolia*, *R. lyratum*, *R. scariosum* subsp. *heleniifolium*, *R. scariosum* subsp. *lyratum*, *Stemmacantha heleniifolia*

oblasti: Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Stonek je tuhý, vzpřímený, ochlupený a obvykle nese 1 květenství. Listy jsou zelené, spodní strana je bíle plstnatá. Přízemní listy bývají obvykle kopinaté, eliptické a řapíkaté. Kvete v růžové až růžovofialové hlávce o průměru 6 - 10cm.

Rhaponticum hemeralpion

oblasti: Itálie

Rhaponticum insigne

synonyma: *Centaurea insignis*, *Leuzea insignis*, *Phaeopappus insignis*, *Stemmacantha insignis*

oblasti: Írán

Rhaponticum integrifolium

synonyma: *Centaurea integrifolia*, *Leuzea integrifolia*

Rhaponticum karatavicum

synonyma: *Centaurea karatavica*, *Leuzea karatavica*

Rhaponticum longifolium

synonyma: *Leuzea longifolia*

Rhaponticum lyratum

synonyma: *Centaurea lyrata*, *Fornicium lyratum*, *Leuzea lyrata*

Rhaponticum namanganicum

synonyma: *Centaurea namanganica*

Rhaponticum nanum

synonyma: *Centaurea nana*, *Leuzea namanganica*

Rhaponticum nitidum

synonyma: *Centaurea nitida*, *Leuzea nitida*

Rhaponticum orientale

synonyma: *R. carthamoides* subsp. *orientale*

Rhaponticum pulchrum

synonyma: *Leuzea pulchra*, *Stemmacantha pulchra*

oblasti: Írán

Rhaponticum repens

synonyma: *Acroptilon angustifolium*, *Acroptilon australe*, *Acroptilon obtusifolium*, *Acroptilon picris*, *Acroptilon repens*, *Acroptilon serratum*, *Acroptilon subdentatum*, *Carduus picris*, *Centaurea picris*, *Centaurea repens*, *Serratula picris*

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, JV Evropa, Kalifornie, Kansas, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Manitoba, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v Euroasii jako trvalka a zavlečen byl do Severní Ameriky. Dorůstá výšky 15 - 70 (i 80)cm. Vytváří mnoho podzemních výběžků. Lodyha je řídce chocholičnatě větvená. Listy jsou pavučinovitě ochlupené, tuhé, šedozelené, čárkovité až podlouhlé, špičaté, přízemní zpravidla řídce zubaté (i peřenosečné), obkopinaté, zpeřeně laločnaté délky 3 - 8cm a šířky 2 - 3cm. Kvete růžovofialovými květy v úboru, zákrov je víceřadý, dlouhý 1 - 1,3cm, široký 5 - 8mm, vnější listeny kulatě vejčité s blanitými tupými ochlupenými přívěsky a vnitřní mají podlouhlé, dlouze ochlupené přívěsky, vlastní květy oboupohlavné, trubkovité, o 1/2 delší zákrovu. Plodem je nažka délky 2,5 - 4mm s opadavým chmýrem délky 0,8 - 1,1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *australe*
- subsp. *repens*

Rhaponticum scariosum

synonyma: *Centaurea scariosa*, *R. scariosum* subsp. *lamarckii*, *Stemmacantha rhapontica* subsp. *lamarckii*

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Stonek je ochlupený. Listy jsou zelené, spodní strana bíle ochlupená, okraje jsou zubaté. Přízemní listy mají srdčitý zpeřený tvar, délku 30 - 40cm, horní jsou menší, kopinaté, dlouhé 10 - 22cm. Květenství má barvu růžovou až fialovou, o průměru 6 - 7cm. Plodem je hnědá nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. rhaponticum/*Stemmacantha rhapontica*
- subsp. scariosum

Rhaponticum serratuloides

synonyma: *Aplotaxis bungei*, *Centaurea altaica*, *Centaurea serratuloides*, *Fornicium rhaponticoides*, *Leuzea altaica*, *Leuzea salina*, *R. altaicum*, *R. salinum*, *Stemmacantha serratuloides*

Rhaponticum uniflorum

synonyma: *Centaurea monanthos*, *Leuzea uniflora*

<https://www.rostliny.net/>