

Ventenata (Ovsiřík)

čeleď: Poaceae

Pocházejí z jižní Evropy. Patří mezi jednoletky a jsou mírně trsnaté. Dorůstají výšky 10 - 70cm. Listy mají skládané nebo svinuté úzké čepele o šířce 1 - 2,5mm. Na vnější straně je jazýček. Kvete v latě tvořené ze smáčkutých vícekvětých klásků (obvykle 2 - 7ks). Plodem je obilka.

Vyhovuje jim sucho.

Ventenata blanchei

synonyma: Pilgerochloa blanchei

Ventenata dubia (Ovsiřík štíhlý)

synonyma: Avena dubia, Avena fertilis, Avena triaristata, Festuca tenuis, Gaudinia tenuis, Heteranthus dubius, Heteranthus tenuis, Trisetaria tenuis, Trisetum tenue, V. avenacea, V. bromoides, V. dubia, V. dubia f. violascens

oblasti: Alberta, Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Idaho, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Maine, Montana, Německo, New York, Nový Brunšvik, Ontario, Oregon, Quebec, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy mají zašpičatělý zoubkatý jazýček délky 6 - 9mm. Květenství má klásky zploštělé, umístěné na koncích dlouhých větví a pluchy horních květů s dlouhou zkroucenou kolénkatou osinou. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovuje mu plné slunce, kamenité i travnaté stráně, úhory, okraje polí, meze, atp.

Ventenata eigiana

synonyma: Pilgerochloa eigiana

Ventenata huber-morathii

synonyma: Gaudiniopsis huber-morathii

Ventenata macra

synonyma: Avena macra, Bromus strictostachys, Gaudinia biebersteinii, Gaudiniopsis macra, Gaudiniopsis macra subsp. antalyensis, Gaudiniopsis macra subsp. micropyroides, Gaudiniopsis micropyroides, Heteranthus macer, Trisetum macrum

Ventenata quercetorum

synonyma: Gaudiniopsis macra var. quercetorum, Gaudiniopsis quercetorum

Ventenata sorgerae

synonyma: Gaudiniopsis sorgerae

Ventenata subnervis

<https://www.rostliny.net/>