

Eurybia (Hvězdnice)

synonyma: Weberaster

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe jako trvalka. Dorůstá výšky 0,1 - 1,2m. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Eurybia avita

synonyma: Aster avitus

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Roste na východě USA.

Eurybia chlorolepis

synonyma: Aster chlorolepis, Aster divaricatus var. chlorolepis

oblasti: Apalačské pohoří, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Roste v Apalačském pohoří, USA.

Eurybia compacta

synonyma: Aster gracilis, Aster surculosus var. gracilis

oblasti: Delaware, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, New Jersey, Severní Karolína, Virginie

Roste na východním pobřeží USA.

Eurybia conspicua

synonyma: Aster conspicuus, Aster forwoodii

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Manitoba, Montana, Oregon, Saskatchewan, Washington, Wyoming

Roste na severozápadě USA a jihozápadě Kanady. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Pod zemí vytváří dřevnatý oddenek. Lodyha je přímá, zřídka větvená, může být i chlupatá, řídce žláznatá a hustě olistěná. Lodyžní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, v dolní části obkopinaté až obvejčité, na okraji pilovité, dlouhé (4 -) 5,8 - 14 (i 18)cm, široké (0,8 -) 2 - 5 (i 8)cm, horní jsou menší, kopinaté až eliptické. Kvete v úboru složeném z 5 - 50ti kvítků. Květní stopky jsou ochlupené, žláznaté, listenů je 0 - 3ks. Okvětní lístky jsou fialové, střed je hnědý. Plodem je nažka s narůžovělým chmýrem délky 0,9 - 1cm.

Vyhovují ji suché i vlhké louky, světlé jehličnaté i listnaté lesy a dobře snáší jarní požáry.

Eurybia divaricata (Hvězdnice rozkladitá)

synonyma: Aster boykinii, Aster carmesinus, Aster castaneus, Aster claytonii, Aster claytonii var. crispicans, Aster corymbosus, Aster corymbosus var. alatus, Aster divaricatus, Aster elatus, Aster excavatus, Aster fischeri, Aster flexilis, Aster stiletiformis, Aster tenebrosus, Biotia corymbosa var. alata, Biotia macrophylla var. divaricata, E. corymbosa

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Pochází východu Severní Ameriky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 0,9 (i 1,2)m. Listy mohou mít různý tvar od oválného, po vejčitý, báze je srdčitá, na obou stranách bývá 6 - 15 zubů, řapík má délku 2 - 7cm, celková délka je 1,9 - 6,5cm a šířka 1,7 - 6cm. Kvete bílými květy v chocholičnatém květenství z úborů, vnější zákrovní listeny jsou širší a 2 - 3x delší než široké, okvětní lístky mají délku 2,5 - 7mm, jsou bílé nebo mírně nařadovělé, střed je fialový. Plodem je nažka délky 2,6 - 3,8mm.

Vyhovuje ji polostín, lesní paseky i lesy.

Eurybia eryngiifolia

synonyma: Aster eryngiifolius, Heleastrum chapmanii, Prionopsis chapmanii

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Pochází z jihovýchodu USA.

Eurybia furcata

synonyma: Aster furcatus, Aster furcatus f. elaciniatus, Aster furcatus f. erythrae, Aster furcatus var. elaciniatus

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Missouri, Wisconsin

Pochází z USA.

Eurybia glauca

synonyma: Aster glaucodes, Aster glaucodes var. formosus, Aster glaucus, Eucephalus formosus, Eucephalus glaucus

oblasti: Arizona, Idaho, Kolorado, Montana, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Eurybia hemispherica

synonyma: Aster gattingeri, Aster hemisphericus, Aster paludosus subsp. hemisphericus, Aster paludosus var. hemisphericus, Aster pedionomus, Aster verutifolius, Heleastrum hemisphericum

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas

Pochází z USA.

Eurybia horrida

synonyma: Aster horridus, Herrickia horrida

oblasti: Kolorado, Nové Mexiko

Eurybia integrifolia

synonyma: Aster amplexifolius, Aster integrifolius

oblasti: Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Pochází z USA.

Eurybia jonesiae

synonyma: Aster jonesiae

oblasti: Alabama, Georgia

Pochází z jihovýchodu USA.

Eurybia macrophylla (Hvězdnice velkolistá)

synonyma: Aster ambiguus, Aster ianthinus, Aster jussiei, Aster latifolius, Aster macrophyllus, Aster macrophyllus f. eglandulosus, Aster macrophyllus var. albiflorus, Aster macrophyllus var. apricensis, Aster macrophyllus var. biformis, Aster macrophyllus var. coeruleus, Aster macrophyllus var. excelsior, Aster macrophyllus var. ianthinus, Aster macrophyllus var. pinguifolius, Aster macrophyllus var. sejunctus, Aster macrophyllus var. velutinus, Aster multiflorus, Aster nobilis, Aster polyphyllus, Aster riciniatus, Aster roscidus, Aster roscidus var. variifolius, Aster subcymosus, Aster violaris, Biotia latifolia, Biotia macrophylla, E. jussiei

oblasti: Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, S Evropa, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě a zavlečena byla do severní Evropy. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Stonek je větvený. Listy jsou srdčité a velké, zpravidla širší než 10cm. Kvete v úboru o průměru 3 - 4cm, okvětní lístky jsou růžovofialové (i béžové), střed je žlutohnědý a stopka je žláznatá.

Dobře snáší sucho.

Eurybia merita

synonyma: Aster behringensis, Aster meritus, Aster montanus var. arcticus, Aster richardsonii, Aster richardsonii var. meritus, Aster sibiricus subsp. richardsonii, Aster sibiricus var. giganteus, Aster sibiricus var. meritus, E. sibirica var. gigantea

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Montana, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA a Kanadě.

Eurybia mirabilis

synonyma: Aster mirabilis

oblasti: Jižní Karolína, Severní Karolína

Pochází z východu USA.

Eurybia paludosa

synonyma: Aster paludosus, Diplopappus paludosus, Heleastrum paludosum

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Pochází z jihovýchodu USA.

Eurybia pulchra

synonyma: Aster glaucodes subsp. pulcher, Aster glaucodes var. pulcher

oblasti: Arizona, Utah

Eurybia radula

synonyma: Aster biflorus, Aster nudiflorus, Aster radula, Aster radula var. biflorus, Aster radula var. strictus, Aster strictus, Aster strictus var. angustifolius

oblasti: Connecticut, Delaware, Kentucky, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Pochází z východu USA a Kanady.

Eurybia radulina

synonyma: Aster eliasii, Aster radulinus, Weberaster radulinus

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Pochází ze západního pobřeží Severní Ameriky.

Eurybia saxicastellii

synonyma: Aster saxicastelli

oblasti: Kentucky, Tennessee

Pochází z východu USA.

Eurybia schreberi

synonyma: Aster chasei, Aster curvescens var. oviformis, Aster curvescens var. umbelliformis, Aster schreberi, Biotia glomerata, Biotia schreberi, E. glomerata

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky.

Eurybia sibirica

synonyma: Aster ammani, Aster behringensis, Aster biflorus, Aster bracteatus, Aster conspicuus, Aster espenbergensis, Aster giganteus, Aster ircuitianus, Aster lacerus, Aster montanus, Aster montanus var. giganteus, Aster prascottii, Aster pubescens, Aster richardsonii, Aster richardsonii var. giganteus, Aster sachalinensis, Aster salsuginosus, Aster sibiricus, Aster sibiricus subsp. richardsonii, Aster sibiricus var. giganteus, Aster sibiricus var. montanus, Aster tataricus, E. sibirica var. gigantea, Grindelia sibirica

oblasti: Alberta, Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Idaho, Montana, Nunavut, Severozápadní Teritorium, Skandinávie, Washington, Yukon

Roste na severu Evropy, Asie a Severní Americe.

Eurybia spectabilis

synonyma: Aster bellidiflorus, Aster bellidiflorus var. salicinus, Aster commixtus, Aster elegans, Aster smallii, Aster speciosus, Aster spectabilis, Aster spectabilis var. bellidifolius, Aster spectabilis var. cinerascens, Aster spectabilis var. suffultus, Biotia commixta, E. commixta

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie

Roste při východním pobřeží USA.

Eurybia spinulosa

synonyma: Aster spinulosus, Heleastrum spinulosum

oblasti: Florida

Pochází z jihovýchodu USA z Floridy.

Eurybia surculosa

synonyma: Aster liatroides, Aster surculosus, Aster surculosus f. albus

oblasti: Alabama, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Ohio, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Pochází z východní části USA.

Eurybia wasatchensis

synonyma: Aster glaucus var. wasatchensis, Aster wasatchensis

oblasti: Utah

Eurybia x herveyi

synonyma: Aster herveyi, Aster herveyi var. intermedia, Aster ornatus

oblasti: Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island

<https://www.rostliny.net/>