

Cypripedium (Střevíčník)

synonyma: Arietinum, Calceolaria, Calceolus, Ciripedium, Criogenes, Fissipes, Hypodema, Sacodon, Schizopedium, Stimegas

čeleď: Orchidaceae

Roste v mírném pásu Eurasie, Severní Ameriky a v horách jižní Asie a Mexika v podobě pozemní orchideje. Rodové jméno evokuje velký laločnatý spodní pysk květu. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Vyrůstají z něj přisedlé eliptické až kopinaté zřasené listy. Kvete na stonku 1 - 4mi květy. Plodem je tobolka. Všechny druhy jsou zapsány v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Akihell'
- 'Emil'
- 'Inge' - *C. parviflorum* x *C. fasciolatum*
- 'Neeri Glow'
- 'Pinocchio'
- 'Rascal'
- 'Wössner Kolosuk'

Pěstování je velmi náročné. Vyhovuje jim polostín, vlhko, dobře propustná půda se středním až vyšším obsahem živin a mírné klima. Používá se směs 1 díl polystyrenu, 1 díl rašeliníku, 1 díl rašeliny, 3 díly humusu, 1 díl písku, 4 díly agroperlitu (některé druhy vápencovou drť).

Množí se vegetativně dělením oddenků nebo semen. Sází se do hloubky 10cm.

Cypripedium acaule (Střevíčník bezlodýžný)

synonyma: *Calceolus hirsutus*, *C. acaule* f. *albiflora*, *C. acaule* f. *biflorum*, *C. acaule* f. *lancifolia*, *C. hirsutum*, *C. humile*, *Fissipes acaulis*, *Fissipes acaulis* f. *lancifolia*, *Fissipes hirsuta*, *Fissipes hirsuta* f. *albiflora*

oblasti: Alabama, Alberta, Apalačské pohoří, Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 60cm. Stonky jsou přímé, neolistěné, přízemní listy vyrůstají z podzemního oddenku, jsou vstřícné, široce eliptické, vejčité až obvejčité, dlouhé 9 - 30cm, široké 2,5 - 15cm. Kvete jednopohlavnými květy, kališní lístky jsou červenohnědé až zelené, kopinaté až eliptické, dlouhé 1,9 - 5,2cm, široké 0,5 - 2,2cm, korunní lístky červenohnědé až zelené, kopinaté až eliptické, dlouhé 2,4 - 6cm, široké 0,4 - 1,7cm, občas stočené do spirály, pysk růžovofialovočervené až bílé, obvejčité až vejčité, dlouhé 3 - 6,7cm, rozdělené na 1/2. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu suché i vlhké lesy, rašeliniště, vřesoviště, pobřežní písčiny, okraje cest, atp. v kyselých půdách.

Cypripedium arietinum

synonyma: *Arietinum americanum*, *Criocanthes arietina*, *Criocanthes borealis*, *C. arietinum* f. *albiflorum*, *C. arietinum* f. *biflorum*

oblasti: Connecticut, Maine, Manitoba, Minnesota, New Hampshire, New York, Nové Skotsko, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Vermont, Wisconsin

Cypripedium bardolphianum

synonyma: C. nutans

Cypripedium calceolus (Střevíčník pantoflíček)

synonyma: Calceolus alternifolius, Calceolus marianus, Cypripedilon marianus, C. alternifolium, C. atsmori, C. boreale, C. calceolus f. biflorum, C. calceolus f. triflorum, C. calceolus var. citrina, C. calceolus var. viridiflora, C. cruciatum, C. ferrugineum, C. guttatum subsp. microsaccos, C. microsaccos

oblasti: Česká republika, Čína, Francie, Itálie, Japonsko, Katalánsko, Kavkaz, Maďarsko, Malá Asie (Anatolie), Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Skandinávie, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Roste v Evropě, Asii a Severní Americe jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 60 (i 80)cm. Listy jsou vejčité až podlouhle kopinaté a zelené. Kvete po (1 -) 2 - 3ks květy velikosti až 8cm s naftouklým spodním pyskem v barvě žluté až žlutozelené, délky 3 - 4cm, vnitřní strana je červeně tečkovaná, zbývající korunní lístky mají kopinatý tvar, hnědofialovou barvu a délku i více než 4cm. Ostruha chybí. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. calceolus - Evropa; květy zpravidla samostatné, pysky žluté
- var. parviflora - USA a Kanada; květy menší, občas párovité, pysk zlatožlutý, uvnitř s načervenalými skvrnami
- var. pubescens - Severní Amerika, severovýchodní Asie; listy ochlupené; květy větší, korunní lístky nazelenalé

Vyhovují mu listnaté nebo smíšené lesy, ale i jehličnaté. Má rád vlhkou vápenitou půdu bohatou na živiny a teplo.

Množí se semeny nebo oddenkovými řízky. Sázíme do hloubky 3 - 5cm.

Cypripedium calcicola

synonyma: C. smithii, C. tibeticum subsp. calcicola

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v jižní Číně. Dorůstá výšky 15 - 45cm. Lodyha je přímá a má 3 - 4 listy. Listy jsou dlouhé 5 - 17cm, široké 4 - 6cm. Kvete obvykle samostatnými tmavěčervenými květy. Korunní lístky jsou dlouhé 4,4 - 5,2cm, široké 8 - 9mm, pysk je dlouhý 3,5 - 4,5cm a široký 2,5 - 3cm. Je zapsán v seznamu CITES.

Vyhovují mu křovinaté stráně, okraje lesů, atp. s vápencovým podkladem.

Cypripedium californicum

oblasti: Kalifornie, Oregon

Cypripedium candidum

synonyma: *Calceolus candidus*

oblasti: Alabama, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kentucky, Manitoba, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Saskatchewan, Severní Dakota, Virginie, Wisconsin

Cypripedium cordigerum

oblasti: Bhútán, Himálaj, Pákistán, Xizang (Tibet)

Roste v Himálaji, Pakistánu, Bhútánu a Tibetu jako trvalka. Dorůstá výšky do 60cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Listy vyrůstají po 3 - 5 (i 6)ti ks, jsou kulaté až eliptické, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé do 15cm a široké 10cm. Květenství je 1 (i 2 - 3)květé, listen je listovitý, dlouhý 6 - 11cm, kališní lístky jsou světe žlutozelené, zašpičatělé, dorsální je vejčitěkopinatý, zašpičatělý, dlouhý 3 - 4cm, široký 1,2 - 1,8cm, korunní lístky jsou nažloutlé, dlouhé 3 - 4cm a široké 6 - 8mm.

Cypripedium daweishanense

synonyma: *C. lichiangense* var. *daweishanense*

Cypripedium debile

synonyma: *C. cardiophyllum*

Cypripedium dickinsonianum

Cypripedium elegans

synonyma: *Coelogyne elegans*

Cypripedium fargesii

synonyma: *C. ebracteatum*, *C. margaritaceum* subsp. *fargesii*, *C. margaritaceum* var. *fargesii*

Cypripedium farreri

synonyma: *C. cheniae*, *C. fasciolatum* subsp. *farreri*

Cypripedium fasciculatum

synonyma: *C. fasciculatum* f. *purpureum*, *C. fasciculatum* f. *viride*, *C. fasciculatum* var. *pusillum*, *C. knightae*, *C. pusillum*

oblasti: Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Cypripedium fasciolatum

synonyma: C. lang-rhoa, C. wilsonii

Cypripedium favillianum

Cypripedium flavum (Střevíčník žlutý)

synonyma: C. luteum

oblasti: Gansu, Hubei, Shanxi, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Pochází z jihozápadní Číny. Dorůstá výšky do 60cm. Roste obvykle v trsech s více lodyhami. Ty jsou krátce ochlupené, při bázi mají listy s listovými pochvami, jsou vejčité až kopinatě eliptické, dlouhé 9 - 18cm a obě strany ochlupené. Kvete obvykle samostatnými květy, při bázi mají 4,5 - 8cm listen, semeníky je obloukovitě ohnutý, pysk je vodorovný nebo mírně skloněný k zemi, bledě žlutý, na spodní straně s nafialovělými rozpitými fialovými tečkami, je zakulacený, obvykle dlouhý 3 - 4,5cm a má eliptický otvor. Korunní lístky jsou bílé často s růžovofialovými skvrnami, horní vnější lístek eliptický, na konci tupý, dlouhé 4cm, postranní lístky šikmo dlouze eliptické, tupé, dlouhé 3 - 3,5cm, široké do 1,5cm, sloupek je dlouhý 1cm. Je zapsaný v seznamu CITES.

Vyhovuje mu horské řidší jehličnaté nebo smíšené lesy s vápencovým podložím, často kamenité.

Cypripedium formosanum

synonyma: C. japonicum var. formosanum

oblasti: Tchaj-wan

Cypripedium forrestii

synonyma: C. bardolphianum subsp. forrestii, C. bardolphianum var. zhongdianense

Cypripedium franchetii

synonyma: C. macranthos var. villosum, C. pulchrum, C. rubronerve

Cypripedium guttatum

synonyma: C. bouffordianum, C. calceolus var. variegatum, C. guttatum f. albiflorum, C. guttatum f. latifolium, C. guttatum f. punicum, C. guttatum f. redowskii, C. guttatum var. koreanum, C. guttatum var. redowskii, C. orientale, C. variegatum

oblasti: Aljaška, Bhútán, Himálaj, Kamčatka, Kazachstán, S Čína, S Korea, S Mongolsko, Sachalin, Severozápadní Teritorium, SV Rusko, SZ Čína, Ural, Xizang (Tibet), Yukon, Z Rusko

Roste kolem polárního kruhu. Pod zemí vytváří dlouhý vodorovný oddenek. Dorůstá výšky 10 - 38cm. Na bázi má 2 listencové pochvy se žláznatými chlupy. Lodyha je jinak odstále ochlupená. Má 2 (i 3) listy kopinatého až vejčitého tvaru se špičkou, délku 4,5 - 12,5cm, šířku 2,5 - 5,5cm, horní

strana je holá, na spodní straně kolem žilek ochlupená, okraj brvitý. Kvete po 1 (i 2) květech běžovobílé barvy s růžovofialovými skvrnami. Horní listen je vejčitý, zašpičatělý, dlouhý 1,5 - 3,5cm a brvitý. Horní část je dlouhá 3cm, široká 2cm, vejčitá, na konci zašpičatělá, spodní strana skvrnitá, spodní část je nazelenalá, ochlupená, dlouhá 1,1 - 1,7cm, široké 5 - 8mm a konec je rozeklaný. Pysk je vakovitý, vydutý, dlouhý 1,4 - 2,5cm, široký 1 - 1,5cm a skvrnitý. Postranní korunní lístky jsou dlouhé 1,3 - 2cm, tupé a skvrnité. Plodem je krátce žláznatá tobolka délky 2,5cm a šířky 1,3cm. Je zapsána v seznamu CITES.

Vyhovují mu lesostepy, horské trávníky, louky, kroviny, skalnaté svahy, rokle, atp. v listnatých, smíšených i jehličnatých lesích, ve vlhkých rašelinistech, písčinách, sutích, atp. s kyselým až neutrálním pH. Dobře snáší mrazy, není odolný na sucho.

Množí se vegetativně.

Cypripedium henryi

synonyma: *C. chinense*

Cypripedium himalaicum

synonyma: *C. macranthon* var. *himalaicum*, *C. macranthos* var. *himalaicum*

oblasti: Himálaj

Cypripedium irapeanum

synonyma: *C. lexarzae*, *C. luzmarianum*, *C. splendidum*, *C. turgidum*

Cypripedium japonicum (Střevíčník japonský)

synonyma: *C. cathayenum*, *C. japonicum* var. *glabrum*

oblasti: Japonsko, Korea, Střední Čína

Roste v Japonsku, Koreji a Číně. Dorůstá výšky do 45cm. Pod zemí vytváří dlouhý plazivý oddenek. Stonek je ochlupený. Listy (2ks) jsou střídavé, vyrůstají v polovině stonku, jsou oválné až okrouhlé, na okraji zvlněné, bohatě žilkované a při bázi vytvářejí nálevku. Kvete samostatnými květy, korunní lístky jsou nazelenalé, při bázi ochlupené, někdy růžovofialovohnědě skvrnité, pysk je vydutý, hluboce rozdělený na 1/2, růžový, tmavě růžovofialově skvrnitý, vstup je na spodní straně pysku. Je zapsán v seznamu CITES. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *formosanum* - korunní lístky světlerrůžové

Vyhovuje mu vlhko, stín v listnatých nebo bambusových lesích.

Cypripedium kentuckiense

synonyma: *C. daultonii*, *C. kentuckiense* f. *pricei*, *C. kentuckiense* f. *summersii*

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v USA.

Cypripedium kentuckiense x Cypripedium parviflorum

Cypripedium lentiginosum

synonyma: *C. lichiangense* subsp. *lentiginosum*

Cypripedium lichiangense

Cypripedium ludlowii

synonyma: *C. tibeticum* subsp. *ludlowii*

Cypripedium macranthos (Střevíčník velkokvětý)

synonyma: *C. calceolus* var. *rubrum*, *C. macranthos* f. *albiflorum*, *C. macranthos* f. *rebunense*, *C. macranthos* var. *albiflorum*, *C. macranthos* var. *atropurpureum*, *C. macranthos* var. *flavum*, *C. macranthos* var. *maximum*, *C. macranthos* var. *speciosum*, *C. macrotrychon*, *C. neoparviflorum*, *C. rebunense*, *C. speciosum*, *C. speciosum* var. *albiflorum*, *C. thunbergii*, *C. thunbergii* f. *albiflorum*, *Sacodon macranthos*

oblasti: Altaj, Bajkal, Bělorusko, Čína, Japonsko, Korea, Rusko

Roste od severovýchodní Evropy po východní Asii. Dorůstá výšky 20 - 60cm. Na stonku má 3 - 4 listy. Listy jsou eliptické, dlouhé do 15cm, široké 8cm. Kvete 1 (i 2)mi velkými květy v barvě červené až růžovočervené, žilkované, pysk je vydutý, na okraji má bílý lem. Je zapsaný v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba'
- var. *hoteiatusumorianum* - Japonsko
- var. *rebunense* - Japonsko
- var. *speciosum* - Japonsko

Vyhovují mu okraje listnatých lesů, křovinaté stráně, místy i skalnaté oblasti.

Cypripedium malipoense

Cypripedium margaritaceum

synonyma: *C. daliense*

Cypripedium micranthum

Cypripedium molle

synonyma: *C. irapeanum* subsp. *molle*

Cypripedium montanum

synonyma: *C. montanum* f. *praetertinctum*, *C. montanum* f. *welchii*, *C. occidentale*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Oregon, Saskatchewan, Washington, Wyoming

Cypripedium palangshanense

Cypripedium parviflorum

synonyma: *Calceolus parviflorus*, *Criocanthes parviflora*, *C. bifidum*, *C. bulbosum* var. *parviflorum*, *C. calceolus* subsp. *parviflorum*, *C. calceolus* var. *parviflorum*, *C. hirsutum* var. *parviflorum*, *C. luteum*, *C. luteum* var. *parviflorum*, *C. parviflorum* f. *albolabium*

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste na severu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 45)cm. Lodyha je přímá a vyrůstají na ni (2 -) 3 - 5 střídavé listy. Listy jsou úzce vejčité až kopinaté. Kvete po 1 - 2 (i 3)ks, vnější korunní lístky jsou vejčité až kopinaté, dlouhé 1,9 - 8cm, široké 0,7 - 4cm, jsou nazelenalé nebo nažloutlé, častě tmavě skvrnité, vnitřní korunní lístky kopinaté až úzce kopinaté, dlouhé 2,4 - 9,7cm, široké 0,3 - 1,2cm, vnější bývají spirálovitě stočené, pysk je žlutý (vzácně bílý) nebo s červenými skvrnami, dlouhý 1,5 - 5,4cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *makasin* - sušší opadavé nebo smíšené lesy
- var. *pubescens* - mokřiny, prérie

Vyhovují mu opadavé nebo smíšené lesy od pobřeží až do výšky 1,5 (i 2,9)km.

Cypripedium passerinum

synonyma: *C. passerinum* f. *minganense*, *C. passerinum* var. *minganense*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Manitoba, Montana, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Yukon

Pochází ze Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 12 - 38 (i 50)cm. Lodyha je přímá a má 3 - 7 střídavých listů. Listy jsou eliptické až široce kopinaté, dlouhé 5 - 19cm, široké 1,5 - 6cm. Kvete po 1 (i 2)ks, vnější korunní lístky jsou bílé nebo zelené, dlouhé 0,6 - 2cm, široké (0,7 -) 0,9 - 1,5 (i 2)cm, vnitřní lístky jsou bílé, podlouhlé až úzce eliptické, dlouhé 1,2 - 2cm, široké 3 - 6mm, pysk je bílý (i narůžovělý), dlouhý 1,1 - 2cm. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu jehličnaté lesy, křoviny, tundra, okraje vod, atp.

Cypripedium plectrochilum

Cypripedium reginae (Střevíčník královnin)

synonyma: *Calceolus reginae*, *C. album*, *C. canadense*, *C. hirsutum f. album*, *C. reginae f. albolabium*, *C. reginae f. album*, *C. reginae var. album*, *C. spectabile*

oblasti: Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v trsech. Dorůstá výšky 45cm. Listy jsou eliptické a zelené. Kvete po 1 - 3ks, bílými květy s růžovým spodním nafouklým pyskem.

Cypripedium segawae

synonyma: *C. guttatum var. segawae*, *C. reginae var. segawae*

Cypripedium shanxiense

oblasti: Shanxi

Cypripedium sichuanense

synonyma: *C. margaritaceum subsp. sichuanense*

oblasti: Sichuan

Cypripedium singchii

Cypripedium subtropicum

Cypripedium taibaiense

Cypripedium tibeticum

synonyma: *C. compactum*, *C. corrugatum*, *C. corrugatum var. obesum*, *C. froschii*, *C. lanuginosum*, *C. macranthon var. tibeticum*, *C. macranthos var. tibeticum*, *C. tibeticum var. froschii*

oblasti: Bhútán, Gansu, Myanmar (Barma), Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Tibetu a v přilehlých oblastech. Patří mezi trvalky. Dorůstá do výšky 10 (i 30)cm. Lodyha je holá, při bázi s listovými pochvami a 3mi lodyžními listy a listenem. Listy jsou dlouhé 7 - 15cm, obě strany holé s výjimkou špičky, okrajů a hlavních žilek na spodní straně. Listen je dlouhé do 10cm. Kvete samostatnými převislými červenofialovohnědě sířnatými květy, pysk bývá svrasklý, obvykle širší než hlubší, dlouhý i široký 3,5 - 6cm, nafouklý, ústí okrouhlé nebo eliptické. Vnější i vnitřní

korunní lístky podobné, vejčité, zašpičatělé, dlouhé 3 - 6cm, široké 1,5 - 3cm. Je zapsán v seznamu CITES.

Vyhovují mu křovinaté horské louky, okraje jehličnatých nebo smíšených lesů s vápencovým podkladem.

Cypripedium wardii

synonyma: *C. guttatum* var. *wardii*

oblasti: Myanmar (Barma), Střední Asie, SV Indie, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste na jihovýchodě Číny s přesahem do Barvy a jihovýchodní Indie. Dorůstá výšky do 10cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Lodyha je štíhlá, na povrchu ochlupená a vyrůstají z ní 3 listy seskupenými při bázi. Listy jsou eliptické až široce kopinaté, špičaté, dlouhé 5 - 7cm, při bázi kornoutovité, listen je vejčitě kopinatý, špičatý, dlouhý 2 - 3cm. Kvete samostatnými ohnutými květy, pysk je kulovitý, bílý s tmavě růžovofialovými kruhovými skvrnami, dlouhý 1,5cm. Korunní lístky jsou bílé, široce eliptické, špičaté a dlouhé 1 - 1,7cm. Postranní vnitřní lístky jsou dlouze vejčité, na konci tupé nebo zaokrouhlené.

Vyhovují mu travnaté svahy, stín, v lese až loukách na vápencovém podkladu.

Cypripedium wumengense

Cypripedium x alaskanum

oblasti: Aljaška

Pochází z Aljašky.

Cypripedium x andrewsii

synonyma: *C. x favillianum*, *C. x landonii*

oblasti: Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Manitoba, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Ontario, Severní Dakota, Wisconsin

Jedná se o křížence *Cypripedium parviflorum* x *Cypripedium candidum*.

Cypripedium x catherinae

Cypripedium x columbianum

oblasti: Britská Kolumbie, Washington

Cypripedium x herae

Cypripedium x ventricosum

synonyma: C. macranthos subsp. ventricosum, C. macranthos var. ventricosum, C. x agnicapitatum, C. x barbeyi, C. x freynii, C. x kesselringii, C. x krylowii, C. x manchuricum, C. x manchuricum var. virescens, C. x morinanthum, C. x roseum, C. x sinapoides, C. x ventricosum f. bicolor, Sacodon x ventricosum

Cypripedium x wenqingiae

Cypripedium yatabeanum

synonyma: C. guttatum subsp. yatabeanum, C. guttatum var. yatabeanum

oblasti: Aljaška

Cypripedium yunnanense

synonyma: C. amesianum

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste na jihozápadě Číny. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 35cm. Lodyhy jsou holé nebo řídce ochlupené, při bázi mají listové pochvy a 2 - 3 (i 4) lodyžní listy. Listy jsou eliptickyvejčité, dlouhé 6 - 14cm, obě strany ochlupené. Listen má délku do 7cm. Kvete samostatným květem, je ohnutý, pysk světle až tmavě růžovofialový s tmavšími žilkami, na spodní straně světlerrůžový, mírně svrasklý, obvejčitě eliptický, dlouhý 2 - 3,5cm. Okvětní lístky jsou růžovobílé s nápadnými růžovofialovými žilkami, vnější horní lístek je eliptický, zašpičatělý, dlouhý do 3cm, široké 1,5 - 2cm. Postranní vnitřní lístky jsou široce kopinaté, dlouhé do 4cm, široké do 1cm. Je zapsán v seznamu CITES.

Vyhovují mu horské louky, borové lesy, křoviny, atp. s vápencovým podkladem.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/cypripedium-acaulis/>
<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/strevicnik-pantoflice>
<http://www.skalnický.cz/cypripedia.php>

<https://www.rostliny.net/>