

Thismia

synonyma: Bagnisia, Geomitra, Glaziocharis, Mamorea, Myostoma, Ophiomeris, Rodwaya, Sarcosiphon, Scaphiophora, Tribachys

čeleď: Thismiaceae

Rostou ve východní a jihovýchodní Asii, Austrálii, Novém Zélandu a střední a Jižní Americe. Svě živiny získávají díky houbám a patří tak mezi mykoheterotrofy.

Thismia abei

synonyma: Glaziocharis abei

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku.

Thismia alba

oblasti: Malajsie, Thajsko

Rosta v Malajsii a Thajsku.

Thismia americana

synonyma: Sarcosiphon americanus

oblasti: Illinois

V Illinois, odkud pochází je již vyhynulým druhem.

Thismia angustimitra

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Thismia annamensis

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Thismia appendiculata

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Papui-Nové Guineji.

Thismia arachnites

oblasti: Malajsie

Roste v západní Malajsii.

Thismia aseroe

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii a Singapuru.

Thismia betung-kerihunensis

oblasti: Kalimantan

Roste v Indonésii.

Thismia bifida

oblasti: Malajsie, Sarawak

Roste v Malajsii.

Thismia brunonis

synonyma: T. brunoniana

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Thismia caudata

synonyma: Glaziocharis macahensis, T. macahensis

oblasti: Brazílie

Již vyhynulý druh. Rostl v Brazílii.

Thismia chrysops

oblasti: Malajsie

Roste v západní Malajsii.

Thismia clandestina

synonyma: Sarcosiphon clandestinum

oblasti: Jáva

Roste na Jávě.

Thismia clavarioides

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

Thismia clavigera

synonyma: Geomitra clavigera, Sarcosiphon clavigerus

oblasti: Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Malajsii, Sumatře a Thajsku.

Thismia crocea

synonyma: Bagnisia crocea, Sarcosiphon croceus, Sarcosiphon versteegii, T. versteegii

oblasti: Indonésie, Papua-Nová Guinea

Roste v Indonésii a Papui-Nové Guineji.

Thismia episcopalis

synonyma: Bagnisia episcopalis, Geomitra episcopalis, Sarcosiphon episcopalis

oblasti: Borneo, Malajsie

Roste na Borneu a Malajsii.

Thismia espirito-santensis

synonyma: Ophiomeris espirito-santensis

oblasti: Espírito Santo

Roste v Brazílii.

Thismia filiformis

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Thismia fumida

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii a Singapuru.

Thismia fungiformis

synonyma: Triscyphus fungiformis

oblasti: Brazílie

Již vyhynulý druh. Rostl v Brazílii.

Thismia gardneriana

synonyma: Tribrachys gardneriana

oblasti: Srí Lanka, Střední Asie

Roste na Srí Lance.

Thismia gigantea

synonyma: Scaphiophora gigantea

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Thismia glaziovii

synonyma: T. itatiaiensis, Triurocodon glaziovii, Triurocodon itatiaiensis

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Thismia gongshanensis

oblasti: Čína

Roste v Číně.

Thismia goodii

oblasti: Malajsie, Sabah

Roste v Malajsii.

Thismia grandiflora

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Thismia hexagona

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Thismia huangii

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu.

Thismia hyalina

synonyma: Myostoma hyalinum

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii.

Thismia iguassuensis

synonyma: Ophiomeris iguassuensis

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Thismia janeirensis

synonyma: Myostoma janeirense, Ophiomeris janeirensis

oblasti: Minas Gerais, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Thismia javanica

oblasti: Jáva, Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste na Jávě, Sumatře, Thajsku a Vietnamu.

Thismia labiata

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Thismia lauriana

oblasti: Kalimantan

Roste na Borneu.

Thismia luetzelburgii

synonyma: Ophiomeris luetzelburgii

oblasti: Espírito Santo, Kostarika, Panama

Roste v Brazílii, Kostarice a Panamě.

Thismia macahensis

synonyma: Ophiomeris macahensis

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Thismia melanomitra

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Thismia mirabilis

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Thismia mucronata

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Thismia mullerensis

oblasti: Kalimantan

Roste na Borneu.

Thismia neptunis

oblasti: Malajsie, Sarawak

Roste v Malajsii na Borneu.

Thismia okhaensis

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Thismia ophiuris

oblasti: Borneo, Malajsie

Roste v Malajsii na Borneu.

Thismia panamensis

synonyma: Ophiomeris panamensis

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Kostarika, Panama, Peru

Roste v Bolívii, Ekvádoru, Kolumbii, Kostarice, Panamě a Peru.

Thismia prataensis

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Thismia racemosa

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Thismia rodwayi

synonyma: Bagnisia hillii, Bagnisia rodwayi, Rodwaya thismiacea, Sarcosiphon hillii, Sarcosiphon rodwayi

oblasti: Nový Jižní Wales, S Nový Zéland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii, Novém Zélandu a Tasmánii. Kořeny jsou dlouhé 4 - 15cm. Květ je červenooranžový, nad zemí dlouhý 1 - 1,8cm (celková délka je 0,5 - 3cm), tvořený 6ti srostlými lístky a stonek má šířku 1 - 1,5mm.

Thismia saulensis

oblasti: Francouzská Guyana

Roste ve Francouzské Guyaně.

Thismia singeri

synonyma: Mamorea singeri

oblasti: Bolívie

Roste v Bolívii.

Thismia taiwanensis

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu.

Thismia tentaculata

oblasti: J Čína, Vietnam

Roste v Hong-Kongu a Vietnamu.

Thismia tuberculata

oblasti: J Japonsko

Roste v Japonsku.

Thismia yorkensis

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

<https://www.rostliny.net/>