

Parrya

čeleď: Brassicaceae

Rostou zejména v Rusku. Patří mezi trvalky, někdy dřevnatějící. Květní stvoly jsou bezlisté. Listy jsou celokrajné nebo peřenodílné. Kališní lístky bývají u báze vakovité, korunní lístky nehetnaté, růžovofialové nebo bílé a semeníky jsou přisedlé. Plodem je podlouhlá až čárkovitá šešule. Semena jsou zploštělá.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya alba

synonyma: *Neuroloma album*

Parrya albida

synonyma: *Neuroloma albidum*

oblasti: Kazachstán, Uzbekistán

Roste v Kazachstánu a Uzbekistánu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Kmínky dřevnatější, jsou olistěné a mohou být větvené. Borka je bílá. Listy jsou žláznatě ochlupené, úzce kopinaté, řídce pilovité až zubaté a špičaté. Kveté bělavými květy v hroznu na až 15cm řídce žláznatém stonku, kališní lístky jsou podlouhlé a tupé, korunní uťaté a dlouhé 6mm. Plody jsou vzpřímené, čárkovité, dlouhé 2 - 6cm, široké 3mm a zploštělé. Semena jsou také plochá a bezkřídlá.

Vyhovují jí skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya angrenica

synonyma: *Neuroloma angrenicum*

Parrya arctica

oblasti: Nunavut, Severozápadní Teritorium, V Asie, V Rusko

Roste od Dálného východu po sever Severní Ameriky v trsech. Dorůstá výšky 1 - 10cm. Pod zemí vytváří kulový kořen. Listy jsou holé, kopinaté až vejčité, zubaté a přisedlé. Kveté v 6 - 12tičetném hroznu na stvolu kratším než listy a korunní lístky jsou dlouhé 0,7 - 1cm.

Vyhovují jí vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya asperrima

synonyma: *Achoriphragma asperrimum*, *Neuroloma asperrimum*, *P. golenkinii*, *P. nudicaulis* var. *asperrima*

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán

Roste v Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Povrch je krátce drsně žláznatý. Lodyha je bohatě olistěná. Listy jsou zelené, podlouhlé, tupé, celokrajné a dlouze řapíkaté. Kvete v 3 - 5tičetném hroznu a vlastní květy mají 2cm korunní lístky. Plodem je zploštělá šešule délky 3 - 5cm.

Parrya australis

synonyma: *Neuroloma australe*

Parrya beketovii

synonyma: *Achoriphragma beketovii*, *Neuroloma beketovii*, *P. michaelis*, *P. robusta*

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán, Ťan-šan, Xinjiang

Roste v Číně, Kazachstánu a Kyrgyzstánu v trsech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Povrch je ochlupený. Lisy jsou kopistovité až kopinaté, zubaté, řapíkaté, dlouhé 2 - 6cm a lodyžní jsou podobné. Kvete růžovofialovými květy v 7 - 25tičetném hroznu, kališní lístky jsou červenofialové, čárkovité, korunní obvejčité a dlouhé 1,5 - 2cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya darvazica

synonyma: *Neuroloma darvazicum*

Parrya fruticulosa

synonyma: *Achoriphragma fruticulosum*, *Neuroloma fruticulosum*

oblasti: Čína, Sibiř, Střední Asie

Roste ve střední Asii, Číně a Sibiři v podobě holého větveného opadavého chudolistého keře. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Větve jsou olistěné pouze v 1. roce. Listy jsou čárkovité, celokrajné nebo mírně zubaté či žláznatě ochlupené. Květní kmínky jsou delší, mají 1 - 3četné hrozny, kalich je růžovočervený, dlouhý 0,9 - 1,1cm, korunní lístky jsou bleděčervené, obsrdčité a dlouhé 2 - 2,8cm. Plodem je čárkovitá šešule a má 1,9 - 2,4cm stopku.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya karatavica

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě polokeře. Větve jsou dlouhé, vystoupavé nebo převislé, na koncích s bylinnými kmínky o délce 2 - 8cm. Listy vytvářejí přízemní růžice, jsou hustě ochlupené, lopatkovité nebo široce vejčité, celokrajné, řídce mírně zubaté, tupé, dlouhé 0,5 - 1,5cm, na spodní straně bělavé, lodyžní listy jsou menší, kopinaté, tupé a krátce řapíkaté. Kvete v 5 - 9tičetných hroznech, květy mají stopky dlouhé 0,3 - 1,2cm, kališní lístky jsou dlouhé 5mm, tupě vejčité, korunní lístky jsou bílé, dlouhé 0,8 - 1,3cm a široké 4 - 6cm. Plody jsou čárkovité, zploštělé, dlouhé 1,7 - 2,8cm a široké 3 - 4mm.

Parrya korovinii

synonyma: *Neuroloma korovinii*

Parrya kuramensis

synonyma: *Neuroloma kuramense*

Parrya lancifolia

synonyma: *Achoriphragma lancifolium*, *Neuroloma lancifolium*, *P. glaucifolia*

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán, Ťan-šan, Xinjiang

Roste v Číně, Kazachstánu a Kyrgyzstánu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou přízemní, úzce kopinaté, celokrajné, špičaté a dlouhé 2 - 9cm. Kvete červenorůžovými květy v 2 - 10tičetném hroznu, kališní lístky jsou červenorůžové, korunní široce obvejčité a dlouhé 3cm.

Vyhovují jí středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízkami.

Parrya longicarpa

synonyma: *Achoriphragma longicarpum*, *Neuroloma longicarpum*, *P. siliquosa*

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán

Roste v Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Listy jsou přízemní, zpeřené a holé. Kvete v hroznech na žláznaté lodyze, kališní lístky jsou červenorůžovozelené a korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 1,7cm. Plodem je úzká šešule délky 6 - 7cm.

Parrya maidantolica

synonyma: *Achoriphragma maidantolicum*, *Christolea maidantolica*, *Neuroloma maidantolicum*

oblasti: Kyrgyzstán

Roste v Kyrgyzstánu v kobercových porostech. Dorůstá výšky 2 - 10cm. Listy jsou obvejčité, tupé, na okraji zubaté, ztlustlé a dlouhé 1 - 2cm. Kvete bělavými květy v 5 - 7mičetném hroznu. Plodem je zploštělá čárkovitá holá a hladká šešule délky 2 - 4cm.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya minuta

synonyma: *Neuroloma minutum*

Parrya nauruaq

oblasti: Aljaška

Roste na Aljašce v trsech. Dorůstá výšky 4 - 8cm. Povrch je hustě žláznatý. Listy jsou obvejčité až široce kopist'ovité, hrubě zubaté, špičaté a řapíkaté. Kvete růžvočervenými a růzovofialovými květy v 6 - 16tičetném hroznu, kališní lístky jsou vejčité a korunní lístky zakulacené. Plodem je podlouhlá šešule.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya nudicaulis

synonyma: *Achoriphragma ajanense*, *Achoriphragma nudicaule*, *Arabis nudicaulis*, *Cardamine articulata*, *Cardamine nudicaulis*, *Cheiranthus scapiger*, *Hesperis arabidiflora*, *Hesperis scapigera*, *Matthiola nudicaulis*, *Neuroloma ajanense*, *Neuroloma arabidiflorum*, *Neuroloma griffithii*, *Neuroloma nudicaule*, *Neuroloma scapigerum*, *Neuroloma speciosum*, *P. ajanensis*, *P. arabidiflora*, *P. integerrima*, *P. linnaeana*, *P. macrocarpa*, *P. nudicaulis*, *P. nudicaulis* subsp. *interior*, *P. nudicaulis* subsp. *septentrionalis*, *P. nudicaulis* var. *grandiflora*, *P. nudicaulis* var. *interior*, *P. scapigera*

oblasti: Afganistán, Aljaška, Britská Kolumbie, Himálaj, Nunavut, Pákistán, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Utah, Wyoming, Yukon

Roste kolem polárního pruhu jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Přizemní lisy jsou široce kopist'ovité až podlouhlé, mohou být žláznatě ochlupené, okraje zvlněné, dlouhé 4 - 10 (i 15)cm a široké 0,5 - 1,5cm. Kvete bílými a růžově fialovými květy v 10 - 15tikvětém hroznu, vlastní květ má průměr 2 - 2,5cm, stopku délky do 3 (i 5)cm, kališní lístky jsou dlouhé 1cm, široké 2mm, korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2,2cm a široké 5 - 7mm. Plodem je podlouhlá zploštělá vzpřímená šešule délky 3 - 6,5cm, šířky 3 - 5mm a obsahuje mnoho úzce křídlatých kulovitých semen průměru 3 - 5mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya nuratensis

synonyma: *Neuroloma nuratense*

Parrya pavlovii

synonyma: *Neuroloma pavlovii*

Parrya pinnatifida

synonyma: *Neuroloma minjanense*, *Neuroloma pinnatifidum*, *P. chitralensis*, *P. minjanensis*, *P. pinnatifida* var. *kizylarti*

oblasti: Afganistán, Čína, Pákistán

Roste v Pákistánu, Afganistánu a Číně jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Pod zemí vytváří větvený oddenek o tloušťce 4 - 5mm. Povrch je ochlupený. Přízemní listy jsou kopinaté až čárkovité, peřenosečné, špičaté, dlouhé (2 -) 3 - 7cm, široké 1 - 1,5cm a řapíkaté. Kvete růžově bílými, červenými a růžově fialovými květy o průměru 1cm v (2 -) 5 - 6 (i 10)tičetném hrozně na 4 - 5mm stopce, kališní lístky jsou červeně růžové, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 2 - 3mm, korunní lístky široce obvejčité, dlouhé 1,5 - 2cm a široké 3 - 5mm. Plodem je zploštělá špičatá šešule délky 6 - 8 (i 10)cm, šířky 3 - 4mm a obsahuje úzce vejčité a úzce křídlatá semena délky 2mm.

Vyhovují jí kamenité, vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya popovii

synonyma: *Neuroloma popovii*, *P. caespitosa*

Parrya pulvinata

synonyma: *Neuroloma pulvinatum*

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán

Roste v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 4 - 11cm. Povrch je holý a sivozelený. Listy jsou přízemní, obkopinaté, dlouhé 4 - 5 a přecházejí v řapík. Květy mají červenorůžové kališní lístky s bílým okrajem, korunní jsou široce obsrdčité a dlouhé 4 - 11cm.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya runcinata

synonyma: *Achoriphragma runcinatum*, *Neuroloma runcinatum*, *P. fruticulosa* var. *runcinata*

oblasti: Střední Asie

Roste ve střední Asii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Kmínky jsou větvené, zakončené bylinnými větvemi s olistěním ve spodní části. Listy jsou podlouhlé, vykrajovaně zubaté nebo kracovité či peřenoklané, zvlňené, tupé nebo krátce špičaté a řapíkaté. Kvete v chudých hroznech, kališní lístky jsou dlouhé 0,9 - 1,1cm, růžovofialové, korunní lístky jsou fialové, zakulacené až mírně vykrojené a dlouhé 2,5 - 3cm. Plody jsou čárkovité, dlouhé 5 - 6cm a mají 0,9 - 1,6cm stopky.

Vyhovují jí skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya rydbergii

synonyma: *Neuroloma rydbergii*, *P. nudicaulis* subsp. *rydbergii*, *P. nudicaulis* var. *rydbergii*, *P. platycarpa*

oblasti: Utah, Wyoming

Roste v USA. Povrch je hustě žláznatý. Listy jsou obvejčité až kopist'ovité, vykrajované, špičaté, dlouhé 2 - 5cm a řapíkaté. Kvete v 3 - 15tičetném hroznu, korunní lístky jsou mělce vykrojené a dlouhé 1 - 2cm. Plodem je čárkovitá šešule.

Parrya saposhnikovii

synonyma: *Neuroloma saposhnikovii*

Parrya saxifraga

synonyma: *Achoriphragma saxifragum*, *Neuroloma saxifraga*

oblasti: Uzbekistán

Roste v Uzbekistánu v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přízemní listy jsou tuhé, dlouze vejčité a zubaté. Kvete fialovými květy na bezlisté lodyze. Plodem je vystoupavá šešulka.

Vyhovují ji kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya schugnana

synonyma: *Achoriphragma schugnanum*, *Neuroloma schugnanum*

oblasti: Kyrgyzstán, Tádžikistán

Roste v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je žláznatý. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou obvejčité až podlouhlé, tupé, pilovité a přecházejí do řapíku. Kvete růžovofialovými květy v klasu. Plodem je zploštělá šešule délky 3 - 7cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya simulatrix

synonyma: *Neuroloma simulator*

Parrya stenocarpa

synonyma: *Achoriphragma stenocarpum*, *Neuroloma stenocarpum*, *P. stenoloma*

oblasti: Čína, Sibiř, Střední Asie

Roste v Číně, Sibiři a střední Asii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Přízemní listy jsou

dlouze eliptické, celokrajné, holé a řapíkaté. Kvete růžovofialovými květy v 2 - 7mičetném hroznu, kališní lístky jsou čárkovité, tupé a korunní lístky vykrojené a dlouhé 2,2 - 2,5cm.

Vyhovují jí středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya stenophylla

synonyma: Achoriphragma stenophyllum, Neuroloma stenophyllum

oblasti: Kazachstán, Uzbekistán

Roste v Kazachstánu a Uzbekistánu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 12cm. Přízemní listy jsou zelené, holé, čárkovité a peřenoklané. Kvete fialovými květy v řídkém hroznu, korunní lístky jsou obsrdčité a dlouhé 2 - 2,5cm.

Vyhovují jí kamenité vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya subscapigera

synonyma: P. seravschanica

Parrya subsiliquosa

synonyma: Neuroloma subsiliquosum

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Parrya tianschanica

synonyma: Neuroloma tianschanicum

oblasti: Ťan-šan

Parrya turkestanica

synonyma: Achoriphragma turkestanicum, Neuroloma turkestanicum, P. macrocarpa var. turkestanica

oblasti: Sibiř, Turkestán

Roste na Sibiři a ve střední Asii v trsech. Dorůstá výšky 4 - 30cm. Listy jsou ochlupené, přízemní, dlouze kopinaté, na vrcholu peřenodílné a báze přechází v řapík. Kvete růžovými a růžovofialovými květy v 5 - 10tičetném hroznu, korunní lístky jsou srdčité a dlouhé 1,2 - 2cm. Plodem je šešule délky 3 - 7cm.

Vyhovují ji kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Parrya villosula

synonyma: Achoriphragma villosum, Neuroloma villosulum

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4570>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Parrya.htm>

<https://www.rostliny.net/>