

Cota (Rmen)

čeleď: Asteraceae

Cota altissima

synonyma: *Anthemis altissima*, *Anthemis cota*

oblasti: Itálie

Cota amblyolepis

synonyma: *Anthemis amblyolepis*

Cota antitaurica

synonyma: *Anthemis antitaurica*

Cota austriaca (Rmen rakouský)

synonyma: *Anacyclus austriacus*, *Anthemis austriaca*, *Anthemis austriaca* f. *incrassata*, *Anthemis austriaca* f. *latiloba*, *Anthemis cota*, *Anthemis cotiformis*, *Anthemis dentata*, *Anthemis hungarica*, *Anthemis hyrcana*, *Anthemis maritima*, *Anthemis nigrescens*, *Anthemis pontica*, *Anthemis requienii*, *Anthemis retusa*, *Anthemis ruthenica*, *Anthemis zangelana*, *Chamaemelum austriacum*, *Chamaemelum cota*, *Chamaemelum ruthenicum*, *C. aligulatae*, *C. austriaca*, *C. cossoniana*, *C. dumetorum*, *C. rigescens*, *C. woronowii*

oblasti: Česká republika, Itálie, Rakousko

Patří mezi ohrožené druhy C3.

Cota brachmannii

synonyma: *Anthemis brachmannii*, *Anthemis retusa*

Cota coelopoda

synonyma: *Anacyclus altissimus*, *Anthemis altissima*, *Anthemis altissima* var. *discoidea*, *Anthemis arvensis*, *Anthemis brachycentros*, *Anthemis canescens*, *Anthemis chamomilla*, *Anthemis coelopoda*, *Anthemis coelopoda* var. *bourgaei*, *Anthemis cota* var. *brevicuspidata*, *Anthemis cota* var. *longicuspidata*, *Anthemis diffusa*, *Anthemis haynaldi*, *Anthemis inodora*, *Anthemis multicaulis*, *Anthemis reflectens*, *Anthemis reflexa*, *Anthemis rigida*, *Anthemis sicala*, *Anthemis tomentosa*, *Chamaemelum altissimum*, *Chamaemelum cota*, *C. bourgaei*, *C. brachycentros*, *C. thirkei*

oblasti: Írán

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. bourgaei
- var. coelopoda

Cota dalmatica

synonyma: Anthemis coronata, Anthemis dalmatica

Cota dipsacea

synonyma: Anthemis dipsacea

Cota dubia

synonyma: Anthemis callieri, Anthemis dubia

oblasti: Krym

Roste na Krymu v trsech. Dorůstá výšky 25 - 30cm. Povrch je hustě šedě ochlupený. Listy jsou celkově obvejčité, dlouhé 3cm, peřenodílné s čárkovitými tupými a zubatými úkrojky. Kvete bílými květy v samostatných úborech o průměru 3 - 3,5cm.

Vyhovují mu středně úrodné dobře propustné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Cota fulvida

synonyma: Anthemis fulvida

Cota halophila

synonyma: Anthemis alexandrettae, Anthemis halophila

Cota hamzaoglui

Cota jailensis

synonyma: Anthemis jailensis

Cota lyonnetioides

synonyma: Anthemis lyonnetioides

Cota macrantha

synonyma: Anthemis hemisphaerica, Anthemis macrantha, C. macrantha

Cota macroglossa

Cota melanoloma

synonyma: *Anthemis abagensis*, *Anthemis extrarosularis*, *Anthemis macroglossa*, *Anthemis melanoloma*, *Anthemis rigescens* var. *albotomentosa*, *Anthemis schischkiniana*, *Anthemis tinctoria* var. *bipinnatisecta*, *Anthemis zyghia*, *C. zyghia*, *C. zygia*

Cota monantha

synonyma: *Anthemis cretacea*, *Anthemis monantha*, *Anthemis parviceps*, *C. cretacea*

oblasti: Kavkaz, Krym

Roste na Krymu a Kavkazu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy jsou bíle ochlupené, zubaté, peřenosečné s protaženými úkrojky a s hroty. Kveté žlutými květy v úborech o průměru 1 - 2,5cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Cota oretana

synonyma: *Anthemis oretana*

Cota oxylepis

synonyma: *Anthemis oxylepis*

Cota palaestina

synonyma: *Anacyclus anomalus*, *Anacyclus truncatus*, *Anthemis cota* f. *apiculata*, *Anthemis cota* subsp. *melanolepis*, *Anthemis libanotica*, *Anthemis melanolepis*, *Anthemis melanolepis* var. *cypria*, *Anthemis melanolepis* var. *macrocarpa*, *Anthemis palestina*, *Anthemis syriaca*, *Anthemis truncata*, *C. syriaca*

oblasti: Palestina

Cota pestalozzae

synonyma: *Anthemis pestalozzae*

Cota saguramica

Cota samuelssonii

synonyma: *Anthemis samuelssonii*

Cota segetalis

synonyma: *Anthemis brachycentros*, *Anthemis brachycentros* var. *coronata*, *Anthemis pseudocota*, *Anthemis retusa*, *Anthemis segetalis*, *C. brachycentros*

oblasti: Itálie

Cota talyschensis

oblasti: Arménie, Írán

Roste v Arménii a Íránu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Stonky jsou větvené. Listy jsou přisedlé, široce vejčité, peřenodílné s čárkovitými zubatými úkrojky. Kvete bílými květy v samostatných úborech o průměru 3 - 4cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Cota tinctoria (Rmen barvířský)

synonyma: *Anacyclus tinctorius*, *Anthemis brachyglossa*, *Anthemis chrysantha*, *Anthemis coarctata*, *Anthemis debilis*, *Anthemis discoidea*, *Anthemis kelwayi*, *Anthemis maris-nigri*, *Anthemis maritima*, *Anthemis markhotensis*, *Anthemis pallescens*, *Anthemis parnassi*, *Anthemis saguramica*, *Anthemis subtinctoria*, *Anthemis tinctoria*, *Anthemis tinctoria* f. *halophila*, *Anthemis tinctoria* f. *pectinata*, *Anthemis tinctoria* subsp. *discoidea*, *Anthemis tinctoria* subsp. *subtinctoria*, *Anthemis tinctoria* var. *discoidea*, *Anthemis tinctoria* var. *intermedia*, *Anthemis tinctoria* var. *orientalis*, *Anthemis tinctoria* var. *parviflora*, *Anthemis tinctoria* var. *ramulosa*, *Anthemis zephyrovii*, *Bupthalmum bipinnatum*, *Chamaemelum discoideum*, *Chamaemelum tinctorium*, *C. tinctoria*, *C. tinctoria* subsp. *subtinctoria*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Středozeří, Švýcarsko, Ukrajina, Utah, V Karpaty, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste ve středozeří a západní Asii, zpravidla po dobu 2 - 3let. Je aromatický a dorůstá výšky (0,15 -) 0,25 - 0,7 (i 1)m. Má plstnatý povrch. Kvete v úboru o průměru 5cm, jazykovité květy jsou žluté (mohou i chybět), lůžko je 1/2kulaté a také žluté. Plodem je zploštělá nažka, na příčném řezu úzce kosočtvercovitá. Patří mezi chráněné druhy C4a. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *australis*
- 'E.C. Buxton' - výška 1m; listy zelené; úbory nažloutlé
- 'Kelwayi' - žluté 5cm květy na 65cm stonku
- 'Lemon Ice'
- subsp. *subtinctoria* (Rmen barvířský nepravý) - výška 25 - 40cm; lodyhy max. ve vrcholu chudě větvené a nesou zpravidla 1 - 3 úbory; listy sivozelené, na spodní straně hustě ochlupené, úkrojky 2x peřenodílné až peřenosečné hřebenitě vzhůru zahnuté až svinuté, osinkaté; úbory průměru 2,5 - 3,5cm

- subsp. tinctoria (Rmen barvířský pravý) - výška 40 - 70cm; lodyha zpravidla již ve spodní 1/2 větvená a nese zpravidla 3 - 10 úborů; listy zelené, na spodní straně řídce dlouze šedě ochlupené, ploché, úkrojky 2x peřenodílných listů hřebenitě vzhůru max. mírně zakřivené, krátce osinaté; úbory průměru 3,5 - 5cm
- 'Wargrave' - korunní lístky jsou bleděžluté

Vyhovuje mu teplo a plné slunce. Nalezne se podél silnic, cest, v písčitých půdách, atp. Dobře snáší sucho.

Množí se semeny.

Cota triumfetti

synonyma: *Anacyclus triumfetti*, *Anthemis canescens*, *Anthemis cossoniana*, *Anthemis dumetorum*, *Anthemis nigricans*, *Anthemis palumbi*, *Anthemis platyglossa*, *Anthemis pyrenaica*, *Anthemis rigescens*, *Anthemis sachokiana*, *Anthemis talyschensis*, *Anthemis tinctoria* subsp. *triumfettii*, *Anthemis triumfettii*, *Anthemis triumfettii* subsp. *aligulata*, *Anthemis triumfettii* subsp. *cossoniana*, *Anthemis triumfettii* subsp. *pyrenaica*, *Anthemis woronowii*, *Chamaemelum triumfettii*

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá výšky 30 - 75cm. Listy jsou střídavé a peřenosečné. Květenstvím je úbor o průměru 2,5 - 4cm na 5 - 17cm stopce. Plodem je nažka délky 1,8 - 2,5mm.

Cota wiedemanniana

synonyma: *Anthemis theophrasti*, *Anthemis wiedemanniana*, *C. ormenioides*

oblasti: Írán

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Cota.htm>

<https://www.rostliny.net/>