

Coluteocarpus

čeleď: Brassicaceae

Coluteocarpus reticulatus

Coluteocarpus vesicaria

synonyma: Alyssum vesicaria, Lagovskia physocarpa, Vesicaria dentata

oblasti: Arménie, Irák, Írán, Kavkaz, Libanon, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze a západní a jihozápadní Asii v polštářových porostech jako trvalka. Dorůstá výšky (4 -) 5 - 18 (i 20)cm. Stonek je vzpřímený, hustě olistěný. Bazální listy jsou střídavé, čárkovité až kopisťovité, tvořené 3 - 5ti drobnými zuby. Lodyžní listy jsou přisedlé, úzce kopinaté a celokrajné. Kvete v hroznu z bílých a růžových květů s korunními lístky o délce 0,6 - 1,1cm. Plodem je nafouklá šešule délky 1,5 - 3,3cm a průměru 0,8 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. boissieri - přízemní listy jsou vejčité až kopisťovité; plod má max. 2 semena
- subsp. vesicaria

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/coluteocarpus-vesicaria/>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp?Rod=Coluteocarpus.htm>

<https://www.rostliny.net/>