Lavatera (Slézovec)

čeleď: Malvaceae

Roste ve středozemí, mírném pásu střední a východní Asie a Austrálie jako jednoletka, dvouletka, nebo krátkověká trvalka či keř. Dorůstají výšky 1 - 3m. Listy vyrůstají ve spirále a jsou laločnaté. Vyznačuje se dlouhou dobou kvetení, vlastní květy jsou 5tičetné a mají v průměru 4 - 12cm. Plod má tvar plochého soudečku. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Barnsley' - poloopadavý keř; výška 1,8m; kvete růžovými květy s tmavším středem
- 'Beauty Mixed'
- 'Bredon Springs' - poloopadavý keř; výška i šířka 1,8m; listy šedě zelené; květy růžové
- 'Kew Rose' - výška i šířky 18m; listy šedě zelené; květy růžové s tmavšími žilkami
- 'Loveliness'
- 'Novella'
- 'Mont Blanc'
- 'Pink Beauty'
- 'Rosea' - poloopadavý keř; výška i šířka 1,8m; květy růžové
- 'Silver Cup'
- 'Tanagra'
- 'White Cherub'

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná půda. Je citlivější na mráz (zejména starší rostliny), proto je dobré na zimu zakrývat chvojím, přemístit do chladné místnosti nebo si udělat nový řízek. Po odkvětu se provádí seříznutí.

Množí se semeny nebo řízky.

Lavatera abyssinica

Lavatera acerifolia

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Kanárských ostrovů. V podobě keře dorůstá výšky 1 - 5m. Listy jsou dlanité s 5 - 7mi laloky a pilovým okrajem. Mají velikost asi 10cm. Kvete růžovými květy o průměru 8cm.

Vyhovuje ji plné slunce a sušší půda.

Lavatera arborea (Slézovec stromový)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Libye, Makaronésie, Oregon, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Roste v západním pobřeží Evropy a středozemí jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky (0,5 -) 0,8 - 2 (i 3)m a šířky 1,5m. Stonek je přímý, tlustý, tuhý, ochlupený a na bázi zdřevnatělý. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, obrysem kulaté, dlanitě 5 - 7milaločné, vroubkované, zvlněné, dlouhé

(2 -) 3 - 14 (i 20)cm, široké 2 - 16 (i 18)cm a na bázi srdčité. Kvete po 5 - 7mi ks v paždí listů růžovofialovými 5tičetnými květy s tmavým středem o průměru 3 - 4 (i 5)cm, kalíšek je 3četný, tvořený prakticky kulatými špičatými lístky, kališní lístky jsou 2x větší, 3úhlé a korunní lístky jsou 3úhlé, hluboce vykrojené, tmavě žilkované a dlouhé 1,5 - 2cm. Plod je rozpadavý, tvořený z hranatých plůdků ve věnečku.

Vyhovuje mu plné slunce, skalnaté vlhké dobře propustné půdy, duny, úhory atp.

Lavatera assurgentiflora

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v USA a Mexiku jako trvalka. Dorůstá výšky 1 - 6m. Listy jsou červeně růžově fialové, rozdělené na 5 - 7 laloků a dlouhé do 15cm. Kvete 5tičetnými růžovými květy o průměru 2,5 - 4,5cm.

Dobře snáší sucho.

Lavatera bryoniifolia

synonyma: L. sphaciotica, L. unguiculata, Malva unguiculata

oblasti: Itálie

Lavatera cachemiriana

synonyma: Althaea cachemiriana, L. cachemiriana var. haroonii

oblasti: Írán, Pákistán

Roste ve střední Asii jako trvalka. Povrch je ochlupený. Palisty jsou úzce kopinaté, dlouhé 0,5 - 1cm a široké 2mm. Listy jsou kulaté, dlanitě 3 - 7milaločné, vroubkovaně pilovité, oboustranně ochlupené, dlouhé 3 - 10cm, široké 3 - 7cm, báze je uťatá až mírně srdčitá, laloky jsou vejčité až kopinaté, špičaté anebo zašpičatělé a řapíky dlouhé 2 - 4cm. Květenství má 3 - 6cm stopku, vlastní květy mají kalich s 3úhlými špičatými nebo zašpičatělými laloky, koruna je růžová, průměru 4 - 7cm, korunní lístky jsou obvejčité, s hlubokými zářezy, na bázi ochlupené, dlouhé 3 - 5cm a široké 2 - 3,5cm. Plody jsou diskovité, průměru 1 - 1,5cm a obsahují tmavě hnědá semena.

Lavatera cachmeriana

Lavatera cashemiriana

Lavatera cretica (Slézovec krétský)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt , Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Z Evropa

Pochází ze západní Evropy, severní Afriky a středozemí. Patří mezi dvouletky. Dorůstá výšky (0,3 -)

1 - 2 (i 3)m. Listy jsou 5 - 7milaločnaté, dlouhé 3,5 - 11cm a široké 5,5 - 12cm. Kvete malými růžovými nebo světlefialovými květy o průměru kolem 1cm v 2 - 6 (i 8)mičetném květenství a korunní lístky mají délku (1 -) 1,2 - 1,7cm.

Lavatera flava
synonyma: Althaea flava, L. foucauldii

Lavatera insularis

Lavatera lindsayi

Lavatera maritima (Slézovec přímořský)

oblasti: Andalusie, Katalánsko, Z Středozemí

Roste v západním středozemí v podobě krátkověkého keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 1,2 (i 2)m a i větší šířky. Listy mají 3 - 5 laloků, jsou šedě zelené, dlouhé 1,2 - 3cm a široké 1,4 - 3,5cm. Kvete světle růžovými květy o průměru 4cm a kališní lístky jsou dlouhé (1 -) 1,8 - 2,5cm. Plod obsahuje až 13 semen.

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín, teplo, vlhko a kamenitá půda.

Lavatera maroccana

Lavatera mauritanica

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Listy jsou 5 - 7milaločné, dlouhé 4 - 7cm a široké 5 - 12cm. Květenství je 2 - 6tičetné a korunní lístky mají délku 1,5 - 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. davaei
- subsp. mauritanica

Lavatera microphylla

Lavatera oblongifolia
synonyma: Althaea oblongifolia

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 0,6 - 2m. Listy jsou dlouhé 3 - 7cm a široké 2 - 3,5cm. Květy mají korunní lístky délky 1,5 - 2,5cm.

Lavatera olbia
synonyma: Althaea hispida, Althaea olbia, L. africana, Malva olbia

oblasti: Andalusie, Itálie, Kalifornie, Katalánsko

Dorůstá výšky 0,6 - 1,5 (i 2)m. Listy jsou 3 - 5tilaločné, dlouhé 8 - 11cm a široké 6 - 9cm. Květy mají korunní lístky délky 2 - 3cm.

Lavatera phoenicea

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Tenerife, Kanárské ostrovy. Roste v podobě většího keře. Kvete světleoranžovými květy.

Lavatera punctata
synonyma: Althaea biennis, Althaea punctata, Malva punctata

oblasti: Írán, Itálie, Katalánsko

Lavatera stenopetala

Lavatera thuringiaca (Slézovec duryňský)
synonyma: Althaea thuringiaca, Malva thuringiaca, Olbia thuringiaca

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, Manitoba, Minnesota, Německo, Nový Brunšvik, Ontario, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Ťan-šan, V Evropa, Wyoming

Roste ve východní, střední a jižní Evropě a jihozápadní Asii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 1,8)m. Listy jsou 3 - 5ti laločnaté, hustě hvězdovitě nebo svazčitě ochlupené a široké až 9cm. Kvete růžovými květy o průměru 3 - 7cm s více než 5ti hluboce vykrojenými korunními lístky délky 2,5 - 4,5cm. Plody jsou hladké a složené z 18 - 24 plůdků. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. thuringica (Slézovec durynský pravý)
- subsp. ambigua - jižní Francie, Itálie, západní Balkán

Roste na stepích, v křovinách, pastvinách, náspech, atp. Vyhovuje mu plné slunce a zem bohatá na živiny (nejlépe vápnitá). Pro prodloužení doby kvetení se po odkvětu větve zastřihávají. Nesmí být však střih příliš hluboký.

Množí se řízkováním polodřevnatých větví.

Lavatera triloba
synonyma: Althaea lusitanica, Althaea micans, Althaea triloba, L. lusitanica, L. micans, L. rotundata, Malva micans, Olbia micans, Olbia triloba

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky 0,6 - 1 (i 1,5)m. Listy jsou dlouhé 2 - 6 (i 7)cm a široké 2 - 5 (i 8)cm. Květenství je (1 -) 2 - 4 (i 5)tičetné, vlastní květy mají korunní lístky délky 2 - 4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. agrigentina/Malva agrigentina - endemit Itálie
- subsp. pallescens

Lavatera trimestris (Slézovec tříměsíční)

synonyma: Althaea africana, Althaea trimestris, L. africana, Malva trimestris, Stegia trimestris

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Connecticut, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Libanon, Maroko, Missouri, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Texas, Tunisko, Turecko, Vermont

Roste ve středozemí v podobě vzpřímené od báze větvené jednoletky. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,5 - 0,6 (i 1,2)m a šířky 45cm. Povrch je řídce ochlupený. Palisty jsou kopinaté až vejčité, dlouhé 5 - 8mm a široké 4 - 6mm. Listy jsou střídavé, vejčitě kulaté, mělce 3 - 5 (i 7)milaločnaté, řídce ochlupené, dlouhé 3 - 10cm, široké 2 - 9cm a řapíky jsou dlouhé 5 - 15cm. Kvete v paždí listů samostatnými růžovými květy podobnými ibišku zpravidla na dlouhé stopce, kalich je ochlupený, dlouhý 1 - 1,5cm, laloky jsou široké 5mm, koruna kolovitá, průměru 5 - 7cm, korunní lístky jsou obvejčité, růžové, dlouhé (2,5 -) 3 - 4 (i 5,5)cm, široké 3 - 4cm a mělce vykrojené. Plod tvoří 10 - 15 žebernatých plůdků obsahující tmavě hnědá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Mont Blanc' - výška 50cm; květy bílé
- 'Mont Rose' - výška 50cm; květy růžové
- 'Pink Beauty' - výška 70cm; květy světle růžové
- 'Ruby Regis' - výška 50cm; květy tmavě růžové
- 'Silver Cup' - výška 50cm; květy růžové
- 'Twins Hot Pink'

Potřebuje plné slunce a suchou půdu.

Množí se semeny.

Lavatera valdesii

Lavatera venosa

Lavatera vidali

Další informace:
http://botany.cz/cs/lavatera-acerifolia/
http://kvetiny.atlasrostlin.cz/lavatera-maritima
http://skalnickar.blog.cz/0812/lavatera-thuringiaca
http://www.garten.cz/a/cz/4914-lavatera-thuringiaca-slezovec-durynsky/