Bocconia

čeleď: Papaveraceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest italského botanika jménem Paolo Boccone (1633 - 1704). Roste v tropické Americe v podobě byliny, keře nebo i nízkého stromu. Větve jsou řídké, při poranění roní žlutou až oranžovou tekutinu. Listy jsou peřenolaločné až celokrajné a seskupené na koncích větví. Květenstvím je terminální lata, vlastní květy jsou drobné, mají 2 kališní lístky, korunní nejsou, mají 8 - 24 tyčinek a vejčité semeníky na dlouhé stopce. Plodem je pukavá eliptická tobolka obsahující obvykle 1 semeno s míškem.

Bocconia arborea

oblasti: J Mexiko, Střední Amerika, Střední Mexiko

Roste od Mexika po střední Ameriku v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 2,5 - 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou dlouhé do 45cm, široké 30cm, na spodní straně plstnaté, peřenoklané, laloky úzce kopinaté, pilovité, špičaté a dlouhé do 15cm. Květenstvím je klasovité až latnaté, terminální, dlouhé do 20cm, vlastní květy jsou drobné, kališní lístky dlouhé 1 - 1,2cm, tyčinek mají 12 a stopka je dlouhá do 1cm. Plodem je eliptická tobolka délky 0,7 - 1cm.

Bocconia frutescens

synonyma: B. frutescens f. glaucescens, B. frutescens f. subtomentosa, B. frutescens var. cernua, B. frutescens var. glaucescens, B. frutescens var. subtomentosa, B. glauca, B. quercifolia, B. sinuatifolia, B. subtomentosa

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Peru, Portoriko, Venezuela

Roste od Mexika po Kolumbii a Peru v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6 (i 7,5)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Při poranění roní oranžovou tekutinu. Listy jsou střídavé, řapíkaté, vejčité, peřenoklané či hluboce laločnaté, báze je tupá, délka dosahuje (5 -) 10 - 30 (i 50)cm, šířka (3,5 -) 7 - 23 (i 28)cm, laloky jsou tupé, šedozelené a vykrajované. Květenstvím je pyramidální, latnaté, dlouhé 20 - 60cm, listeny jsou špičaté, dlouhé 2 - 5mm, vlastní květy mají 2 kališní bělavé lístky délky 0,8 - 1cm a 8 - 16 tyčinek. Plodem jsou eliptické tobolky, dlouhé 0,6 - 1,2cm a mají 1 černé semeno délky 6 - 7mm a šířky 3 - 3,5mm.

Vyhovují ji vlhké křoviny nebo lesy, příležitostně i louky či okraje cest.

Bocconia glaucifolia

synonyma: B. integrifolia f. mexicana subf. glaucescen, B. integrifolia var. mexicana

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě keře. Dorůstá výšky 3,5m. Listy jsou obkopinaté, zvlněné, špičaté nebo i tupé, dlouhé 10 - 30cm, široké 3 - 8cm, spodní strana je nasivělá a řapíky jsou dlouhé. Kvete v převislé bohaté latě s délkou do 35cm, vlastní květy mají špičaté kališní lístky délky 1cm, 12 tyčinek a stopky délky do 1cm.

Bocconia gracilis

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické, špičaté, pilovité, holé, zelené, dlouhé 8 - 25cm, široké 3 - 9cm, řapíkaté a na spodní straně plstnaté. Kvete v bohaté stopkaté latě dlouhé do 20cm, vlastní květy mají špičaté kališní lístky s délkou 1cm a 12 tyčinek.

Bocconia hintoniorum

Bocconia integrifolia
synonyma: B. frutescens var. integrifolia, B. integrifolia var. peruviana, B. integrifolia var. seleri, B. pearcei

oblasti: Bolívie, Kolumbie, Peru

Roste v Kolumbii, Bolívii a Peru v podobě bohatě větveného keře až stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Listy jsou podlouhlé, celokrajné, tupé nebo špičaté, pilovité až mělce laločnaté, dlouhé do 30cm, široké 10cm a spodní strana je plstnatá. Kvete v hroznech nebo latech s délkou do 35cm, kališní lístky jsou dlouhé 1cm a tyčinek má 10. Plodem je eliptická tobolka délky 1,2cm.

Bocconia latisepala

Bocconia macbrideana

Bocconia oblanceolata

Bocconia pearcei

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Ekvádoru v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou hluboce laločnaté, vlastní laloky špičaté, pilovité a na spodní straně plstnaté. Květenstvím je 40cm lata tvořená květy s 1 - 1,2cm dlouhými kališními lístky a 20ti tyčinkami. Plodem je 1cm dlouhá tobolka.

Bocconia pubibractea

Bocconia vulcanica
synonyma: B. oblanceolata

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 3 - 8m. Listy jsou obkopinaté, špičaté,

pilovité, zelené, dlouhé 10 - 35cm a široké 5 - 11cm. Květenstvím je bohatá lata tvořená květy s ocasovitými kališními lístky o délce 1cm, 10 - 15ti tyčinkami a stopkami délky 5mm. Plodem je eliptická 1cm dlouhá tobolka.

Další informace:
http://botany.cz/cs/bocconia-frutescens/
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1637

https://www.rostliny.net/