Francoa (Frankoa)

čeleď: Amaryllidaceae

Roste pouze v Čile jako trvalka. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou přízemní v růžici, tmavězelené, vejčité a mělce laločnaté. Květenstvím je vzpřímený hrozen či klas na konci vzpřímeného květního stonku, vlastní květy jsou 4četné, zvonkovité, bílé, růžové nebo až červené s tmavší skvrnou na bázi korunních lístků.

Vyhovuje ji chráněné místo na plném slunci nebo v polostínu a vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

Francoa appendiculata

synonyma: F. appendiculata f. albida, F. appendiculata f. violacea, F. sonchifolia var. appendiculata

oblasti: Čile

Roste pouze v Čile. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou přízemní, tmavězelené, vejčité a mělce laločnaté. Květenstvím je vzpřímený hrozen na konci vzpřímeného květního stonku, barva květů je v odstínech růžové.

Francoa ramosa

synonyma: F. alba, F. glabrata, F. sonchifolia var. glabrata, F. sonchifolia var. ramosa

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě trsnaté trvalky. Dorůstá výšky 1m a šířky 30cm. Listy jsou přízemní a kopinaté. Kvete bílými květy s tmavě růžovými skvrnami na bázi.

Francoa sonchifolia

synonyma: F. appendiculata var. sonchifolia, F. lyrata, F. rupestris, F. sonchifolia var. rupestris, Gunnera sonchifolia, Panke sonchifolia

oblasti: Čile

Roste v Čile jako trvalka. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou přízemní, v růžici, obvejčité až vejčité, svrasklé a tmavězelené. Stonky jsou vzpřímené a řídce větvené. Kvete růžovými květy s tmavšími skvrnkami na vnitřní straně. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Rogerson's Form'