

Chrysogonum

čeleď: Asteraceae

Roste v USA jako trvalka. Pod zemí vytváří dlouhý plazivý oddenek. Stonky jsou přímé. Listy jsou vstřícné a srdčité. Květenstvím je žlutý úbor s 5ti širokými korunními lístky.

Množí se semeny a dělením oddenků.

Chrysogonum perrieri

synonyma: *Wedelia perrieri*

Chrysogonum virginianum (Ostálka viržinská)

synonyma: *C. virginianum* var. *dentatum*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New York, Ohio, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA kobercových trsnatých porostech. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Pod zemí vytváří oddenky. Listy jsou vstřícné, mírně vejčité, ochlupené, na okraji vroubkované a řapíkaté. V teplých zimách nemusejí opadat. Kvete žlutými samostatnými nebo párovitými květy v úboru s 5ti kopinatými okvětními lístky, zákrovní lístky jsou 2řadé, dlouhé 0,7 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'André Viette' - půdokryvná; výška 10cm
- var. *australe*
- var. *brevistolon*
- var. *virginianum*

Vyhovuje jí vlhká kyselá půda bohatá na živiny, chladno a stín (při dostatku vláhy i plné slunce). Je plně mrazuvzdorná do -23°C.

Množí se semeny nebo dělením.

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Chrysogonum.htm>

<https://www.rostliny.net/>