

Bignonia (Trubač)

čeleď: Bignoniaceae

Rod byl pojmenován na počest pana jménem Jean-Paul Bignon. Roste v USA v podobě stálezelené až poloopadavé dřevité liány až pnoucího keře. Listy jsou vstřícné, zpeřené, tvořené 2 - 3mi páry lístků. Květy jsou zvonovité, trubkovité až nálevkovité.

Vyhovuje ji plné slunce, teplo a vlhká dobré propustná půda bohatá na živiny. Na zimu je u nás nutné výhony zakopat do zeminy a schovat před mrazem.

Množí se semeny, hřížením nebo řízky.

Bignonia aequinoctialis

synonyma: *Anemopaegma tonduzianum*, *Arrabidaea guatemalensis*, *Arrabidaea isthmica*, *Arrabidaea pseudochica*, *B. aequinoctialis* f. *spectabilis*, *B. aequinoctialis* var. *spectabilis*, *B. hostmannii*, *B. incarnata*, *B. incarnata* var. *caribaea*, *B. nitidissima*, *B. picta*, *B. pilosa*, *B. sarmentosa*, *B. sarmentosa* var. *hirtella*, *B. spectabilis*, *B. villosa*, *Cydistia aequinoctialis*, *Cydistia aequinoctialis* var. *hirtella*, *Cydistia aequinoctialis* var. *sarmentosa*, *Cydistia amoena*, *Cydistia incarnata*, *Cydistia picta*, *Cydistia pubescens*, *Cydistia sarmentosa*, *Cydistia seemannii*, *Cydistia spectabilis*, *Levya nicaraguensis*, *Macfadyena bifolia*, *Mansoa kerere* var. *incarnata*, *Pachyptera kerere* var. *incarnata*, *Tecoma villosa*, *Temnocydia aequinoctialis*, *Temnocydia spectabilis*

Bignonia binata

synonyma: *Adenocalymma ocositense*, *Arrabidaea schumanniana*, *B. eximia*, *B. noterophila*, *B. purpurea*, *B. umbellata*, *B. umbellulata*, *Clytostoma binatum*, *Clytostoma elegans*, *Clytostoma floridum*, *Clytostoma isthmicum*, *Clytostoma noterophilum*, *Clytostoma ocositense*, *Clytostoma purpureum*, *Petastoma laurifolium*, *Petastoma multiglandulosum*, *Petastoma ocositense*

Bignonia bracteomana

synonyma: *Cydistia bracteomana*, *Roentgenia bracteomana*

Bignonia callistegioides

synonyma: *B. lindleyi*, *B. picta*, *B. speciosa*, *Clytostoma uniflorum*, *Cuspidaria callistegioides*, *Pithecoctenium callistegioides*

oblasti: Argentina, Brazílie, Pákistán, Uruguay

Roste v Brazílii, Argentině a Uruguayi. Dorůstá výšky až 3,5m. Listy jsou husté a úzce eliptické. Kvete zpravidla párovými světle růžovofialový trubkovitými nálevkovitými zvonkovitými květy s 5ti laloky a tmavě růžovofialovými žilkami na vnitřní straně na převislé stopce. Plodem je tobolka.

Bignonia campanulata

synonyma: *Clytostoma campanulatum*, *Cuspidaria campanulata*, *Pithecoctenium tenuiflorum*

Bignonia capreolata (Trubač kozí)

synonyma: Anisostichus capreolata, Anisostichus capreolatus, Anisostichus crucigera, Batocydia capreolata, B. capreolata f. lutea, B. capreolata var. atro-sanguinea, B. crucigera, Campsis capreolata, Doxantha capreolata

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě liány. Dorůstá délky až 18 (i 20)m. Stonek má na řezu tvar kříže. Listy jsou vstřícné, tmavězelené (i načervenalé), zpeřené, tvořené 1 párem lístků, vlastní lístky jsou tmavězelené, dlouhé 5 - 8 (i 15)cm, báze srdčitá a na vrcholu je 3klanná úponka a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Kvete v 2 - 5tičetném úžlabním vrcholíku, vlastní květy jsou trubkovité až nálevkovité, žluté, oranžové až červené, vnitřní strana je bledší, dlouhé 4 - 5cm a stopky jsou dlouhé 2 - 4cm. Plodem je 2pouzdrá tobolka délky 10 - 17cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Atrosanguinea'/var. atrosanguinea - listy delší a užší; květy užší, tmavé, růžovofialovohnědé až načervenalé
- 'Dragon Lady' - tmavězelené listy; květy s oranžovým jícнем a korunou délky 5cm
- 'Jekyll' - koruna oranžová, z vnitřní strany žlutá
- 'Shalimar Red' - větší; květy červené, remontující
- 'Tangerine Beauty' - květy bohatší, oranžové až načervenalé
- 'Wabash County' - odolnější na mráz

Bignonia convolvuloides

synonyma: Clytostoma convolvuloides

Bignonia corymbosa

synonyma: B. coito, Macfadyena bangii, Macfadyena coito, Macfadyena corymbosa, Macfadyena laurifolia, Macfadyena orinocensis, Macfadyena ovata, Macfadyena platypoda, Macfadyena riparia, Phryganocydia coito, Phryganocydia coito var. platypoda, Phryganocydia corymbosa, Phryganocydia dipleuropus, Phryganocydia orinocensis, Phrygiobureua corymbosa, Spathodea coito, Spathodea corymbosa, Spathodea laurifolia, Spathodea orinocensis, Spathodea platypoda

Bignonia costata

synonyma: Clytostoma costatum

Bignonia cuneata

synonyma: Clytostoma cuneatum

Bignonia decora

synonyma: Anemopaegma decorum, Arrabidaea decora, Arrabidaea decora var. genuina, Arrabidaea decora var. macrophylla, Clytostoma decorum, Clytostomanthus decorus, Cydista decora

Bignonia diversifolia

synonyma: *Anemopaegma vargasianum*, *B. sagrana*, *B. vargasiana*, *Cydista diversifolia*, *Cydista vargasiana*, *Pleonotoma diversifolia*

Bignonia hyacinthina

synonyma: *Mussatia hyacinthina*, *Tynanthus hyacinthinus*

Bignonia lilacina

synonyma: *Cydista lilacina*

Bignonia longiflora

synonyma: *B. guayaquilensis*, *Macranthisiphon longiflorus*, *Pyrostegia longiflora*

Bignonia magnifica

synonyma: *Arrabidaea magnifica*, *Saritaea magnifica*

Bignonia microcalyx

synonyma: *B. microcalyx* var. *acuminata*, *Potamoganos microcalyx*

Bignonia neouliginosa

synonyma: *Phryganocydia uliginosa*

Bignonia nocturna

synonyma: *Osmhydrophora nocturna*, *Tanaecium nocturnum*

Bignonia phellosperma

synonyma: *Macfadyena phellosperma*, *Phryganocydia phellosperma*

Bignonia potosina

synonyma: *Arrabidaea potosina*, *Clytostoma mayanum*, *Cydista potosina*

Bignonia prieurei

synonyma: *Anemopaegma brachycalyx*, *B. brachycalyx*, *Micropaegma brachycalyx*, *Mussatia prieurei*, *Panterpa prieuri*

Bignonia pterocalyx

synonyma: *Clytostoma pterocalyx*

Bignonia purpurea

Bignonia ramantacea

synonyma: Clytostoma ramantaceum, Cuspidaria ramentacea, Lochmocydia ramentacea

Bignonia sciuripabula

synonyma: Arrabidaea sciuripabula, Clytostoma itatiaense, Clytostoma sciuripabulum, Clytostoma sciuripabulum var. longiflorum, Pithecoctenium sciuripabulum

Bignonia sordida

synonyma: Arrabidaea pullei, Arrabidaea sordida, B. sordida, Roentgenia sordida

Bignonia uleana

synonyma: Clytostoma oleanum, Macfadyena violacea

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=147>

<http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/bignonia-l-bignoniaceae-trubac/>

<http://www.stromy.info/bignonia-linne-%E2%80%93-bignoniaceae-%E2%80%93-trubac/>

<https://www.rostliny.net/>