

Arundinaria (Rákosovec)

čeleď: Poaceae

Po celý rok je zelený. Pochází z východního pobřeží Severní Ameriky, Himálaje a Číny. Dorůstá výšky 0,5 - 8m. Stébla jsou dutá s kolínky. Listy mají čárkovitý nebo kopinatý tvar. Semena tvoří pouze zřídkakdy.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a chladnější vzduch. Minimální teplota by neměl klesnout pod 5°C. Substrát potřebuje mít stále vlhký, ale na zimu zálivku omezte.

Množí se dělením trsů.

Arundina caespitosa

Arundina graminifolia

synonyma: Arundina affinis, Arundina bambusifolia, Arundina chinensis, Arundina chinensis var. major, Arundina densa, Arundina densiflora, Arundina graminifolia var. chinensis, Arundina graminifolia var. revoluta, Arundina maculata, Arundina meyenii, Arundina minor, Arundina philippii, Arundina pulchella, Arundina pulchra, Arundina revoluta, Arundina sanderiana, Arundina speciosa, Arundina speciosa var. sarasinorum, Arundina stenopetala, Bletia graminifolia, Cymbidium bambusifolium, Cymbidium meyenii, Cymbidium speciosum, Limodorum graminifolium, Ophrys arundinacea

oblasti: Vietnam

Arundinaria alpina

Arundinaria amabilis

Arundinaria angustifolia (Rákosovec úzkolistý)

Arundinaria appalachiana

oblasti: JV USA

Pochází z jihovýchodu USA z Apalačského pohoří. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 1,8)m. Průměr stébla je 2 - 6cm.

Arundinaria chino

Arundinaria disticha

Arundinaria gigantea

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Arundinaria graminea (Rákosovec trávovitý)

Arundinaria humilis (Rákosovec nízký)

Arundinaria japonica

synonyma: *Pseudosasa japonica*

Dorůstá výšky 4 - 6m.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín na chráněném místě. Půda by měla být stále mírně vlhká. Je mrazuvzdorný do -24°C, přesto je vhodné na zimu hodně zamulčovat.

Arundinaria jaunsarensis

Dorůstá výšky 2,5m. Má tmavé stonky.

Arundinaria murielae (Rákosovec žlutý)

Arundinaria nitida (Rákosovec purpurový)

Arundinaria pygmaea

synonyma: *Bambusa pygmaea*, *Sasa pygmaea*

Arundinaria simonii (Rákosovec Simonův)

synonyma: *Bambusa simonii*, *Pleioblastus simonii*

oblasti: Indie, Japonsko, Střední Asie

Pochází z Indie a Japonska. Dorůstá výšky až 8m. Průměr stébel je 2 - 3. Délka listů je 0,4 - 30cm a šířky 0,7 - 3cm. Mají jemně pilovitý okraj. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *variegatus*/'Variegata' - menší bíle pruhované listy

Arundinaria tecta

Arundinaria variegata

Arundinaria viridi-striata (Rákosovec zelenopruhý)

oblasti: Japonsko

Pochází z Japonska. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy mají délku 5 - 20cm a šířku 1,5 - 3,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Chrysophylla'
- var. vagans

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosovec>

<http://www.celysvet.cz/bambus.php>

<http://www.garten.cz/a/cz/4640-arundinaria-rakosovec/>

<http://www.svetpalem.cz/bambus-pseudosasa-japonica.php>

<https://www.rostliny.net/>