

Cavendishia

čeleď: Ericaceae

Roste v tropické střední a Jižní Americe v podobě stálezeleného stromu nebo keře (i epifytu). Borka je tenká a podélně praská. Listy jsou střídavé, jednoduché, tuhé, vejčité, celokrajné, kožovité a podvinuté. Květenství je úžlabní, hroznovité, opatřené listeny, vlastní květy jsou 5tičetné a koruna zvonkovitá nebo trubkovitá. Plodem je dužnatá kulovitá tmavěmodrá bobule obsahující mnoho malých semen.

Vyhovuje ji polostín, vlhko a kyselá půda bohatá na živiny.

Množí se řízků, semeny anebo hřížením.

Cavendishia aberrans

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Listy jsou mírně vejčité, zašpičatělé, lesklé, dlouhé 9,5 - 16cm, široké 4 - 7cm, na okraji mírně podvinuté, centrální žebro je z větší části zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,7cm. Květenství je 20 - 25tičetné, má délku 12 - 15cm, listeny délky do 1,1cm, vlastní květy mají 2cm stopky, listence, kalich délky 6 - 7mm a válcovitou korunu délky 4,1 - 4,6cm. Plody nejsou známy.

Cavendishia acuminata

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, S Andy

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,8m. Větvě jsou převislé, tmavězelené až hnědočervené a v mládí růžové. Listy jsou kopinaté, vejčité až podlouhlé, tlusté, při rašení růžovobronzové, později tmavězelené, lesklé a dlouhé 5 - 8cm. Kvete červenými až hnědými květy o délce 2cm v hroznech s červenými listeny a korunní lístky mají zelené špičky.

Cavendishia adenophora

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytický. Větvě má dlouhé do 2m a mohou být hranaté. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 3,5 - 16cm, široké 1,5 - 8cm a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,6cm. Květenství je 15 - 25tičetné, opatřené listeny délky do 6cm, vlastní květy mají listeny délky 2 - 6,5cm, stopky délky 0,5 - 1,7cm, listence dlouhé 3,5 - 7mm, kalich tmavě růžový, dlouhý 0,8 - 1,6cm a válcovitou růžovou korunu délky 1,6 - 2,8cm.. Plodem je jedlá bobule průměru min. 1,2cm.

Cavendishia albopicata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Větve má dlouhé do 1,5m. Kmínky mohou být žlutě ochlupené. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 10,7cm, široké 0,8 - 3cm, na okraji podvinuté, centrální žilka zapuštěná, ostatní vystouplé a řapíky jsou dlouhé do 5 mm. Květenství je 20 - 30tičetné, vřeteno dlouhé 9,5 - 12cm, listeny dlouhé 2 - 3,5cm, růžové, listence dlouhé 2 - 4mm, kalich dlouhý 6 - 7mm, koruna červená a dlouhá min. 2cm.

Cavendishia allenii

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 1m. Borka je červenohnědá až šedohnědá. Listy jsou eliptické, špičaté, centrální žilka zapuštěná, ostatní vyniklé, báze kulatá až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenstvím je 8 - 16tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 1,5 - 4 (i 6)cm, listeny jsou dlouhé 1,3 - 2cm, růžové, vlastní květy mají 1 - 3mm stopky, listence délky 1,1 - 1,7cm, kalich růžový, dlouhý 0,8 - 1,5cm a koruna světlezelená, na vrcholu žlutá a dlouhá 1,1 - 1,6cm s průměrem do 4mm. Plody mají průměr 1,5cm.

Cavendishia amoena

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Borka je šedohnědá. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté, špičaté nebo tupé, dlouhé 1 - 3,5cm, široké 0,7 - 1,5cm, báze je tupá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je 6tičetné, listeny má dlouhé do 1,6cm, vřeteno je dlouhé pouze 1cm, vlastní květy mají listeny dlouhé 2cm, tmavěfialové, stopky dlouhé 5 - 8mm, kalich válcovitý, dlouhý 1,5mm, koruna válcovitá, bledě fialová a dlouhá 1,5cm.

Cavendishia amplexa

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté, ocasovité, dlouhé 7 - 12cm, široké 1,5 - 4,5cm a mají řapíky délky 5 - 7mm. Květenství je 3 - 5tičetné, vřeteno dlouhé 1 - 2cm, listeny dlouhé 2,2 - 2,5cm v barvě růžové a červené, vlastní květy mají délku 3 - 4mm, listence jsou dlouhé 1,5 - 1,8cm, kalich má délku 1cm, koruna je trubkovitá, růžovočervená a dlouhá 1,8cm.

Cavendishia angustifolia

synonyma: C. purdiei

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, může být i epifytický. Dorůstá výšky až 2m. Větve jsou červenohnědé a v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, zašpičaté, celokrajné (i vroubkovité), dlouhé 1,5 - 8cm, široké 0,4 - 2,5cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm. Květenství je 6 - 12tičetné, vřeteno má délku 1 - 1,5cm, listeny jsou dlouhé 1,7cm v barvě růžovofialové, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, listence 1mm, koruna válcovitá, dlouhá 1,3cm, u báze má barvu růžovofialovou nebo navíc nazelenalou a vrchol bělavý. Plody jsou tmavěmodré a v průměru mají 1cm.

Cavendishia antioquiensis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou kožovité, vejčité, špičaté, celokrajné, u báze mírně podvinuté, dlouhé 12 - 17cm, široké 6,5 - 10,5cm, báze kulatá až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,1cm. Květenství je úžlabní, hroznovité, 8 - 13tičetné, vřeteno hranaté a dlouhé 6 - 7cm, růžové, listeny dlouhé 3 - 4,5cm, tmavěčervené, vlastní květy mají 1cm stopky, listence délky 1,5mm, zelený nebo narůžovělý kalich délky 1 - 1,5cm, koruna válcovitá, bílá a dlouhá 3,2 - 3,6cm.

Cavendishia arizonensis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 7 - 13,5cm, široké 2 - 6cm a řapíky jsou dlouhé 7mm. Květenství je lepivé, max. 82četné, vřeteno dlouhé 27cm, listeny dlouhé 2cm, vlastní květy mají 1,2 - 1,5cm stopky, listence délky 4mm, kalich lepivý, dlouhý 6 - 7mm a koruna je válcovitá, dlouhá 1,8cm.

Cavendishia atroviolacea

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 3 - 18cm, široké 1 - 6cm a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,5cm. Květenství je 7 - 30četné, vřeteno je lepkavé, dlouhé 3 - 9cm, růžové, vlastní květy mají listeny délky 2 - 5cm v barvě tmavěfialové až hnědorůžovofialové, stopky mají délku 0,6 - 1,6cm, listence dlouhé 1 - 6mm a koruna bílo růžovofialová a dlouhá 2 - 4,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. atroviolacea - Panama, Kostarika; řapíky dlouhé 0,4 - 1,5cm; květenství má vřeteno délky 2 - 5mm, listeny dlouhé 2 - 5cm, tmavěfialové nebo hnědorůžovofialové, listence dlouhé 2 - 5,5mm, kalich dlouhý 0,6 - 1,4cm a koruna dlouhá 2,3 - 4,5cm
- var. folsomii - Panama; řapíky dlouhé 0,7 - 1cm; květy mají listeny délky 2 - 2,5cm, modrorůžovofialové, listence dlouhé 1 - 1,5mm, kalich dlouhý 5,5 - 8,5mm a koruna dlouhá 1,8 - 2,1cm

Cavendishia aurantiaca

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5m. Listy kožovité, mírně vejčité, špičaté, dlouhé 3,5 - 11cm, široké 1,5 - 4,5cm, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenství je 9 - 13tičetné, vřeteno dlouhé 3,5 - 5cm, květy mají listeny délky 1,7 - 3cm v barvě červenooranžové, květy mají stopky dlouhé 0,6 - 1,3cm, listence dlouhé 0,5mm, kalich dlouhý 4 - 5mm, koruna válcovitá, dlouhá 1,5cm, u báze oranžová a vrchol bílý.

Cavendishia awa

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě epifytického keře. Listy jsou kožovité, mírně vejčité, špičaté, dlouhé 5,5 - 23,5cm, široké 2 - 10cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je hroznovité, 7 - 35tičetné, vrteno dlouhé 4 - 12,5cm, listeny dlouhé 2mm, květní jsou dlouhé 4mm, stopky dlouhé 0,7 - 1,1cm a koruna válcovitě baňkovitá, dlouhá 7 - 9mm, u báze bílá, na konci růžovofialová.

Cavendishia axillaris

synonyma: *C. gaultherioides*

oblasti: Kolumbie, Kostarika, Panama

Roste v Kostarice, Panamě a Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Listy jsou široce obvejčité, tupé, dlouhé 4,5 - 17cm, široké 2,5 - 11cm a řapíky dlouhé 1,5 - 5mm. Květenství se objevuje po 1 (i 2 - 5)ti ks, je 5 - 47mičetné, vrteno dlouhé 1 - 8cm, listeny dlouhé 0,7 - 1,3cm, růžové až růžovočervené, vlastní květy mají 1mm stopky, listence dlouhé 5 - 9mm, růžové až růžovočervené, kalich dlouhý 4,5 - 7,5mm, koruna válcovitá, dlouhá 0,6 - 1cm a u báze bílá nebo nazelenalá. Plody mají v průměru 1cm.

Cavendishia barnebyi

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 0,8 - 1,8cm, široké 0,3 - 1,3cm, okraj mírně podvinutý a řapíky dlouhé 1 - 2mm. Květenství je 4 - 12tičetné, vrteno dlouhé 1,2 - 4,5cm, listeny opadavé, dlouhé 3,5mm, růžovofialové, kalich tmavěfialový, dlouhý 3mm, koruna válcovitá, světlefialové a dlouhá 1cm.

Cavendishia bomareoides

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 7 - 24cm, široké 3 - 9cm, báze prakticky srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenství je 20 - 30tičetné, vrteno dlouhé 6 - 12cm, listeny dlouhé 2,2 - 3,5cm, stopky dlouhé 0,6 - 1,2cm, listence dlouhé 2 - 5mm, kalich dlouhý 7- 8mm a koruna válcovitá, dlouhá 2,2 - 3cm, bílá.

Cavendishia bracteata

synonyma: *Andromeda trinervis*, *C. acuminata*, *C. beckmanniana*, *C. benthamiana*, *C. campii*, *C. chiapensis*, *C. cordata*, *C. cordifolia*, *C. costaricensis*, *C. crassifolia*, *C. dichroa*, *C. dugandiana*, *C. durifolia*, *C. gracilis*, *C. guatemalensis*, *C. guatemalensis* var. *chiapensis*, *C. hartwegiana*, *C. hendersonii*, *C. hoffmannii*, *C. killipii*, *C. latifolia*, *C. lehmannii*, *C. melastomoides*, *C. miconioides*, *C. montana*, *C. peruviana*, *C. pilgeriana*, *C. pseudopubescens*, *C. pubescens* var. *microphylla*, *C. rigidifolia*, *C. sandemanii*, *C. scabriuscula*, *C. secundiflora*, *C. sillarensis*, *C. skutchii*, *C. smithii*, *C. splendens*, *C. strobilifera*, *C. tolimensis*, *C. tubiflora*, *C. ulbrichiana*, *C. ulei*, *C. veraguensis*, *C. warscewiczii*, *Chupalon acuminatum*, *Chupalon benthamianum*, *Chupalon bracteatum*, *Chupalon cordifolium*, *Chupalon crassifolium*, *Chupalon hartwegianum*, *Chupalon latifolium*, *Chupalon laurifolium*, *Chupalon pseudopubescens*, *Chupalon scabriusculum*, *Chupalon splendens*, *Chupalon*

strobiliferum, Chupalon veraguense, Chupalon warscewiczii, Polyboea crassifolia, Proclesia acuminata, Proclesia benthamiana, Proclesia bracteata, Proclesia cordata, Proclesia cordifolia, Proclesia hartwegiana, Proclesia melastomoides, Proclesia pseudo-pubescens, Proclesia scabriuscula, Proclesia splendens, Proclesia strobilifera, Proclesia veraguensis, Proclesia warscewiczii, Thibaudia acuminata, Thibaudia bracteata, Thibaudia cordifolia, Thibaudia crassifolia, Thibaudia hendersonii, Thibaudia melastomoides, Thibaudia mexicana, Thibaudia pubescens var. parvifolia, Thibaudia scabriuscula, Thibaudia strobilifera

oblasti: Bolívie, J Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Venezuela

Roste od Mexika po Panamu a dále od Kolumbie po Bolívii v podobě keře (i šplhavého). Dokáže růst i jako epifyt. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 4)m. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou střídavé, mírně vejčité, celokrajné, špičaté, mohou být u žilnatiny ochlupené, dlouhé (2,5 -) 4 - 15 (i 22)cm, široké (1 -) 1,5 - 5 (i 11)cm široké, báze klínovitá (i srdčitá) a řapíky jsou dlouhé (0,3 -) 0,5 - 1,1 (i 1,7)cm. Květenstvím je 6 - 20 (i 40)tičetný hrozen, tvořený květy s listeny o délce do 3 (i 4)cm v barvě růžové nebo červené, stopky květů mají délku 0,5 - 1,5 (i 2)cm, kalich má srostlý o délce 4 - 6 (i 9)mm, koruna je válcovitá, 5tíhranná, dlouhá 1,4 - 2,3 (i 2,8)cm v barvě růžové až červené s bílým koncem a 1 - 2mm bílými cípy. Plodem je kulovitá růzovofialová až temněmodrá bobule průměru 0,8 - 1,4cm.

Vyhovují ji vlhké horské lesy.

Cavendishia callista

synonyma: C. amalfiensis, C. bullata, C. duidae, C. gleasoniana, C. hispida, C. longiflora, C. phelpsia, C. praestans, C. salicifolia

oblasti: Ekvádor, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Kostarika, Nikaragua, Panama, Venezuela

Roste od Guatemaly po sever Jižní Ameriky v podobě keře (i šplhavého), který může být i epifytem. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Borka je hnědá až červenohnědá. Listy jsou vejčité (i obvejčité), špičaté, dlouhé 4,5 - 35cm, široké 2 - 13cm a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2,2cm. Květenství je 3 - 52četné, vrteno má délku 4 - 20cm, je růžové, listeny dlouhé 1,5 - 6cm, stopky mají délku 0,6 - 2cm, listence jsou dlouhé 1 - 8mm, kalich má délku 0,5 - 1,1cm, koruna je válcovitá, lepivá, dlouhá 1,5 - 4,2cm, trubka bílá až šedobílá a narůžovělá.

Cavendishia calycina

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 5m. Listy jsou kožovité, eliptické, špičaté, dlouhé 6 - 17,5cm, široké 2 - 6,5cm, centrální žilka vystouplá, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,3cm. Květenství je 6 - 30tičetné, listeny dlouhé do 2cm, vlastní květy mají listeny délky 2 - 3,6cm, stopky dlouhé 0,3 - 1,3cm, listence dlouhé 4 - 9mm, kalich holý, světlezelený, narůžovělý, dlouhý 0,7 - 1,5 a koruna je válcovitá, tmavěrůžová až červená, na vrcholu bílá a dlouhá 1,8 - 3,1cm.

Cavendishia capitulata

oblasti: Kolumbie, Kostarika, Panama

Roste v Kostarice, Panamě a Kolumbii obvykle jako epifytický keř. Větve mohou být ochlupené (i žláznaté, dlouhé 0,5 - 1,5 (i 2)m. Listy jsou střídavé, obvejčité až vejčité, celokrajné, zakulacené, holé, dlouhé 1,5 - 3 (i 6)cm, široké 0,5 - 1,5 (i 3)cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 (i 7)žiliek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3 (i 5)mm. Květenství je 3 - 6 (i 7)mičetné, vlastní květy mají obvejčité listeny růžové až růžovofialové barvy, délky 1,1 - 1,4 (i 1,9)cm, stopky jsou dlouhé 1 - 2 (i 5)mm, kalich je srostlý, dlouhý 4,5 - 7,5mm, koruna je válcovitá, dlouhá 1 - 1,6cm, bílá a růžová. Plody jsou kulovité, růžovofialové až temněmodré bobule průměru 5 - 9mm.

Vyhovují ji vlhké mlžné lesy.

Cavendishia caudata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 10 - 12,5cm, široké 3 - 4cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství je 10tičetné, vřeteno dlouhé 2,5cm, listeny dlouhé 0,8 - 1,2cm, květy mají stopky délky 2 - 3mm, listence dlouhé 8 - 9mm a korunu válcovitou, bílou, dlouhé 0,7 - 1cm.

Cavendishia caulialata

synonyma: *C. alata*, *Proclesia alata*, *Thibaudia alata*, *Thibaudia caulialata*

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Dorůstá výšky několika m. Větve jsou křídlaté. Listy jsou podlouhlé, špičaté, drobně zoubkované, kožovité, lesklé, dlouhé do 10cm, široké 5cm a báze je srdčitá. Květenstvím je hrozen, který může být i párovitý a listeny jsou ochlupené.

Cavendishia chiriquiensis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou mírně vejčité, špičaté až ocasovité, dlouhé 4,5 - 9cm, široké 1,5 - 3,5cm, žilnatina je zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství je lepivé, 6 - 12tičetné, vřeteno dlouhé 1,5 - 10,5cm, listeny dlouhé 1,5cm v barvě růžové až červené, vlastní květy mají stopky délky 4 - 7mm, listence jsou dlouhé 1 - 4mm, kalich je dlouhý 4mm, růžový a koruna je modrorůžovofialová až načervenalá, dlouhá 1,6 - 2,4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bullata* - listy puchýřnaté; květenství má vřeteno délky 2,5 - 10,5cm
- var. *chiriquiensis* - listy bez puchýřů; květenství má vřeteno délky 1,5 - 4,5cm

Cavendishia chlamydantha

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Listy jsou eliptické, ocasovité, dlouhé 5 - 17cm, široké 3 - 7cm a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství je 20 - 30tičetné, listeny dlouhé do 1,5cm, vřeteno je dlouhé 8 - 10cm, listeny dlouhé 3 - 3,5cm, vlastní květy mají stopky dlouhé 5 - 6mm, listence

dlouhé 8mm, kalich dlouhý 3,1cm a koruna je válcovitá, dlouhá 3,6cm.

Cavendishia chocoensis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou mírně vejčité, ocasovité, dlouhé 4 - 15,5cm, široké 1 - 6,5cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Květenství je 40 - 60tičetné, vřeteno dlouhé 10 - 18cm, listeny jsou dlouhé 1,1cm, vlastní květy mají 6,5mm stopky, kalich dlouhý 3- 4mm a korunu baňkovitou, dlouhou 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. chocoensis - květenství holé
- var. hirsuta - květenství bíle ochlupené

Cavendishia ciliata

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 5 - 19cm, široké 2 - 8cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenství je 18 - 29tičetné, vřeteno dlouhé 6 - 8cm, vlastní květy mají listeny dlouhé 1,1 - 2,6cm, stoky dlouhé 0,7 - 1,6cm, kalich dlouhý 4,5 - 7,5mm a koruna je růzovofialová, dlouhá 1,8 - 2,2cm.

Cavendishia coccinea

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 3,2 - 8,3cm, široké 1,3 - 3cm, žilnatina zapuštěná, centrální žilka vystouplá a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenství je 5 - 8 (i 12)tičetné, vřeteno dlouhé 5,5 - 7,5cm, u květů listeny dlouhé 2,5 - 3,5cm, červené, stopky dlouhé 3 - 7mm, listence dlouhé 2 - 3mm, kalich dlouhý 5 - 7mm a koruna válcovitá a dlouhá 3 - 3,7cm.

Cavendishia colombiana

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 12 - 20,5cm, široké 5,5 - 12,5cm a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenství je 3 - 12tičetné, listeny dlouhé 4mm, vlastní květy mají listeny délky 2,8 - 4,6cm, stopky dlouhé 0,8 - 1,5cm, kalich zelený, průsvitný, dlouhý 1 - 1,3cm a koruna je válcovitá, dlouhá 3,3 - 3,8cm.

Cavendishia compacta

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Listy jsou kožovité, eliptické, dlouhé 9,5 - 19cm, široké 3 - 10,5cm, ocasovité, žilnatina na spodní straně vystouplá a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je 10 - 20tičetné, vřetenem dlouhé 6 - 12,5cm, vlastní květy mají listeny dlouhé 2 - 3cm, stopky dlouhé 2,5 - 6mm, listence dlouhé 0,3 - 1,3cm, kalich je holý, dlouhý 0,6 - 1,6cm a koruna je válcovitá, bílá a načervenalá, dlouhá 1,8 - 2,4cm.

Cavendishia complectens

synonyma: Chupalon complectens

oblasti: Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Peru

Roste v Nikaraguy, Kostarice, Panamě a Kolumbii. Zpravidla roste jako epifytický keř. Dorůstá výšky až 2m. Listy jsou střídavé, široce vejčité, celokrajné, tupě zakulacené, holé, dlouhé 7 - 16 (i 18)cm, široké 5,5 - 10 (i 13)cm a téměř přisedlé. Květenstvím je 8 - 80tičetný hrozen s délkou 2 - 9 (i 20)cm tvořený 5tičetnými květy s růžovými až červenými listeny délky 1 - 2cm, stopky jsou dlouhé do 1cm, kalich má délku 0,5 - 1cm, koruna je válcovitá, dlouhá kolem 1cm a v průměru má 4 - 6,5mm. Plodem je růžovofialová až temněčerná bobule průměru 1,1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. complectens/Chupalon complectens - Nikaragua až Kolumbie; listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 1 - 2cm; květy mají stopky délky 0,2 - 1,1cm, listence dlouhé 1 - 7mm
- subsp. striata/C. striata - Kolumbie až Peru; listy dlouhé 5 - 18cm, široké 4 - 17cm; květní listeny široce vejčité, kožovité, dlouhé 0,4 - 1,3cm, stopky dlouhé 0,5 - 7mm, listence 0,2 - 1cm
- var. cylindrica - Kolumbie; květenství husté, kompaktní, vlastní květy mají listeny dlouhé 0,7 - 1,3cm, stopky jsou dlouhé 1mm, listence dlouhé 0,4 - 1cm, kalich dlouhý 4 - 9mm, koruna bílá, dlouhá 0,7 - 1,1cm
- var. striata - Kolumbie až Peru; květenství řídké, květy mají listeny délky 0,4 - 1,1cm, stopky jsou dlouhé 1 - 7mm, listence dlouhé 1,5 - 6mm, kalich má délku 5 - 7mm, koruna je dlouhá 6,2 - 8mm

Cavendishia confertiflora

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 8 - 20cm, široké 3 - 7cm, centrální žilka vystouplá, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Květenství je válcovité, 13 - 32četné, vřetenem má délku 3 - 6,5cm, vlastní květy mají listeny délky 1 - 1,7cm, stopky 2mm, listence dlouhé 4 - 5mm v barvě růžové až červené, kalich je dlouhý 7 - 9,5mm a koruna je lahvovitá, dlouhá 1,3 - 1,7cm, tmavěružová.

Cavendishia copeensis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou kožovité, eliptické, dlouhé, špičaté, 10,5 - 21cm, široké 4 - 8cm, špičaté, centrální žilka vystouplá, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2,4cm. Květenství je 8 - 20tičetné, vřetenem dlouhé 2,5 - 9cm, květy mají listeny délky 3cm, barvy růžové, stopky dlouhé 1,5cm, listence 3 - 4mm, kalich je dlouhý 3 - 4mm, koruna válcovitá, bílá až růžová či červená, na vrcholu bílá a dlouhá 2,6cm.

Cavendishia corei

Cavendishia cuatrecasasii

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 2 - 6m. Listy jsou kožovité, eliptické, špičaté, dlouhé 11 - 25cm, široké 4,5 - 11cm a řapíky jsou dlouhé 0,9 - 1,8cm. Květenství je 8 - 15tičetné, má 1,5 - 3,5cm vřeteno, vlastní květy mají listeny dlouhé 3 - 4,7cm, stopky 0,7 - 1,5cm, kalich dlouhý 1,1 - 1,5cm a koruna je válcovitá, dlouhá 2,4 - 3,3cm.

Cavendishia darienensis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytu. Listy jsou eliptické, dlouhé 5,5 - 10cm, široké 2,5 - 4,5cm, báze je prakticky srdčitá a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství je 26 - 28mičetné, dlouhé 8,5 - 9,5cm, listeny dlouhé 1,5 - 2,3cm, stopky dlouhé 1 - 3, listence dlouhé 0,8 - 1,6cm kalich dlouhý 8mm a koruna je dlouhá 1,1cm.

Cavendishia davidsei

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě v podobě epifytického keře. Listy jsou kožovité, eliptické, špičaté, dlouhé 2 - 6cm, široké 1,5 - 2,5cm, centrální žilka vystouplá, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, 8 - 32četné, vřeteno má délku 3 - 9cm, vlastní květy mají růžové až červené listeny délky 1,8 - 2,5cm, stopky jsou dlouhé 1cm, listence dlouhé 2 - 3mm, kalich dlouhý 5mm, koruna válcovitá, tmavěfialová až růžovofialová a dlouhá 1,2cm.

Cavendishia dendrophila

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 5 - 7cm, široké 1,6 - 2,6cm, centrální žilka vystouplá, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 3,5 - 5,5cm. Květenství je 5 - 7mičetné, vřeteno dlouhé 1,3 - 2,5cm, vlastní květy mají listeny délky 1,4 - 1,7cm, stopky délky 3 - 4mm, listence dlouhé 2mm a koruna je válcovitá, dlouhá 1,7cm.

Cavendishia divaricata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře (i epifytického). Dorůstá výšky do 5m. Listy jsou kožovité, kopinaté, špičaté, dlouhé 9 - 26, široké 4,5 - 10,5cm, žilky na horní straně zapuštěné, na spodní vystouplé a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,2cm. Květenství je latnaté, 50 - 300četné, listeny kožovité, vřeteno má délku 10 - 36cm, květy mají listeny dlouhé 0,9 - 2cm, stopky dlouhé 1,4 - 1,7cm listence dlouhé 5 - 6mm, kalich dlouhý 4 - 6mm a koruna je prakticky válcovitá, dlouhá 2 - 2,7cm.

Cavendishia dulcis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou 5tikřídle a hladké. Listy jsou eliptické, zaoblené, dlouhé 8 - 23cm, široké 4 - 19cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry zapuštěných žilek, báze je objímavá, srdčitá a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Květenství je latnaté, až 850tičetné, vřetenem má délku do 53cm, primární větve jsou dlouhé 20 - 28cm, sekundární až 13cm, květy mají opadavé listeny délky 6mm, stopky délky 6 - 7mm, listence opadavé, dlouhé 3mm, korunu lahvovitou, dlouhou 1,3cm a v barvě růžovofialovozelené.

Cavendishia endresii

synonyma: *C. glutinosa*, *Chupalon endresii*

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě keře, který může být i epifytický. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 3,5 - 11cm, široké 1 - 2cm, žilnatina bývá vystouplá a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 7mm. Květenství je 3 - 8mičetné, vřetenem dlouhé 1 - 3cm, vlastní květy mají listeny dlouhé 1,5 - 2,5cm, barvu růžovou, stopky délky 3,5 - 9mm, listence délky 1mm, kalich je růžový až načervenalý, dlouhý 3 - 4mm, koruna je růžovofialová až načervenalá, dlouhá 1 - 2cm a laloky jsou bílé s růžovým okrajem. Plody mají v průměru 1,1cm.

Cavendishia engleriana

synonyma: *C. dodsonii*, *C. marginata*

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Ekvádoru, Peru a Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytický. Větve mají délku do 3m a mohou být hranaté. Listy jsou kožovité, mírně obkopinaté, špičaté, dlouhé 6,5 - 17,5cm, široké 2 - 7cm, okraj může být podvinutý, žilnatina je zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,6cm. Květenství je 4 - 14tičetné, má až 6cm listeny, vřetenem je dlouhé 1 - 2,5cm, květy mají listeny délky 3,5 - 5cm v barvě bílé nebo narůžovělé, stopky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm, listence dlouhé 0,4 - 1,4cm, kalich růžovočervený, dlouhý 0,7 - 1,3cm a koruna válcovitá, dlouhá 2,7 - 3,8cm, bílá nebo narůžovělá. Plody mají v průměru 1,5cm a jsou tmavěmodré. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ecuadorensis* - Ekvádor, Peru; listy dlouhé 6 - 18cm, široké 1,2 - 3,5cm, řapíky dlouhé 6 - 8mm; květenství má listeny délky 2,5 - 3,2cm, vřetenem délky 1 - 1,4cm, květní listeny dlouhé 3 - 3,6cm, stopky dlouhé 5 - 8mm, listence 4 - 7mm, koruna délky 2,7 - 3cm

- var. *engleriana*/*C. dodsonii*/*C. marginata* - Kolumbie, Ekvádor; kmínky lesklé; listy dlouhé 6,5 - 17,5cm, široké 2 - 7cm, řapíky dlouhé 0,4 - 1,6cm; květenství má listeny délky do 6cm, vřetenem délky 1 - 2,5cm, květy mají listeny délky 3,5 - 5cm, stopku délky 0,7 - 2,2cm, listence délky do 1,4cm a korunu délky 2,8 - 3,8cm

Cavendishia erythrostegia

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou eliptické, ocasovité, dlouhé 6 - 10cm, široké 2,5 - 5cm, okraj je mírně podvinutý, žilnatina je zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Květenství je 20 - 25tičetné, má 3 - 5,5cm listeny, vřeteno délky 2 - 2,5cm, květy mají listeny délky 5 - 5,5cm, stopky délky 1,5cm, listence délky 3mm, kalich zelenobílý, dlouhý 7mm, korunu válcovitou, dlouhou 3,8cm, u báze bílou na vrcholu tmavě růžovofialovou.

Cavendishia foreroi

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 8 - 14cm, široké 3 - 8cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenství je 20 - 30tičetné, vřeteno má délku 11 - 13cm, listeny jsou dlouhé 1,5 - 2cm, stopky jsou dlouhé 3 - 4mm, kalich má délku 7 - 8mm, koruna je válcovitá, dlouhá 3cm a má červenou barvu s růžovým koncem.

Cavendishia fortunensis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře. Listy jsou mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 5 - 14,5cm, široké 2 - 5,5cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je lepkavé, 20tičetné, dlouhé 11 - 14cm, listeny dlouhé 2,1 - 2,5cm, stopky dlouhé 5 - 7mm, listence dlouhé 1 - 1,4cm, kalich dlouhý 3 - 5mm a koruna růžová, dlouhá 1,9cm.

Cavendishia fusiformis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 4,5 - 14cm, široké 1 - 6cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 4- 7mm. Květenství je dlouhé 3 - 8cm, květy mají listeny délky 2,5 - 3,5cm v barvě růžovočervené, stopky jsou dlouhé 1mm, listence dlouhé 2,5 - 3cm, kalich dlouhý 1,1 - 1,5cm, koruna dlouhá 3,5cm, bílá a na špičkách zelená.

Cavendishia gentryi

oblasti: Kolumbie, Panama

Roste v Panamě a Kolumbii v podobě epifytického keře. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 8 - 13cm, široké 3,5 - 5,5cm, na horní straně řídce chlupaté a řapíky jsou dlouhé 5mm. Květenství je krátce hroznovité, 6tičetné, vřeteno dlouhé 2,5cm, květy mají listeny dlouhé 1,6 - 2,3cm, stopky dlouhé 0,8 - 1,2, listence nejsou známy, kalich je dlouhý 1,3mm, koruna válcovitá a dlouhá 2cm.

Cavendishia glandulosa

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Listy jsou prakticky kožovité, špičaté, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 1 - 1,5cm, okraj je mírně podvinutý, centrální žilka je zapuštěná, ostatní vystouplé a

řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Květenství je 10 - 15tičetné, vrteno dlouhé 1 - 2,3cm, květy mají listeny mírně obvejčité, dlouhé 1,5cm, kalich dlouhý 6 - 7mm, koruna válcovitá a dlouhá 1,3cm.

Cavendishia gomezii

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Listy jsou kožovité, vejčité, špičaté, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 1 - 1,7cm, báze kulatá až mírně srdčitá, okraj trochu podvinutý, žilnatina je vystouplá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, 7 - 20tičetné, vrteno je dlouhé 1 - 2,5cm, květy mají listeny délky 1,2 - 1,5cm, stopky jsou dlouhé 6 - 8mm, listence jsou dlouhé 2 - 5mm, koruna je válcovitá, dlouhá 1cm a červená.

Cavendishia grandifolia

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě keře. Větvě jsou dlouhé do 3m. Listy jsou kožovité, eliptické, špičaté, dlouhé 2,6 - 4,5cm, široké 0,7 - 2cm, okraj je ztlustlý, mírně podvinutý, žilky jsou vystouplé min. na spodní straně a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2,5cm. Květenství je 20 - 30tičetné, má listeny délky 0,7 - 1,5cm, vrteno délky 1,3 - 3cm, květy mají tmavěružové listeny délky 2,8 - 4cm, stopky dlouhé 2,5cm, listence dlouhé 7mm, kalich růžovočervený, dlouhý 1,3cm a korunu válcovitou, dlouhou 3,3cm v barvě žlutozelené s bílými laloky.

Cavendishia grossa

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou mírně obvejčité, trochu puchýřnaté, tupě kulaté, dlouhé 2,8 - 13cm, široké 2 - 6cm, žilnatina mírně zapuštěná, centrální částečně ztlustlé a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Květenství je převislé, kulovité, 15 - 20tičetné, vrteno má délku 4cm, květy mají listeny vzpřímené, dlouhé 3 - 3,5cm, stopky dlouhé 1 - 1,4cm, listence dlouhé 2,5 - 3mm, kalich růžovočervený, dlouhý 6 - 7mm, koruna válcovitá a dlouhá 2 - 2,5cm.

Cavendishia guatapeensis

synonyma: C. cryptantha

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 2,5 - 9cm, široké 1 - 4cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenství je kulovité až válcovité, 8 - 20tičetné, listeny jsou dlouhé 1cm, květy mají listeny délky 0,7 - 1,5cm v barvě červené až zelené, stopky dlouhé do 3,5mm, listence dlouhé 0,2 - 1,1cm, kalich dlouhý 3,5 - 7mm, koruna červená a dlouhá 0,8 - 1,3cm. Plody mají v průměru 0,8 - 1,3cm.

Cavendishia herrerae

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě převíslého epifytického keře. Listy jsou kožovité, mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 8 - 18cm, široké 1,2 - 3,5cm, žilnatina zapuštěná a řapíky dlouhé 4 - 7mm. Květenství je hroznovité, 14tičetné, vřeten má délku 10 - 11cm, květy mají listeny podlouhlé, dlouhé 1,7 - 2,1cm, stopky dlouhé 1,1 - 1,4cm, listence dlouhé 4 - 6mm, kalich dlouhý 9mm v barvě růžové a koruna je růžovofialová.

Cavendishia isernii

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě keře, který může být i epifytický. Kmínky jsou dlouhé do 5m. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 2,5 - 11cm, široké 1 - 4,5cm a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství je 11 - 40tičetné, vřeten dlouhé 2,5 - 14,5cm, květy mají opadavé listeny délky 5 - 8mm, stopky délky 0,5 - 1,3cm, listence dlouhé 0,5mm, kalich délky 5mm a koruna válcovitá, dlouhá 0,8 - 1,2cm, u paty bílá a na vrcholu růžovočervená. Plody mají v průměru 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. isernii - květenství holé
- var. pseudospicata/C. pseudospicata - květenství ochlupené

Cavendishia jardinensis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou kožovité, mírně puchýřnaté, vejčité, dlouhé 5 - 10cm, široké 3 - 5cm, žilnatina zapuštěná, centrální žilka částečně ztlustlá a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, 35 - 50tičetné, dlouhé 7 - 11cm, květy mají listeny dlouhé 1,1cm, stopky dlouhé 3 - 4mm, listence dlouhé 3mm, kalich dlouhý 7mm a koruna válcovitá, červená a dlouhá 1cm.

Cavendishia lactiviscida

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě keře, který může být i epifytem. Větve má dlouhé do 1m a mohou být hranaté. Listy jsou eliptické, špičaté, centrální částečně zapuštěné, ostatní vystouplé, dlouhé 4 - 9cm, široké 1 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenství je 4 - 10tičetné, vřeten dlouhé 4 - 15cm, květy mají listeny délky 0,7 - 1,5cm, stopky dlouhé 1,4 - 2,5cm, kalich dlouhý 4 - 6mm a koruna je dlouhá 1,9 - 2,9cm.

Cavendishia laurifolia

synonyma: C. tuerckheimii, Chupalon laurifolium, Polyboea laurifolia

oblasti: Guatemala, Kolumbie, Mexiko, Panama

Roste od Mexika po Panamu v podobě keře, který může být i epifytní. Dorůstá výšky 1 - 3m. Borka je žlutohnědá. Listy jsou kopinaté, špičaté až ocasovité, dlouhé 3,5 - 13cm, široké 1 - 4cm, žilnatina na spodní straně vystouplá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je 8 - 45tičetné, vřeten dlouhé

4 - 20cm, květy mají listeny délky 7 - 13cm, stopky délky 0,4 - 2,6cm, listence dlouhé 1 - 2,5mm, kalich dlouhý 2,5 - 3,5mm, koruna je dlouhá 0,6 - 1,2cm v barvě červené a u báze bílé. Plody mají v průměru 6 - 7mm.

Cavendishia lebroniae

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 10 - 27cm, široké 3,5 - 10cm, báze bývá srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství je latnaté, max. 150tičetné, větveno dlouhé 12 - 19cm, květy mají listeny délky 4 - 5mm, stopky délky 4 - 5 (i 8)mm, koruna je baňkovitá, růžová až fialová a dlouhá do 1cm.

Cavendishia leucantha

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytní. Borka je červenohnědá. Listy jsou vejčité, dlouhé 2 - 6cm, široké 1 - 3cm, centrální žebro je částečně vystouplé, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je latnaté, 20 - 100četné, větveno dlouhé 5 - 10cm, větve dlouhé 1,5 - 5cm, květy mají listeny délky 7mm, stopky délky 6 - 8mm, listence dlouhé méně než 1mm, kalich zelenobílý, dlouhý 1,5mm a koruna je bílá, dlouhá 6mm. Plodem je bobule průměru 5 - 6mm.

Cavendishia limonensis

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě epifytického keře. Listy jsou kožovité, vejčité, špičaté, dlouhé 3,5 - 5,6cm, široké 1,2 - 1,8cm, na okraji mírně podvinuté, žilky částečně zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství je hroznovité, 6 - 9tičetné, listeny jsou dlouhé 2mm, větveno hranaté, dlouhé 1,5 - 2,5cm, květy mají listeny délky 0,7 - 1,6cm, stopky délky 0,7 - 1cm, kalich dlouhý 4 - 5mm a korunu válcovitou, dlouhou 1,4 - 1,7cm.

Cavendishia lindauiana

synonyma: *C. splachnoides*

oblasti: Kolumbie, Panama

Roste od Panamy po Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou kopinaté, špičaté až ocasovité, dlouhé 8,5 - 22cm, široké 3 - 7cm, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, centrální žilka je částečně vystouplá, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,3cm. Květenství je 8 - 34četné, větveno dlouhé 4 - 25cm, květy mají listeny délky 2,5 - 4,2cm, stopky délky 1 - 3,4cm, listence dlouhé 5 - 9mm, kalich dlouhý 0,8 - 1,4cm a koruna válcovitá, dlouhá 2,4 - 4cm. Plodem je bobule průměru 1,5cm.

Cavendishia linearifolia

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě převíslého epifytického keře. Listy jsou kožovité, špičaté, dlouhé 6 - 15cm, široké 3 - 7mm, na okraji podvinuté, centrální žilka na spodní straně částečně vystouplá a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenství je hroznovité, 4 - 11tičetné, vrteno dlouhé 1 - 2cm, květy mají listeny délky 1,4 - 2,4cm, stopky dlouhé 4 - 7mm, tmavěružový kalich délky 6 - 8mm a korunu růžovou, válcovitou, dlouhou 1,6 - 1,8cm.

Cavendishia longirachis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 7,5 - 27cm, široké 3 - 12cm, na spodní straně žláznaté, centrální žebro částečně vystouplé a ztlustlé, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,9cm. Květenství je 125 - 140tičetné, listeny jsou dlouhé do 2,5cm, vrteno hranaté, dlouhé do 35cm, květy mají listeny délky 2,5cm, stopky délky 4mm, listence dlouhé 1,7cm, kalich dlouhý 2,5 - 2,7cm, koruna válcovitá, bílá a dlouhá 2,1 - 2,2cm.

Cavendishia luteynii

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě epifytického keře. Listy jsou kožovité, kopinaté, špičaté, dlouhé 2,4 - 6,8cm, široké 1,3 - 4,2cm a řapíky jsou dlouhé do 1,5mm. Květenství je hroznovité, 9 - 18tičetné, vrteno dlouhé 3 - 6mm, květy mají listeny dlouhé 1,5 - 1,8cm v barvě růžové, stopky dlouhé 3 - 4,5mm, kalich je holý, dlouhý 1cm a koruna je válcovitá, dlouhá 7 - 8mm, zelenobílá až zelenožlutá.

Cavendishia macrocephala

synonyma: C. mutisiana

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být šplhavý a epifyt. Větvě jsou hranaté. Listy jsou mírně vejčité až kopinaté, špičaté, dlouhé 10,5 - 21cm, široké 4 - 7cm, centrální žebro částečně ztlustlé a vystouplé, ostatní zapuštěné, báze je mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Květenství je 6 - 12tičetné, vrteno je dlouhé 0,6 - 1,5cm, květy mají listeny délky 2,5 - 4cm, stopky dlouhé 0,5 - 1cm, listence délky 3 - 7mm a koruna je válcovitá, dlouhá 1,9 - 2,9cm, bílá nebo růžová.

Cavendishia mariae

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě keře, který může být i epifytem. Větvě mají délku až 2m. Listy jsou prakticky kožovité, eliptické, ocasovité, žláznaté, dlouhé 6 - 16cm, široké 2 - 6cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství je 15tičetné, vrteno je dlouhé 5 - 7cm, listeny jsou růžové až červené, stopky dlouhé 0,5mm, kalich dlouhý 1cm, koruna válcovitá a dlouhá 3 - 3,5cm.

Cavendishia martii

synonyma: *C. muschleriana*, *C. paniculata*, *Chupalon viridiflorum*, *Thibaudia martii*, *Thibaudia viridiflora*

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Peru a Bolívii v podobě keře (může být i šplhavý). Dorůstá výšky do 4m. Listy jsou vejčité, špičaté, žláznaté, dlouhé 9 - 20cm, široké 4 - 10cm, báze mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,1cm. Květenství je latnaté, 50 - 175tičetné, listeny jsou dlouhé do 8mm, vréto dlouhé 8 - 33cm, větve dlouhé 3 - 17cm, listeny dlouhé 0,6 - 1,1cm v barvě zelené a načervenalé, listeny dlouhé 1,7 - 2,2cm, stopky dlouhé 0,5 - 1,3cm, listence dlouhé 3 - 4mm, kalich dlouhý 5mm, koruna dlouhá 0,8 - 1,3cm v barvě zelené až žlutozelené.

Cavendishia megabracteata

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 2,5m. Borka je hnědá. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 4 - 15cm, široké 1 - 7cm, centrální žebro částečně vystouplé, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,4cm. Květenství je 2 - 14tičetné, vréto dlouhé 0,6 - 6cm, květy mají listeny dlouhé 2 - 7mm, stopky dlouhé 0,8 - 1,9cm, listence dlouhé 1,5 - 5mm, kalich béžový, dlouhý 0,4 - 1,3cm, koruna dlouhá 1,7 - 4,3cm, u paty růžová a na konci fialová. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *attenuata* - listy eliptické, dlouhé 6,5 - 10,5cm; květenství 10 - 14tičetné, vréto dlouhé 3,5 - 6cm, květy mají růžové listeny délky 3 - 3,5cm, šířky 1,5 - 2,6cm, kalich délky 4 - 5,5mm, koruna délky 1,7 - 2cm
- var. *megabracteata* - Panama; listy mírně vejčité až kopinaté, dlouhé 4 - 15cm; květenství 2 - 12tičetné, vréto dlouhé 0,6 - 3,5cm, květy mají nařezané až růžové listeny délky 2 - 7cm, kalich délky 0,7 - 1,3cm a korunu délky 3,1 - 4,3cm

Cavendishia melastomoides

synonyma: *C. graebneriana*, *C. klotzschiana*, *Chupalon melastomoides*, *Socratesia melastomoides*

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Panamě a Kostarice v podobě zpravidla epifytického keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou převislé. Listy jsou mírně vejčité, špičaté až ocasovité, dlouhé 3 - 10cm, široké 1 - 4cm, centrální žebro částečně vyniklé, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 3 - 9mm. Květenství je lepivé, 4 - 18tičetné, vréto dlouhé 2 - 15cm, květy mají růžové listeny délky 0,4 - 2,2cm, stopky dlouhé 0,7 - 2,7cm, zelené až růžovozelené listence dlouhé 1 - 5mm, kalich tmavě růžový až červený, dlouhý 3 - 7,5mm a koruna válcovitá, dlouhá 1,6 - 4,1cm. Plody mají v průměru 1,1 - 4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *albiflora* - Kostarika; květenství má 2 - 6cm vréto, listeny délky 0,4 - 1cm, stopky délky 0,9 - 1,5cm, korunu bílou, dlouhou 1,6 - 2cm
- var. *coloradensis* - Panama; květenství má 2 - 7cm vréto, listeny dlouhé 0,6 - 2,2cm, květy mají stopku délky 1 - 1,9cm, koruna dlouhá 2,9 - 3,2cm
- var. *melastomoides*/*C. graebneriana* - Kostarika; květenství má vréto délky 3 - 15cm, květy mají listeny délky 0,6 - 2cm, stopky dlouhé 0,7 - 2,7cm, koruna dlouhá 1,9 - 4,1cm

Cavendishia micayensis

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 7 - 30cm, široké 3 - 16cm, na okraji mírně podvinuté a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenství je válcovité, 25 - 50tičetné, listeny dlouhé 2cm, vřeteno dlouhé 4 - 10cm, květy mají listeny délky 2,5 - 3cm, stopky dlouhé do 1,3mm, listence zpravidla chybí, když jsou, mohou být dlouhé 0,4 - 1cm, kalich je dlouhý 1 - 2cm a koruna je válcovitá, dlouhá 2 - 3,7cm. Plodem je bobule průměru 1,5cm.

Cavendishia morii

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 7 - 16cm, centrální žebro částečně vystouplé, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,4cm. Květenství je 15 - 25tičetné, vřeteno je dlouhé 2,5 - 9cm, listeny jsou dlouhé 1,5 - 2cm, květy mají až 1cm stopky, listence délky 1,5mm, kalich dlouhý 5mm a koruna je růžová, dlouhá 1,8 - 2cm. Plodem je bobule průměru 1,1cm.

Cavendishia neblinae

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou vejčité (i obvejčité), špičaté, dlouhé 6 - 14,5cm, široké 3,2 - 6,7cm, centrální žebro je částečně vystouplé, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je 15 - 20tičetné, vřeteno dlouhé 3 - 10cm, květy mají listeny délky 2,5 - 3,7cm v barvě růžové, stopky jsou dlouhé 6 - 9mm, listence délky 3mm, kalich délky 7 - 8mm a koruna je bílá, dlouhá 2 - 2,2cm.

Cavendishia nitens

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Kmínky jsou převislé, dlouhé do 2,5m. Listy jsou mírně vejčité (i téměř kulovité), špičaté, bývají puchýřnaté, dlouhé 5,5 - 21,5cm, široké 3 - 10,5cm, centrální žebro částečně ztlustlé a vystouplé, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,8cm. Květenství je 15 - 22tičetné, listeny dlouhé do 3cm, vřeteno dlouhé 1 - 2cm, listeny dlouhé 3 - 5,6cm, stopky dlouhé 1,1 - 1,4cm listeny dlouhé 2mm, kalich dlouhý 0,6 - 1cm a koruna válcovitá, dlouhá 2,8 - 3,8cm, u báze bílá, zbytek tmavě růžovofialový. Plodem je bobule průměru 1,3cm.

Cavendishia nitida

synonyma: *C. obtusa*, *Thibaudia nitida*

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Větve bývají šplhavé a hranaté. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou eliptické, zaoblené, dlouhé 3 - 15cm, široké 1,5 - 6cm, žilnatina

zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Květenství je převislé, 16 - 20tičetné, vrteno dlouhé 2,8 - 5cm, listeny dlouhé 3 - 4cm, červené, stopky dlouhé 0,7 - 1,4cm, listence dlouhé 2 - 6mm, kalich dlouhý 0,6 - 1cm, koruna válcovitá a dlouhá 2 - 2,8cm. Plodem je bobule průměru do 1,5cm.

Cavendishia nobilis

synonyma: *C. urbaniana*, *Chupalon nobile*, *Chupalon nobilis*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru a Peru. v podobě keře. Dorůstá výšky do 4m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 7 - 19,5cm, široké 3 - 9,5cm, centrální žebro částečně vystouplé, zbytek zapuštěný, báze mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,1cm. Květenství je 6 - 15tičetné, listeny dlouhé do 3cm, vrteno dlouhé 0,6 - 1,7cm, květy mají listeny dlouhé 2,2 - 4cm, stopky dlouhé 0,2 - 1,4cm, listence dlouhé 0,2 - 1cm, kalich dlouhý 0,6 - 1cm a koruna válcovitá, dlouhá 1,6 - 3,4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *capitata*/*C. capitata*/*Chupalon capitatum*/*Proclesia capitata*/*Thibaudia capitata* - Ekvádor; listy dlouhé 9 - 19cm, široké 3,5 - 10cm; květy mají 2 - 8mm stopky, listence čárkovité, dlouhé 0,4 - 1cm, kalich dlouhý 0,7 - 1cm a koruna dlouhá 2,2 - 3,4cm

- var. *nobilis*/*C. urbaniana*/*Chupalon nobile* - Peru; listy délky 7 - 20cm, šířky 3 - 7cm; květy mají 0,5 - 1,4cm stopky, listence délky 1,5 - 3mm, kalich délky 6 - 7,5mm a koruna je dlouhá 1,6 - 2,1cm

Cavendishia nuda

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Borka je červenohnědá, rozpraskaná. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 5 - 9,5cm, široké 1,5 - 3cm, centrální žebro částečně ztlustlé, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 5 - 9mm. Květenství je dlouze hroznovité, 4 - 15tičetné, vrteno dlouhé 0,3 - 1,6cm, květy mají listeny délky 7mm, stopky dlouhé 9mm, listeny dlouhé 2mm, kalich tmavěoranžový, délky 5,3mm a koruna je válcovitá, oranžová a dlouhá 1,5cm.

Cavendishia oligantha

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Kmínky jsou dlouhé do 2,5m. Listy jsou eliptické, špičaté (i ocasovité), mírně puchýřnaté, dlouhé 7,5 - 14cm, široké 2 - 5cm, centrální žilka částečně ztlustlá a vystouplá, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je 5 - 13tičetné, vrteno dlouhé 1 - 2,8cm, květy mají listeny délky do 1,4cm, stopky délky 3 - 7mm, listence dlouhé do 1mm, kalich dlouhý 3 - 4mm, koruna válcovitá, bílá, na vrcholu růžová a dlouhá 7 - 8,5mm.

Cavendishia orthosepala

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě epifytického keře. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 10,5 - 24,5cm, široké 3 - 9cm, na okraji podvinuté, centrální žilka částečně ztlustlá, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je 12 - 24četné, vrteno dlouhé 3cm, květní listeny růžové, dlouhé

1,5 - 2,1cm, stopky dlouhé 1,5 - 3,5mm, stopky dlouhé 1 - 1,6cm, kalich dlouhý 1,3 - 1,6cm, koruna růžová a dlouhá 1,6cm. Plody mají v průměru 1 - 1,2cm.

Cavendishia osaensis

Cavendishia palustris

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě epifytického keře. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 6,5 - 15cm, široké 2,5 - 5,5cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 4 - 9mm. Květenství je hroznovité, 20 - 35tičetné, vrteno dlouhé 13 - 17cm, květy mají listeny délky 2,5 - 7mm, stopky délky 1 - 1,8cm, kalich délky 2,7 - 3,3mm, korunu válcovitou, červenou až bělavou a dlouhou 0,7 - 1,1cm.

Cavendishia panamensis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře. Dorůstá výšky 2,5 - 3m. Borka je žlutohnědá. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 9 - 16cm, široké 3 - 6cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenství je lepidité, 11 - 37mičetné, vrteno dlouhé 3 - 17cm, listeny dlouhé 2 - 5cm, růžové, stopky dlouhé 1,1 - 2cm, listence dlouhé 1,5 - 2mm a kalich dlouhý 4 - 6mm.

Cavendishia parviflora

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě keře, který může být i epifytický. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou kožovité, puchýřnaté, eliptické, dlouhé 2,7 - 8cm, široké 1,2 - 2,5cm, na okraji mírně podvinuté, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je hroznovité, 3 - 7mičetné, listeny dlouhé do 4mm, vrteno dlouhé 1,5 - 2cm, květy mají nazelenalé listeny délky 3 - 4mm, stopky dlouhé 6 - 7mm, listence dlouhé 0,5mm, kalich dlouhý 4 - 4,5mm a koruna válcovitá a dlouhá 9mm.

Cavendishia pedicellata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Větvě jsou obloukovité a dlouhé do 2m. Listy jsou mírně vejčité, dlouhé 4 - 20cm, široké 1,5 - 9cm, špičaté, báze prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, jsou částečně vystouplé a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenství je lepidité, 16 - 35tičetné, vrteno dlouhé 10 - 20cm, květy mají listeny dlouhé 1,3 - 2cm, tmavě růžovofialové, stopky dlouhé 4 - 6cm, listence dlouhé 3 - 4mm, kalich dlouhý 1cm, koruna válcovitá a dlouhá 3,5cm.

Cavendishia pilobraceata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Větvě jsou drsně ochlupené. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 7 - 16cm, široké 2,5 - 6cm, žilnatina je zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenství je 25tičetné, vřeteno je dlouhé 3,5 - 4,5cm, květy mají listeny délky 3,5cm, stopky délky 0,5mm, kalich dlouhý 1,2cm, koruna válcovitá a dlouhá 2,8cm.

Cavendishia pilosa

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Větvě jsou ochlupené. Listy jsou vejčité, ochlupené, dlouhé 2,5 - 8cm, široké 1,5 - 4,5cm, žilky zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je 10 - 12tičetné, vřeteno dlouhé 1 - 2cm, květy mají listeny červené, dlouhé 9mm, stopky dlouhé 2mm, kalich dlouhý kolem 5mm, koruna trubkovitá a dlouhá 1,1cm.

Cavendishia porphyrea

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 1,5 - 2m. Listy jsou eliptické, ocasovité, dlouhé 3,4 - 7,6cm, široké 1,3 - 3,4cm, na okraji podvinuté, centrální žilka je částečně zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenství je 3 - 9tičetné, vřeteno dlouhé 2,5 - 6cm, květy mají vytrvávající listeny délky 0,6 - 1,3cm, šířky 0,5 - 1cm, stopky dlouhé 1,2 - 2,2cm, listence dlouhé 2 - 4mm, kalich má délku 6 - 8mm a koruna je válcovitá, tmavě růzovofialová až černá, dlouhá 3 - 4cm.

Cavendishia pseudopedunculata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou eliptické, špičaté až ocasovité, dlouhé 7 - 15cm, široké 2,5 - 5,5cm a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství je 20tičetné, vřeteno dlouhé 4 - 5cm, listeny dlouhé do 2,5cm, listence dlouhé 3cm a kalich bílý, dlouhý 8,5mm.

Cavendishia pseudostenophylla

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytické liány. Borka je červenohnědá. Listy jsou úzce eliptické, tupě zakulacené, dlouhé 9 - 14cm, široké 1 - 2cm, spodní strana je červenohnědá, okraj podvinutý, centrální žebro zapuštěné, ostatní vystouplé a řapíky jsou dlouhé 2 - 3,5mm. Květenství je lepivé, 12 - 20tičetné, vřeteno dlouhé 5 - 15cm, květy mají listeny růžové, dlouhé 1,3 - 2,7cm, stopky dlouhé 8mm, listence dlouhé 2,5cm, kalich dlouhý kolem 7mm a koruna je dlouhá 3,2cm v barvě růžové.

Cavendishia pubescens

synonyma: C. pubescens var. boliviensis, Chupalon pubescens, Proclesia pubescens, Thibaudia

cinnamomifolia, Thibaudia oblongifolia, Thibaudia pubescens, Thibaudia septemnervia

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Panama, Peru, Venezuela

Roste od Panamy po Bolívii v podobě keře (i stromu), který může být i epifytický. Dorůstá výšky 1 - 8m. Listy jsou eliptické, špičaté, ochlupené, dlouhé 5,5 - 30cm, široké 1,5 - 12,5cm, žilky zapuštěné a řapíky dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství je 7 - 19tičetné, vrteno je dlouhé 1 - 4,5cm, květy mají listeny délky 1,7 - 3cm v barvě růžové nebo zelinkavé či tmavěčervené, stopky dlouhé 0,4 - 1,4cm, listence dlouhé 2 - 5mm, kalich dlouhý 0,5 - 1,1cm, koruna válcovitá, bílá nebo narůžovělá (i červená) a dlouhá 1,2 - 2,2cm.

Cavendishia punctata

synonyma: C. kraenzliniana, C. punctatifolia, Thibaudia punctata, Thibaudia punctatifolia

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Větvě jsou obloukovité, dlouhé 4m. Listy jsou eliptické, špičaté, tečkované, dlouhé 12 - 26cm, široké 4 - 11cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,4cm. Květenství je hroznovité, 30 - 60tičetné, listeny dlouhé 1,5cm, dlouhé 10 - 30cm, větvě dlouhé 4 - 11cm, květy mají listeny dlouhé 0,8 - 1,5cm, stopky dlouhé 1 - 1,2cm, kalich dlouhý 5 - 6mm, načervenalý, koruna válcovitá a dlouhá 1 - 1,5cm.

Cavendishia quercina

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Listy jsou vejčité, zaoblené, dlouhé 2,5 - 7,5cm, široké 1 - 3,5cm, báze prakticky srdčitá, žilnatina mírně zapuštěná a řapíky dlouhé 1 - 6mm. Květenství je 12 - 53četné, vrteno dlouhé 2 - 12cm, květy mají listeny délky 9,5 - 23cm, stopky délky 0,6 - 1,8cm, listence délky 1 - 5,5mm, kalich délky 5 - 9mm a koruna je růžová, na vrcholu zelená a dlouhá 0,9 - 1,7cm. Plody mají v průměru 1cm.

Cavendishia quereme

synonyma: Orthaea lehmannii, Polyboea quereme, Thibaudia quereme

oblasti: Kolumbie, Kostarika, Panama

Roste v Kostarice, Panamě a Kolumbii, obvykle v podobě keře jako epifyt, méně častěji na zemi. Větvě jsou holé, dlouhé 1 - 2,5m. Listy jsou střídavé, eliptické až kopinaté, celokrajné, mírně ocasovité, dlouhé (4 -) 6 - 11 (i 14)cm, široké 1,3 - 4 (i 5)cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 5 (i 7) žilek a řapíky jsou dlouhé kolem 6mm. Květenstvím je 10 - 20 (i 25)tičetný hrozen složený z 5tičetných květů s růžovými nebo červenými listeny délky 1 - 2,5cm, stopky mají délku 1 - 1,5cm, kalich je srostlý, dlouhý 2,5 - 5mm, koruna válcovitá, hranatá, dlouhá 0,7 - 1,1 (i 1,3)cm, oranžová, na konci bílá. Plodem je kulovitá bobule průměru 0,7 - 1,1cm v barvě temněmodré.

Vyhovují ji vlhké mlžné lesy.

Cavendishia revoluta

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře. Listy jsou kožovité, kopinaté, špičaté, dlouhé 11 - 16cm, široké 5 - 9cm, podvinuté, žilky mírně zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenství je 9 - 15tičetné, vrteno má délku 3 - 4cm, květy mají listeny délky 1,4 - 2cm, stopky délky 3,5 - 7,5mm, listence dlouhé 2 - 3mm a kalich je dlouhý 1cm.

Cavendishia rhynchophylla

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Listy jsou eliptické, ocasovité, drsně ochlupené, dlouhé 3,3 - 8cm, široké 1,6 - 3cm, střední žilka trochu vystouplá, ostatní zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenství je 9 - 10tičetné, listeny jsou dlouhé 4mm, květy mají listeny délky 6 - 9mm, stopky délky 1cm, listence dlouhé 1,5mm, kalich dlouhý 2,7 - 3,5mm a koruna je válcovitá.

Cavendishia ruiz-teranii

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky až 4m při průměru kmene 5cm. Listy jsou eliptické, tupě špičaté, dlouhé 2,5 - 6,5cm, široké 1 - 3cm, žilnatina je zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Květenství je 15 - 30tičetné, vrteno dlouhé 6 - 13cm, květy mají listeny délky 1,8 - 2,2cm, stopky dlouhé 1,8 - 2,4cm, listence dlouhé 1,5mm, kalich holý, dlouhý 9mm, koruna válcovitá, červená a dlouhá 2 - 2,5cm.

Cavendishia santafeensis

Cavendishia sessiliflora

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 3m. Větvě jsou v mládí hranaté, červenohnědé. Listy jsou kožovité, kopinaté, tupé až krátce zašpičatělé, dlouhé 3 - 13cm, široké 1,5 - 4,8cm, žilnatina zapuštěná a řapíky dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenství je 1 - 5tičetné, květy mají listeny délky 3 - 5mm, stopky dlouhé 3 - 4mm, listence dlouhé 2,8mm, kalich dlouhý 5 - 8mm v barvě zelenorůžové až červenooranžové a koruna je lahvovitá, dlouhá 0,9 - 1,2cm, od báze bílá, konec červenooranžový. Plodem je kulovitá, červená až tmavě růžovofialová bobule.

Cavendishia sirensis

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru a Peru v podobě liánovitého keře s délkou do 2m. Listy jsou eliptické, dlouhé 8 - 17cm, široké 3 - 6cm, špičaté, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, centrální žilka je částečně ztlustlá a vystouplá, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,2cm. Květenství je 13 - 19tičetné, vrteno dlouhé 4 - 8,5, květy mají růžové až tmavěčervené listeny délky 3 - 5cm, stopky dlouhé 0,7 - 0,8 (i 1,5)cm, listence dlouhé 2 - 4,5mm, kalich dlouhý 8mm a koruna válcovitá, světlemodrá až

modrofialová a dlouhá 2,3 - 3,1cm.

Cavendishia sophoclesioides

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě šplhavého epifytického keře. Větve jsou hranaté. Listy jsou eliptické, ochlupené, zakulacené, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 7 - 9mm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, centrální žilka částečně zapuštěná, zbytek trochu vystouplý a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Kvete samostatnými květy s listeny délky 0,3 - 1,5cm, stopky dlouhé 0,5mm, kalich je dlouhý 4,3mm a koruna je válcovitá, červenožlutá a dlouhá 2cm.

Cavendishia speciosa

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Větve jsou převislé, dlouhé 2m nebo 4 - 5m. Borka je šedohnědá. Listy jsou kožovité, mírně kopinaté, dlouhé 4,5 - 17cm, široké 1,2 - 7cm, špičaté, žilnatinu zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství je 20 - 25tičetné, listeny dlouhé 2cm, vrteno dlouhé 3 - 4cm, květy mají listeny dlouhé 2 - 4cm, stopky délky 3 - 7mm, kalich dlouhý 1,1cm a koruna válcovitá, dlouhá 2,2 - 3,2cm.

Cavendishia spicata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě stromu. Větve jsou tupě hranaté. Listy jsou eliptické, dlouhé 3 - 6,5cm, široké 1,5 - 3cm, centrální žebro je částečně vystouplé, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé do 4mm. Květenství je 20 - 60tičetné, vrteno dlouhé 3,5 - 18cm, listeny dlouhé 4mm, stopky dlouhé 5mm, listence dlouhé do 0,5mm, kalich dlouhý 3 - 4mm a koruna válcovitá, dlouhá 6,6mm. Plody mají v průměru 7 - 8mm.

Cavendishia stenophylla

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou úzce kopinaté, dlouhé 4,5 - 14,5cm, široké 0,5 - 2,5cm, špičaté, na okraji podvinuté a řapíky jsou dlouhé 3,5 - 9mm. Květenství je samostatné (i párovité), úžlabní, 8 - 28mičetné, lepkavé, vrteno dlouhé 5,5 - 13cm, květy mají listeny dlouhé 3 - 7mm, tmavě růžovofialové, stopky dlouhé 1,1 - 2,4cm, listeny dlouhé 1,5 - 3mm, tmavě růžovofialovozelené, kalich dlouhý 5 - 8mm a koruna je světle růžovofialová, dlouhá 1,6 - 2,2cm.

Cavendishia subamplexicaulis

synonyma: C. rosea

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytický. Kmínky jsou dlouhé do 5m. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 3,6 - 10cm, široké 1,9 - 6,4cm, báze je srdčitá, prakticky objímavá, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenství je 15 - 53četné, větveno dlouhé 7 - 17cm, květy mají listeny délky 1,5 - 3,2cm, barvu růžovočervenou, stopky dlouhé 0,9 - 1,2cm, listence dlouhé 3 - 5mm, kalich dlouhý 5mm a koruna je válcovitá, červená a dlouhá 1,5 - 1,8cm. Plodem je bobule průměru 1cm.

Cavendishia subfasciculata

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 0,7 - 3m. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 11cm, široké 1 - 4cm, centrální žebro mírně zapuštěné, zbytek mírně vystouplý a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,3cm. Květenství je 2 - 9tičetné, lepivé, větveno dlouhé 0,3 - 3,2cm, květy mají listeny dlouhé 1,5 - 4cm, stopky dlouhé 0,6 - 1,5cm, kalich světle zelený až narůžovělý, dlouhý 0,5 - 1cm a koruna je dlouhá 2 - 3cm, báze bělavá a konec růžovofialový nebo růžovočervený.

Cavendishia talamancensis

oblasti: Kostarika

Roste v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Listy jsou podlouhlé, puchýřnaté, dlouhé 2 - 7cm, široké 1,5 - 4,5cm, žilnatina je zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenství je 10 - 14tičetné, větveno dlouhé 1 - 4cm, listeny dlouhé 0,8 - 1cm, široké 5 - 8mm, květy mají stopky délku 1,5 - 7mm, listence jsou dlouhé 0,5 - 2mm a kalich je dlouhý 6 - 9mm.

Cavendishia tarapotana

synonyma: *C. kalbreyeri*, *C. mexiae*, *C. weberbaueri*, *Chupalon tarapotanum*, *Thibaudia tarapotana*

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Kolumbii, Ekvádoru a Peru v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 9m. Větve jsou dlouhé do 5m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 7,5 - 2m, široké 2,5 - 1m a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenství je 5 - 25tičetné, větveno je dlouhé 0,5 - 2,5cm, květy mají listeny délky 1,4 - 5,3cm, stopky mají délku 0,8 - 2cm, listence jsou růžové, dlouhé 2,5 - 7mm, kalich je dlouhý 0,5 - 1,2cm, koruna je válcovitá, bílá s červeným pruhem a dlouhá 1,6 - 4cm. Plody mají v průměru 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *gilgiana*/*C. gilgiana* - Kolumbie, Ekvádor; květenství je 5 - 6tičetné, větveno dlouhé 0,5 - 2,5cm, květy mají listeny délky 3,5 - 5,3cm, stopky dlouhé 1 - 2cm, kalich dlouhý 0,7 - 1,1cm, koruna dlouhá 3,3 - 4cm
- var. *tarapotana*/*C. mexiae*/*Chupalon tarapotanum*/*Thibaudia tarapotana* - Kolumbie, Ekvádor, Peru; květenství 8 - 25tičetné, větveno dlouhé 1 - 13,5cm, květy mají listeny délky 1,4 - 2,8cm, stopky dlouhé 0,8 - 1,6cm, listence dlouhé 2,5 - 4mm, kalich dlouhý 5 - 8,5mm a koruna je dlouhá 1,6 - 2,5cm

Cavendishia tenella

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 3m. Borka je červenošedá. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 5 - 18cm, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 2,7cm. Květenství je 35 - 80tičetné, vrteno dlouhé 7 - 18cm, květy mají listeny dlouhé 1,2 - 1,7cm v barvě béžové s bílou bází, na vrcholu červené, stopky dlouhé 3 - 7mm, listence dlouhé 1 - 1,3mm, kalich dlouhý 7 - 9mm a koruna má délku 1,1 - 1,4cm.

Cavendishia trujilloensis

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele v podobě keře. Listy jsou mírně vejčité, zašpičatělé, dlouhé 9 - 16,5cm, široké 3,5 - 8cm, centrální žilka částečně vystouplá a ztlustlá a zbytek je zapuštěný. Květenství je 15tičetné, vrteno dlouhé min. 15,5cm, květy mají listeny délky 1,8 - 2cm, listence jsou dlouhé 1,5mm a kalich je dlouhý 8mm.

Cavendishia tryphera

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 2,5m. Listy jsou vejčité, ocasovité, dlouhé 4,5 - 13cm, centrální žebro částečně ztlustlé a vystouplé, zbytek je zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 5 - 9mm. Květenství je 12 - 32četné, květy mají stopky dlouhé 2 - 6mm, kalich je dlouhý 3 - 5mm, koruna je válcovitá, červená a dlouhá 2 - 2,2cm. Plody mají v průměru 1cm.

Cavendishia uniflora

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou ztlustlé, střečovité, vejčité, tupé, dlouhé 2 - 3cm, centrální žebro mírně zapuštěné, ostatní mírně vystouplé a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Kvete samostatnými květy v 23 listenech v řadách s různou délkou 0,1 - 2,6cm, stopky jsou dlouhé 0,5mm, kalich je dlouhý 5 - 6mm, koruna je válcovitá, světlečervená a dlouhá 3cm.

Cavendishia urophylla

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě epifytického keře. Listy jsou eliptické, ocasovité, dlouhé 4 - 7,7cm, široké 1,5 - 2,6cm, žilky při středu zapuštěné a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství je 2 - 4četné, listeny jsou dlouhé 2,6 - 4cm, vrteno je dlouhé 5 - 6mm, listeny jsou dlouhé 3,2 - 4cm, stopky dlouhé 5 - 8mm, kalich dlouhý 0,8 - 1,1cm, koruna válcovitá, bílá a dlouhá 2,5 - 3,2cm.

Cavendishia venosa

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě epifytického keře. Větve jsou převislé a dlouhé do 3m. Listy jsou eliptické, dlouhé 4 - 14cm, špičaté až ocasovité a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je 8 - 15tičetné, vrteno je dlouhé 1 - 2cm, květy mají listeny dlouhé 2,5 - 4cm, stopky jsou dlouhé 0,4 - 1cm, kalich je béžový, dlouhý 1cm, koruna válcovitá a dlouhá 2,6 - 3,4cm.

Cavendishia vinacea

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 10 - 22cm, široké 4 - 9cm, centrální žebro je částečně ztlustlé a vystouplé, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,3cm. Květenství je 15 - 35četné, vrteno dlouhé 6,5 - 21cm, listeny dlouhé 1,3 - 2cm, listence dlouhé 3 - 5mm, kalich je dlouhý 0,7 - 1,1cm a koruna je dlouhá 0,9 - 1,2cm.

Cavendishia violacea

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě epifytického keře. Větve mají délku do 1m. Listy jsou eliptické, dlouhé 4 - 15cm, ocasovité, centrální žebro z 1/2 ztlustlé, oboustranně vystouplé a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je 9 - 13tičetné, vrteno dlouhé 3 - 9cm, květy mají růžovofialové listeny délky 1,2 - 1,5cm, stopky dlouhé 0,8 - 1cm, listence dlouhé 0,5 - 2mm, kalich červeno růžovofialový, dlouhý 5 - 7mm a koruna válcovitá, bílá a dlouhá 1,5cm.

Cavendishia viridiflora

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou ocasovité, celokrajné, dlouhé 7,5 - 12cm, široké 2 - 5,2cm a řapíky jsou dlouhé 5 - 6mm. Květenství je hroznovité, 9 - 11tičetné, vrteno dlouhé 4 - 7cm, květy mají listeny eliptické, dlouhé 1 - 1,8cm, stopky dlouhé 1 - 1,3cm, listence tmavěčervené, dlouhé 1,5mm, kalich zelený, dlouhý 6mm, koruna válcovitá a dlouhá 1,8cm.

Cavendishia wercklei

oblasti: Kostarika

Patří mezi endemity Kostariky. Roste v podobě keře. Větve mohou být řídce ochlupené, v mládí načervenalé a žláznaté. Listy jsou střídavé, kopinaté, celokrajné, protáhle špičaté, jemně ochlupené, dlouhé (4 -) 7 - 12 (i 15)cm, široké (1 -) 2 - 4 (i 5)cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,1cm. Květenstvím je 9 - 12 (i 19)tičetný lepkavý hrozen tvořený 5tičetnými květy s načervenalými listeny délky 2 - 3cm, stopkami délky 1,1 - 1,8cm, srostlým kalichem délky 6 - 9mm a hranatou korunou délky 3 - 3,8cm v barvě bílé až růžovofialové, u báze ochlupené. U báze kalicha má přívěšek se zvlněným okrajem a ochlupenou korunou. Plodem je bobule.

Vyhovují ji vlhké mlžné lesy.

Cavendishia zamorensis

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě keře, může být i epifytem. Větve jsou dlouhé do 2m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 10 - 17cm, široké 4 - 9cm, centrální žilka částečně ztlustlá a vystouplá, zbytek zapuštěný a řapíky jsou dlouhé 7 - 9mm. Květenství je 5 - 15tičetné, vřeteno dlouhé 1 - 2,5cm, květy mají listeny dlouhé 1,5 - 3cm, stopky dlouhé 2 - 7mm, listence dlouhé 4 - 6mm, kalich dlouhý 0,8 - 1,1cm a koruna je zelenobílá, červeně zakončená, lahvovitá a dlouhá 1,2 - 2,5cm.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/cavendishia-bracteata/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1839>

<https://www.rostliny.net/>