

Spartina (Spartina)

čeleď: Poaceae

Existuje asi 14 druhů. Pochází z pobřeží Atlantského oceánu. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Pod zemí vytváří oddenek.

Vyhovuje ji vlhká nebo i promáčená půda. Některé druhy dokonce vyžadují i zasolenou vodu.

Množí se dělením trsů, ale především semeny.

Spartina alterniflora

synonyma: *Dactylis fasciculata*, *Limnetis glabra*, *S. alterniflora* var. *glabra*, *S. alterniflora* var. *pilosa*, *S. brasiliensis*, *S. dissitiflora*, *S. fasciculata*, *S. glabra*, *S. glabra* var. *alterniflora*, *S. glabra* var. *pilosa*, *S. laevigata*, *S. maritima* f. *gracilis*, *S. maritima* subsp. *glabra*, *S. maritima* var. *alterniflora*, *S. maritima* var. *brasiliensis*, *S. maritima* var. *glabra*, *S. merrillii*, *S. stricta* var. *alterniflora*, *S. stricta* var. *glabra*, *S. stricta* var. *maritima*, *S. x merrillii*, *Trachynotia alterniflora*

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Oregon, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie, Washington

Pochází z východu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky, ale listy na zimu opadávají. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou dlouhé 20 - 60cm a široké 1,5cm při jejich bázi.

Vyhovují ji vlhká místa, obzvláště slané mokřady.

Spartina anglica

synonyma: *S. townsendii* var. *anglica*, *S. x townsendii* var. *anglica*

oblasti: Anglie, Britská Kolumbie, Irsko, Kalifornie, Washington

Pochází z jižní Anglie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,4 - 1,3m. Listy mají délku 20 - 60cm a šířku 1,5cm při bázi. Květy mají žlutozelenou barvu měnící se na hnědou v zimě. Na jaře a v létě nabývá žlutozelenou barvu měnící se na světlehnědou na podzim a zimu. V místě původu patří mezi invazivní druhy.

Množí se semeny.

Spartina arundinacea

synonyma: *Ponceletia arundinacea*, *Psammophila arundinacea*, *Tristania arundinacea*

Spartina bakeri

synonyma: *S. juncea* var. *bakeri*

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Texas

Spartina caespitosa

synonyma: *S. patens* var. *caespitosa*

Spartina ciliata

synonyma: *Solenachne ciliata*, *Solenachne phalaroides*, *S. coarctata*

Spartina cynosuroides

synonyma: *Cynodon cynosuroides*, *Dactylis cynosuroides*, *Limnetis cynosuroides*, *Limnetis polystachya*, *Paspalum cynosuroides*, *S. cynosuroides* var. *polystachya*, *S. cynosuroides* x *gracilis*, *S. polystachya*, *S. polystachya* var. *cynosuroides*, *Trachynotia cynosuroides*, *Trachynotia polystachya*, *Triodia cynosuroides*

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie

Spartina densiflora

synonyma: *Chauvinia chilensis*, *S. juncea* var. *laxiflora*, *S. juncea* var. *montevidense*, *S. juncea* var. *montevidensis*, *S. montevidensis*, *S. patagonica*

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste jako trvalka.

Spartina foliosa

synonyma: *S. densiflora* f. *acuta*, *S. leiantha*, *S. stricta* var. *foliosa*

oblasti: Kalifornie

Spartina gracilis

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Manitoba, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Utah, Washington, Wyoming

Spartina longispica

Spartina maritima

synonyma: *Cynodon pungens*, *Dactylis maritima*, *Dactylis stricta*, *Rottboellia stricta*, *S. capensis*, *S. maritima* subsp. *stricta*, *S. pungens*, *S. schreberi*, *S. stricta*, *Trachynotia stricta*

oblasti: J Evropa, Mississippi, Z Afrika

Pochází ze západní a jižní Evropy a západní Afriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 70cm. Přes jaro a léta má zelenou barvu, na podzim a zimu hnědou. Listy mají délku 10 - 40cm a šířku 0,5 - 1cm při bázi. Kvete zelenými květy měnícími se na hnědou v zimě.

Množí se semeny.

Spartina patens

synonyma: *Dactylis patens*, *Limnetis juncea*, *Limnetis juncea* var. *monogyna*, *S. juncea*, *S. juncea* var. *juncea*, *S. juncea* var. *patens*, *S. patens* var. *juncea*, *S. patens* var. *monogyna*, *S. pumila*, *Trachynotia juncea*, *Trachynotia patens*

oblasti: Alabama, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie, Washington

Pochází z východního pobřeží Severní Ameriky. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Barva květů je tmavě fialová, mění se na hnědou v zimě.

Spartina pectinata (Spartina hřebenitá)

synonyma: *S. cynosuroides* f. *major*, *S. cynosuroides* var. *aureomarginata*, *S. cynosuroides* var. *michaixiana*, *S. michauxiana*, *S. michauxiana* var. *suttiei*, *S. michauxiana* var. *tenuior*, *S. pectinata* f. *pectinata*, *S. pectinata* f. *variegata*, *S. pectinata* var. *suttiei*

oblasti: Alberta, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Aureomarginata' - výška 1,2 - 1,7m, žlutozelená barva převislých listů, kvete hnědozelenými latami na až 2m stéblech

Potřebuje vlhkou půdu bohatou na živiny a plné slunce nebo polostín. Je plně mrazuvzdorná.

Množí se dělením trsů.

Spartina spartinae

synonyma: *S. densiflora* var. *junciformis*, *S. densiflora* var. *obtusa*, *S. gouinii*, *S. gracilis*, *S. junciformis*, *S. pittieri*, *Vilfa spartinae*

oblasti: Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, Texas

Spartina versicolor

synonyma: S. durieui, Trachynotia versicolor

oblasti: Katalánsko

Spartina x caespitosa

oblasti: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Rhode Island, Virginie

Spartina x neyrautii

Spartina x townsendii

oblasti: Britská Kolumbie, Irsko, Německo, Washington

Kříženec S. alterniflora x maritima. Dorůstá výšky 50 - 80cm.

Další informace:

<http://www.garten.cz/a/cz/2767-spartina-pectinata-aureomarginata-spartina/>

<https://www.rostliny.net/>