

Camassia (Ladoník)

čeleď: Hyacinthaceae

Rodové jméno bylo odvozeno od indiánského pojmenování Quamash. Pochází především ze západu USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,3)m. Pod zemí vytváří kulovité až vejčité cibule obalené tenkou světlehnědou až černou slupkou. Listy jsou tmavězelené, řemenovité až čárkovité, žlábkovité, 1/2vzpřímené a dlouhé 20 - 80cm. Květenstvím je terminální hrozen vyrůstající z paždí listenů, vlastní květy se skládají z 6ti korunních lístků, jejich barva může být růžová, bílá, tmavě fialová nebo modrofialová. Plodem je tobolka.

Vyhovuje ji vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny a plné slunce (při dostatku vlhkosti) nebo polostín. Po ukončení vegetace ale musí být cibule v suchu.

Množí se dceřinými cibulkami vysazovanými do hloubky 12 - 15cm.

Camassia angusta

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas

Camassia cusickii

oblasti: Idaho, Oregon

Roste v USA v trsech. Dorůstá výšky 50 - 80cm. Pod zemí vytváří podlouhlé cibule průměru 5 - 7cm. Listy jsou dlouhé do 50cm, široké 5cm a mírně zvlněné. Kvete modrými květy v hustějším 30 - 100květém hroznu délky 60 - 90cm, průměrem 5cm s listenem zpravidla delším než květní stopka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Zwanenburg' - výška 60cm, světlemodré květy

Dobře snáší sucho.

Camassia howellii

oblasti: Oregon

Camassia leichtlinii (Ladoník Leichtlinův)

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste na západě Severní Ameriky samostatně anebo v nepočetných skupinách. Dorůstá výšky 0,2 - 1 (i 1,3)m. Pod zemí vytváří vejčité cibule průměru 2 - 3cm. Listy jsou dlouhé do 60cm a široké 2cm. Kvete v řidším hroznu krémovými nebo světlemodrými 6tičetnými květy seskupenými do hustého hroznu. Listeny jsou max. dlouhé jako květní stopka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé

- 'Alba Semiplena' - květy bílé, poloplné

- 'Atroviolacea' - květy béžovožluté a tmavěfialové
- 'Blue Danube' - výška 70 - 90cm
- 'Caerulea' - výška 80cm, světlemodré květy
- subsp. leichtlinii (Ladoník Leichtlinův pravý) - Oregon; květy béžové
- 'Plena' - výška 80cm, bílé plné květy
- 'Semiplena'
- subsp. suksdorfii - Kalifornie, Oregon, Washington; zpravidla modrofialové (i bílé) květy

Potřebuje plné slunce.

Camassia quamash

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky jako trvalka. Dorůstá výšky 30 - 80 (i 90)cm. Pod zemí vytváří jedlé kulovité cibule průměru 1 - 5cm. Listy vyrůstají pouze v centrální růžici, mají trávovitý tvar, šedozelenou až zelenou barvu a šířku 0,4 - 2cm. Kvete modrými, fialovými nebo bílými hvězdovitými květy o průměru 2,5 - 5cm složenými z 6ti úzkých korunních lístků v řidším hroznu s listenem stejné nebo větší délky než květní stopka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alba - výška 60 - 70cm, bílé květy
- var. atroviolaceae - výška 100cm, tmavě fialové květy
- subsp. azurea - Washington
- subsp. breviflora - Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington; listy tmavší, šedozelené; květy tmavěji modrofialové
- var. coerulea - výška 0,8 - 1,1m, tmavě modré květy
- subsp. intermedia - Oregon
- subsp. linearis - Kalifornie
- subsp. maxima - Oregon, Washington
- subsp. quamash - Idaho, Oregon, Washington, Wyoming
- subsp. utahensis - Idaho, Utah, Wyoming
- subsp. walpolei - Oregon

Vyhovují ji bažinaté louky.

Camassia scilloides

synonyma: C. esculenta, C. fraseri, Quamasia hyacinthina

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu USA. Dorůstá výšky 30 - 45cm. Listy mají trávovitý žlábkovitý tvar. Kvete světlými růžovofialovými květy v hroznech podobných hyacintům na 30 - 70 (i 100)cm stonku. Plodem je vejčitá trojpouzdrá tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Orion' - výška 40cm, tmavěfialové květy

Vyhovuje ji vlhko a mírně vápenitá půda.

Další informace:

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/ladonik>

<https://www.rostliny.net/>