

Werneria

čeleď: Asteraceae

Kvete v úboru. Nejznámějším druhem je *W. nubigena*.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria apiculata

Werneria aretioides

oblasti: Argentina, Bolívie, Čile, Peru

Roste na jihu a západě Jižní Ameriky. Listy jsou kopinaté, kožovité, obvykle svinuté a báze je ukrytá v pochvě. Kvete samostatnými přisedlými úbory o průměru 1 - 1,3cm.

Werneria caespitosa

oblasti: Peru

Roste v Peru v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, špičaté, celokrajné a mírně ztlustlé. Kvete bílými květy v úborech.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria denticulata

synonyma: *W. brachypappus*

oblasti: Čile

Roste v Čile v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou seskupené na krátkých lodyhách, jsou čárkovitě kopistovité, zoubkované, brvitě a řapíkaté. Kvete bílými květy v přisedlých úborech.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria glaberrima

oblasti: Čile

Roste v Čile v polštářových porostech. Dorůstá výšky 4 - 6cm. Listy jsou seskupené u sebe, jsou úzce kopist'ovité, svinuté a drsně žláznaté. Kvete bílými květy v úboru.

Vyhovují ji dobře propustné suché písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria glandulosa

oblasti: Peru

Roste v Peru v polštářových porostech. Dorůstá výšky 3 - 7cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou vejčité až kopist'ovité, tupé, celokrajné, žláznaté a na spodní straně ochlupené. Kvete bílými nebo narůžovělými květy v prakticky přisedlých úborech.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria heteroloba

synonyma: W. heteroloba var. obtusiloba, W. obtusiloba, W. pinnatifida

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou peřenosečné až peřenoklané a jsou dlouze řapíkaté. Kvete bílými květy v úboru na krátkém stonku.

Werneria incisa

Werneria melanandra

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, špičaté i tupé, celokrajné, ztlustlé a dlouhé 0,6 - 1cm. Kvete žlutými květy v přisedlých úborech.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria mociniana

Werneria nubigena

synonyma: Oresigonia grandiflora, Oresigonia latifolia, W. disticha, W. dombeyana, W. nubigena var. dombeyana, W. steubelii, W. stuebelii

oblasti: Bolívie, Chiapas, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Střední Amerika

Roste v horských oblastech od jihu Mexika po Bolívii v podobě bezlodyžné trvalky. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Pod zemí vytváří kulový kořen. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou řemenovité, celokrajné, kožovité, holé, tupé, dlouhé 4 - 13 (i 30)cm a široké (0,2 -) 0,6 - 1 (i 3)cm. Kvete v přisedlém (i max. 15cm stopkatém) úboru s průměrem až 7cm, okvětní lístky jsou bílé, dlouhé do 2,5cm, střed je žlutý. Plodem je nažka s chmýrem o délce 0,9 - 1,1cm.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria orbignyana

synonyma: W. mandoniana

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 5 - 8cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou kopistovitě, drsně zubaté, zakončené 3mi zuby a mají dlouhý řapík. Kvete růžovými květy v úboru.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria pectinata

synonyma: W. ciliata, W. knoecheae

Werneria plantaginifolia

Werneria pumila

synonyma: W. acerosifolia, W. calyculata, W. caulescens, W. densa

oblasti: Argentina, Ekvádor, Kolumbie

Roste v Argentině, Ekvádoru a Kolumbii v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžice, jsou čárkovité, kožovité, tlusté, dlouhé 4 - 6cm a bázi mají bíle ochlupenou. Kvete žlutými květy v úboru o průměru 1,8 - 2,5cm na přímé stopce.

Vyhovují ji vlhké až bažinaté písčité půdy v polostínu.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria pygmaea

synonyma: W. brachypappus, W. cochlearis, W. graminifolia, W. minima, W. pygmaea var. apiculata

oblasti: Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy vytvářejí přízemní

růžici, jsou mírně ztlustlé, celokrajné a dlouhé 1 - 4cm. Květenstvím je bílý přisedlý nebo krátce stopkatý úbor.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria solivifolia

Werneria spathulata

oblasti: Argentina, Bolívie, Čile

Roste v Argentině, Bolívii a Čile. Listy jsou kopistěovité, špičaté, dlouze řapíkaté a dlouhé 2 - 4cm. Kvete v samostatných stopkatých úborech.

Werneria staticifolia

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru v trsech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy jsou úzce obkopinaté a bíle ochlupené. Kvete bílými květy v úborech o průměru 4cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Werneria villosa

synonyma: *W. caespitosa* var. *haenkei*

Další informace:

<http://botany.cz/cs/werneria-nubigena/>

<http://www-wedos.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Werneria.htm>

<https://www.rostliny.net/>